


Fig. 4.5.4. *Chelidonium majus* L.

De pe rizom pornesc numeroase rădăcini. Tulpina este erectă, cu înălțimea 50 - 100 cm, ramificată, prevăzută cu peri rari și lungi. Frunzele sunt alterne, imparipenate, cu 2 - 5 perechi de segmente ovate inegal lobat - crenate, cel terminal mai mare, trilob - crenat. Frunzele bazale sunt pețiolate, cele superioare sesile, toate de culoare verde cenușie pe fața inferioară. Florile câte 2 - 8 sunt dispuse în inflorescențe umbeliforme. Florile au diametrul de circa 2 cm; bractei scuamiforme la bază; 2 sepale caduce; 4 petale ovate (de până la 12 mm lungime) de culoare galbenă; numeroase stamine; ovar din 2 carpel; unilocular, multiovulat, stigmat bilobat. Înfloréște din aprilie până toamna. Fructul este o capsulă silicviformă, uniloculară, multispermă de 3 - 5 cm lungime, dehiscență de la bază spre vârf prin 2 valve. Semințe ovoide negre lucioare, lungi de circa 1,5 mm, prevăzute cu o carunculă albă (căutate de furnici). Toate părțile plantei conțin un suc lăptos galben - portocaliu.

Cerințele față de climă și sol. Rostopasca are cerințe reduse față de temperatură, germinază la 4 - 6 °C, iar pentru creșterea și dezvoltarea plantelor necesită o temperatură moderată. Este mai pretențioasă față de umiditatea solului (nu în exces) și a aerului. O cerință ecologică importantă a acestei plante este evitarea luminii directe. Valorifică bine solurile care au suficientă materie organică, ușoare, însă se dezvoltă bine chiar și pe soluri nisipoase.

Zonare. Culturile trebuie să fie realizate în zonele de răspândire naturală, în condițiile în care sunt asigurate cerințele față de climă și sol ale plantei. Se recomandă cultivarea în zonele de șes din Banat, Oltenia, Dobrogea și Muntenia și în cele colinare din Transilvania și Moldova (V. Niță, 2000).

4.5.4.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Rostopasca se cultivă în afara asolamentului (fiind plantă perenă), după plante care se recoltează devreme și lasă solul curat de buruieni (E. Păun, 1995). Cultura se poate menține 2 - 4 ani (V. Niță, 2000). Pentru producerea de sămânță se înființează loturi semincere.

Fertilizarea. La înființarea culturii se aplică 60 - 70 kg/ha P_2O_5 și 40 - 50 kg/ha K_2O (sub arătură) și 60 - 70 kg/ha N (primăvara). Apoi, anual se fertilizează cu 40 - 50 kg/ha P_2O_5 , eventual și potasiu (toamna) și 40 - 50 kg/ha N (primăvara) (A. Mihalea, 1986). Se poate aplica și gunoi de grajd (20 - 25 t/ha) la înființarea culturii, sub arătura de toamnă, când dozele de îngrășăminte minerale se reduc la jumătate (V. Niță, 2000).

Lucrările solului. Arătura se execută la 25 - 28 cm și se menține curată de buruieni, prin lucrări cu discul urmat de grapă. Pregătirea patului germinativ se efectuează cu combinatorul în preajma semănatului.

Sămânța și semănatul. Rostopasca se înmulțește prin semănat direct în câmp. Perioada de semănat este în august - septembrie sau primăvara de timpuriu. Unii autori recomandă semănatul în luna noiembrie (E. Păun, 1995). Studiile efectuate la SCPMA Fundulea au arătat că epoca optimă de semănat este în pragul iernii (V. Niță, 2000). Se însămânțează la 50 cm rânduri și la 1 cm adâncime, folosindu-se 4 - 5 kg sămânță la ha, pentru realizarea densității de 70 - 80 de plante/m² (A. Mihalea, 1986).

În loturile seminciare, norma de sămânță la semănat este de 3 - 4 kg/ha (V. Niță, 2000).

Lucrările de îngrijire. Cultura se menține curată de buruieni în cursul vegetației, prin prașile între rânduri și pliviri pe rând. Buruienile monocotiledonate anuale sau perene se pot combate cu erbicidele Fusilade (2 l/ha), Furore (2 l/ha) sau Gallant (2 l/ha) aplicate pe vegetație în 300 - 600 l apă/ha (V. Niță, 2000).

În loturile seminciare se înlătură plantele firave, netipice sau bolnave.

Recoltarea. În primul an de cultură se obține o recoltă, iar în anii următori două recolte de herba anual. Recoltarea se face în faza de înflorire deplină a plantelor (A. Mihalea, 1986), prin tăiere cu secera, cu coasa sau cu cositori mecanice sub locul de ramificare al tulpinii.

Condiționarea. După tăierea plantelor, din masa vegetală se îndepărtează buruienile, tulpinile lemnificate și frunzele îngălbenite. După aceasta, produsul se usucă pe cale naturală, la umbră, în strat subțire (la 2 - 3 zile se întoarce cu grijă să nu se sfărme) în încăperi amenajate în acest scop, sau pe cale artificială la 35 - 40 °C. Randamentul la uscare este de cca. 6:1. După uscare, produsul se ambalează în saci textili sau se presează în baloți și se coase în pînză de sac.

Condițiile tehnice de recepție prevăd la impurități maximum 3 % plante decolorate sau brunificate, maximum 1 % tulpini lemnificate și maximum 1 % tulpini fără frunze și flori; corpuri străine organice maximum 1 %, cele minerale maximum 1 %; umiditate maximum 13 %.

Producția de herba proaspătă, la cele două recoltări anuale, este de 20 - 22 t/ha (respectiv 3 - 4 t/ha herba uscată).

4.6. FAMILIA BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

4.6.1. MUȘTARUL ALB ȘI MUȘTARUL NEGRU^{*)} (*Sinapis alba* L. și *Brassica nigra* (L.) Koch.)

Fr: Moutarde blanche; E: White mustard; G: Weisser Senf
Fr: Moutarde noire; E: Black mustard; G: Schwarzer Senf

4.6.1.1 Importanță. Biologie. Ecologie

Materia primă și compoziția chimică. De la muștar se folosesc semințele: *Sinapis albae semen* (muștarul alb), *Sinapis nigrae semen* (muștarul negru).

Semințele ambelor plante conțin ulei gras (30 - 40 %), nescativ (indicele iod 92-120), substanțe proteice (circa 25 %), mucilagi (circa 20 %), substanțe minerale etc., precum și heterozide (glicozide) specifice care dau gustul picant (circa 2 %). Heterozidul (glicozida) din semințele de muștar alb este sinalbozidul (sinalbină), iar în semințele de muștar negru este sinigrozidul (sinigrină). Aceste substanțe în prezența fermentului (mirozinazei), în mediu apos, se transformă în glucoză, sulfat acid și izotiocianatul de p - hidroxibenzil (nevolatil) la muștarul alb, respectiv izotiocianatul de alil (volatil), la muștarul negru (F. Crăciun și colab., 1976, U. Stănescu și colab., 2004, K. Srinivasan, 2005 etc.). În *Farmacopeea Română* figurează sămânța de muștar negru (*Sinapis nigrae semen*) cu un conținut de cel puțin 1 % izotiocianat de alil. Conținutul în sinigrozidă (sinigrină) în *Sinapis nigrae semen* în unele soiuri cultivate este de până la 3 % (I. Ciulei și colab. 1993, L. Stănescu și colab. 2004).

Utilizări. Muștarul alb are utilizări terapeutice limitate. Semințele acestuia, datorită conținutului ridicat de mucilagi, se folosesc ca laxativ (semințe înțreși cu puțină apă în doze diferite, în funcție de gradul de constipație). Esența care se produce în contact cu apa stimulează pofta de mâncare și funcțiile aparatului digestiv. Semințele de muștar alb se folosesc ca și condiment și sursă de ulei vegetal. În industria alimentară, din semințele acestei plante se prepară muștarul de masă (cel din muștarul negru sau vântat are miros înțepător, asemănător cu mirosul de hrean).

^{*)} În cultură este și **muștarul vântat** (*Brassica juncea* L.) mai puțin răspândit decât muștarul alb și muștarul negru.

Muștarul negru se folosește în terapeutică sub formă de semințe măcinate (*Sinapis nigra farina*). Făina de muștar negru în prezența apei și sub acțiunea mîrozinazei, duce la formarea izotiocianatului de alil (0,7 %), numit și esența de muștar (iritant vezicant, lacrimogen, iar, în diluții mari, are proprietăți antibiotice și bactericide) și a altor compuși (glucoză, sulfat acid de potasiu și mucilaginii). Este rubefiant, datorită esenței de muștar (mucilaginile diminuând acțiunea iritantă), fiind indicat ca revulsiv energetic (sub formă de cataplasme sau sinapisme). Cataplasmele activează circulația sîngelui în locul de aplicare, făcând să dispară durerea. Făina de muștar se recomandă și în băi locale sau generale în tratamentul reumatismului, nevralgiilor, răcelii etc. Utilizarea muștarului peste o anumită doză produce inflamații ale tractului gastrointestinal, diaree și afecțiuni ale rinichilor, datorită compușilor iritanți pe care îi conține.

În general utilizarea speciilor de muștar ca sursă de ulei vegetal este limitată, deoarece au un conținut ridicat de acid erucic. Turtele de la extragerea uleiului nu se pot folosi în alimentația animalelor, deoarece irită mucoasa tubului digestiv.

Răspîndire. Muștarul alb este plantă mediteraneeană și din Asia de Vest, iar muștarul negru este răspîndit în Europa Centrală și de Sud. În flora spontană au o răspîndire restrînsă, mai ales ca buruieni în culturi (E. Păun, 1995). Speciile de muștar se cultivă în numeroase țări în scop medicinal, condimentar și ca sursă de ulei vegetal. Suprafața mondială este de cca. 0,5 mil. ha. Furnizorii principali de *Sinapis nigra semen* sunt România, țările fostei Uniuni Sovietice, Turcia, China, India, Pakistan (U. Stănescu și colab., 2004).

Muștarul este cunoscut și ca plantă de nutreț (furaj verde sau siloz) singură sau în amestec cu cerealele, ca îngrășămant verde, precum și ca plantă meliferă (R.A. Boydston, 2004 etc.).

Sistematică. Soiuri. La noi în țară se cultivă mai mult muștarul alb - *Sinapis alba* L. (*Brassica alba* Boiss) și muștarul negru - *Brassica nigra* (L.) Koch (*Sinapis nigra* L.). Mai puțin răspîndit este muștarul vînat - *Brassica juncea* (L.) Czern. Et. Coss. (*Sinapis juncea* L.) (fig 4.6.1., după Flora României, Vol III, 1955 și 4.6.1.a., original) *Brassica juncea* este mai sensibilă la ger, dar mai rezistentă la secetă, se cultivă în Rusia, iar la noi, în estul țării. *B. nigra* (L.) Koch are 2n = 16, iar *S. alba* are 2n = 24 (A. Laza și G. Răcz, 1975).

Din muștarul alb se cultivă soiul local (populația) "Galben de Craiova", din 1975, avînd talia de 60 - 120 cm, 90 - 100 zile perioada de vegetație, semințele conțin cca. 2 % sinalbină, iar producția medie de semințe este de 1200 - 1500 kg/ha.




Fig. 4.6.1. Specii de muștar:

1 - *Brassica nigra* (L.) Koch, inflorescență;

1a - porțiunea inferioară a tulpinii; 1b - silicvă;

2 - *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss.; 3 - *Sinapis alba* L.; 3a - silicvă

Ca muștar negru este răspândit soiul local (populația) "De Timișoară", din 1973, cu talia de 100 - 150 cm, ajunge la maturitate la sfârșitul lunii iulie - începutul lunii august, iar producția medie de semințe este de 1100 - 1400 kg/ha.

Particularități biologice. Speciile de muștar sunt plante ierboase anuale. Rădăcina este pivotantă, adâncă, puțin ramificată. Tulpina este erectă, ramificată și are înălțimea de 50 - 100 cm, la muștarul alb, și de 100 - 150 cm lungime la muștarul negru. Frunzele la muștarul alb sunt de 5 - 15 cm lungime, lirat penat-sectate, cu 3 - 5 lobi inegali, cele bazale pețiolate și cu mai mulți lobi, cele superioare scurt pețiolate și cu mai puțini lobi. Muștarul negru are frunzele inferioare lirat penat - compuse (de cca. 20 cm lungime) și pe măsură ce urcă pe tulpină scade mărimea și se reduc numărul de lobi (cele superioare fiind aproape întregi). Florile sunt dispuse în raceme (la început dense apoi alungite), sunt alcătuite pe tipul 4 (4 sepale, 4 petale, 6 stamine, iar ovarul bicarpelar), cu petale de culoare galbenă, dispuse în cruce. Înfloarește în iunie - iulie, iar polenizarea este alogamă entomofilă. Fructul este o silică. La muștarul alb, silicvele sunt dispuse aproape perpendicular pe ramuri, au lungimea de 3 - 4 cm și lățimea de 5 - 6 mm terminate cu un rostru mai lung decât lungimea silicvei, au gătuțuri, 3 nervuri pe valve și sunt de 1,5 - 2,5 mm, de culoare alb-gălbui spre galben închis, MMB de 4 - 7 g, în contact cu apa devin mucilaginoase. Muștarul negru are semințe ceva mai mici (diametrul de cca 1,2 mm), brunii spre negru, suprafața reticulară, MMB de 2 - 3 g, MH de 65 - 75 kg, devin mucilaginoase în contact cu apa.

Cerințele față de climă și sol. Muștarul alb nu are pretenții deosebite față de factorii climatici. Având perioada scurtă de vegetație (90 - 100 zile) se poate cultiva spre nord până la paralela de 61° (Semințele germinează la 1 - 2 °C, iar plantele tinere rezistă până la -5 °C, însă după formarea a 3 - 5 frunze sensibilitatea la ger crește, suferind sub 0 °C (la -3 °C pot fi chiar distruse). Muștarul negru are sensibilitate mai mare la ger. Față de umiditate, pretenții ceva mai mari are muștarul negru, fiind mai sensibil la secetă decât muștarul alb.

Muștarul alb are pretenții mai reduse față de sol decât muștarul negru. Amândouă plantele dau producții mai bune pe soluri cu textură

mijlocie, fertile, bine aprovizionate cu apă. Pe solurile prea acide, grele, umede și reci, cât și pe cele nisipoase, rezultatele sunt slabe.

Zonare. Muștarul alb se recomandă să se cultive în Câmpia Timișului, Câmpia Crișurilor, Câmpia Bărăganului, Câmpia Burnazului, Câmpia Dobrogei și Câmpia Olteniei (E. Păun și colab., 1983). După M. Alexan și colab. 1991, cele două specii de muștar au ca zone foarte favorabile Câmpia Timișului și Câmpia Crișurilor, iar ca zone favorabile Bărăganul, Câmpia Dobrogei, Câmpia Burnazului, Câmpia Olteniei (județele Dolj și Olt).

4.6.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Speciile de muștar se cultivă după plante care lasă solul curat de buruieni. Nu se amplacează după crucifere și după mac. Muștarul eliberează terenul devreme și este o foarte bună premergătoare pentru cerealele de toamnă. Pe același teren poate reveni numai după minimum 5 ani.

Pentru obținerea materialului de semănat se aleg parcelele cu plante tipice soiului cultivat, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea se face cu 60 - 80 kg/ha P_2O_5 (încorporat cu arătura) și 60 - 70 kg/ha N (încorporat la pregătirea patului germinativ) (S. Male, 1986, R.L. Rezan, 2003).

Lucrările solului. Arătura adâncă (25 - 30 cm) se execută în funcție de eliberarea terenului de planta premergătoare. Patul germinativ se pregătește cu discul urmat de grapă sau cu combinatorul. Speciile de muștar se înmulțesc prin semănat direct în câmp.

Sămânța și semănatul. Speciile de muștar se înmulțesc prin semănat direct în câmp. Se folosește sămânță cu puritatea de 97 % (minimum 95 %), iar germinația de 90 % (minimum 80 %). Se însămânțează primăvara cât mai timpuriu, când se poate ieși la câmp (E. Păun, 1995). Densitatea este cuprinsă între 120 - 130 plante/m², când se însămânțează în rânduri la 50 cm (pe soluri îmburuienate, pentru a se putea prași) și 500 - 550 plante/m², când se însămânțează în rânduri apropiate, la 12,5 cm (S. Male, 1986). Se poate semăna și la 25 cm (E. Păun, 1995), după cum rezultă și din rezultatele obținute de I. Braga și S. Male, la SCPMA Fundulea (tabelul 4.6.1.1., după A. Dumitrescu, 1986).

În condițiile din vestul țării, producția de semințe și ulei a fost mai mare în cazul semănatului la 50 cm între rânduri, asigurând sporuri față de semănatul la 12,5, 25 și 37,5 cm între rânduri (tab. 4.6.1.2., după R.L. Rezan, 2003). Semănatul se face cu semănători

universale (SUP-21 sau SUP-29), în rânduri, la distanțele amintite și la adâncimea de 2 - 3 cm. Se folosesc 10 - 14 kg sămânță la ha, în funcție de valoarea culturală și densitate (R.L. Rezan, 2003).

Tabelul 4.6.1.1.

Distanța de semănat (cm)	Producția de fructe		
	g/ha	%	Dif
12,5	14,8	118	2,3
25	14,9	119,2	2,4
50	12,5	100	-

Tabelul 4.6.1.2.

Producția la muștar alb în funcție de spațiul de nutriție (distanța între rânduri) în condițiile de la Timișoara (sinteză pe anii 2000-2002)

Factorul A - Distanța între rânduri (cm)	Factorul B - Cantitatea de sămânță (kg/ha)			Mediile factorului A			
	6	10	14	Recoltă (kg/ha)	%	Dif.	Semnif.
12,5	991	1176	1202	1113	100	-	-
25	1078	1265	1324	1222	109	-	-
37,5	1158	1334	1396	1296	116	183	x
50	1276	1372	1567	1405	126	292	xx

DL 5 % = 150 kg/ha
1 % = 271 kg/ha
0,1 % = 384 kg/ha

Mediile factorului B			
Recoltă (kg/ha)	1125	1279	1372
%	100	113	121
Diferența	-	154	247
Significația	-	-	x

DL 5 % = 166 kg/ha
1 % = 272 kg/ha
0,1 % = 328 kg/ha

Lucrările de îngrijire. Buruienile se combat prin prașile în cazul semănăturii la 50 cm și pliviri. Buruienile monocotiledonate se combat cu erbicide Triflurrom (3 - 4,5 l/ha), Balan (6 - 7 l/ha), Dual 500 (4 - 5 l/ha), Ro-Neet (5 - 7 l/ha) etc. încorporate o dată cu pregătirea patului germinativ. Pe vegetație, se pot aplica erbicidele Lontrel 100 (1 - 2 kg/ha) sau Fusilade (2 - 3 l/ha) (N Șarpe și Gh. Stejărean, 1981). Pentru combaterea dăunătorilor (purici, gândaci, viespi etc.) se fac prăfuituri cu Lindatox 3 PP (20 - 25 kg/ha), Melipax 10 PP (20 - 25 kg/ha) sau stropiri cu Nogos 100 CE 0,1 %, Pinetox 50 GE 0,3 % etc. la apariții gândacilor (larvelor, la viespe) (S. Male, 1982; B. Bobârnac, 1983). Prin alternanță, se pot folosi și produsele Sinoratox 35 CE (2 l/ha), Decis 2,5 EC (0,05 %), Sumi-alfa 2,5 EC (0,02 %), Zolone 35 CE (0,2 l/ha), ultimul fiind selectiv pentru albine,

fiind recomandat în timpul înfloririi (V. Dulămea, 2000). Cu 2 - 3 stapi de albine/ha se favorizează polenizarea și se obține și o producție de miere.

În loturile semincere se fac purificări biologice, înlăturându-se plantele netipice, în vederea recunoașterii culturii.

Recoltarea. Muștarul se recoltează când cca. 70 % din plante au ajuns la maturitate, cu combina adaptată în acest scop. Se are în vedere că muștarul negru (și vânat) se scutură mai ușor decât muștarul alb, de aceea nu trebuie să se întârzie recoltarea.

Loturile semincere se recoltează, se treiere și se condiționează separat de alte culturi de muștar.

Condiționarea. După recoltare, semințele se aduc la umiditatea de păstrare (12 %) prin uscare, se condiționează și se păstrează în magazii curate și aerisite.

Condițiile tehnice de recepție pentru muștarul alb admis ca impurități: alte părți din plantă și semințe zdrobite, maximum 3 %; corpuri străine organice, maximum 1 %, cele minerale, maximum 1 %, iar umiditatea maximum 12 %.

Condițiile tehnice de recepție pentru muștarul negru prevăd ca impurități, alte părți din plantă, semințe zdrobite: maximum 3 %, alte specii de muștar (*Sinapis arvensis* s.a.) maximum 3 %; corpuri străine organice, maximum 1 %, cele minerale, maximum 1 %, iar umiditatea de maximum 12 %.

Producția de semințe se situează în limitele de 15 - 20 q/ha, la cele trei specii de muștar.

flori mai mici (corola mai scurtă decât caliciul), corola galbenă, la începutul înfloririi, ulterior putând lua și nuanțe violacee, precum și prin pînteni mai lungi.

4.7. FAMILIA VIOLACEAE

4.7.1. TREI-FRAȚI-PĂTAȚI (*Viola tricolor* L.)

Fr: Pensée sauvage, Violette tricolore; E: Pansy;

G: Stiefmutterchen

4.7.1.1 Importanță. Biologie. Ecologie

Planta se mai numește și : panseluță de câmp, toporaș etc.

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă o constituie întreaga parte aeriană a plantei (*Viola tricoloris herba* sau *Jaceae herba*), fără rădăcină, recoltată la înflorire.

Produsul conține saponozide triterpenice, mucilagii, esteri ai acidului salicilic, pigmenți antocianici, rutozid, ulei volatil, tanin, săruri minerale etc. (F. Crăciun și colab., 1976; J. Laparra și colab., 1976, I. Ciulei și colab., 1993, M. Tămaș și colab., 2005). Saponinele triterpenice, alături de flavonozide contribuie la imprimarea acțiunii farmacodinamice (E. Grigorescu și colab., 2001).

Utilizări. Are acțiune diuretică și depurativă, datorită saponozidelor și rutozidului, expectorantă (datorită saponozidelor), antialergică și laxativă. Se indică în tusea rebelă și afecțiunile renale. Intră în compoziția ceaiului depurativ și a ceaiului pectoral nr. 2. Peste o anumită doză, poate determina o acțiune purgativă drastică sau chiar vomitare.

Răspândire. Crește spontan (ca buruiană) în toate continentele. Specia este originară din zonele temperate ale Europei și Asiei. La noi crește în etajul montan și subalpin, în lunci umede, fânețe, margini de păduri și terenuri stâncoase. S-a luat în cultură pentru a se asigura necesarul de materie primă, deținând suprafețe mai mari în Franța și Olanda (principalul furnizor al produsului vegetal).

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Viola tricolor* L. și are $2n = 20, 24, 26$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). (Fig. 4.7.1., după Flora României, vol. III, 1955 și 4.7.1.a., original).

Înrudită cu *Viola tricolor* L. și cu aceleași utilizări este o altă specie din flora spontană *Viola arvensis* Murr., care crește în toate zonele țării, în terenuri cultivate și necultivate, însă la altitudini mai mici decât specia precedentă. Se deosebește prin frunze mai alungite,



Fig. 4.7.1. *Viola tricolor* L.

Din specia *Viola tricolor* L., la noi în țară se cultivă soiul local (populația) "De Feleac", din anul 1980.

Particularități biologice. *Viola tricolor* L., este o plantă anuală sau hibernantă, erbacee. Rădăcina este subțire, puțin dezvoltată. Tulpina arcuie la bază sau ascendentă de 10 - 40 cm înălțime și acoperită cu peri scurți. Frunzele inferioare sunt lung pețiolate și ovate, spre vârful tulpinii devin tot mai scurt pețiolate și limbul se îngustează; cele superioare fiind cu pețiolul foarte scurt și alungit lanceolate. La baza frunzelor se află stipele lungi până la 30 mm, penate, cu lobul terminal mai lung. Florile sunt situate pe pedunculii lungi (3 - 12 cm), porniți de la subsuara frunzelor superioare, prevăzuți cu două bracteele membranoase. Florile au 15 - 20 mm lungime; caliciul format din 5 sepal de 1,5 - 5 mm lungime și cu apendice de 1,5 - 4 mm lungime; corola mai mare decât caliciul, compusă din 5 petale (cea inferioară galbenă, cu 5 - 7 dungi mai închise la culoare, cu un pinten albăstrui, de 3 - 6 mm, cele două petale superioare de culoare violetă, rar alb - gălbui, iar cele laterale albe, galbene sau albăstrui); androceul din 5 stamine; gineceul cu ovar superior din trei carpele. Înfloarește din mai până în august. Fructele sunt capsule ovale de circa 1 cm, cu caliciul persistent, la maturitate desfăcându-se în trei valve. Semințele sunt mici, cu carunculă redusă și MMB de circa 0,6 g.

Cerințele față de climă și sol. Specia *Viola tricolor* L. are rezistență bună la temperaturi scăzute. Nu rezistă la temperaturi prea ridicate. Cerințele față de umiditate sunt destul de mari. Nu suportă seceta. Crește bine pe soluri cu textură mijlocie, permeabile și fertile (A. Lankinen, 2000)

Zonarea. Se recomandă cultivarea în județele Cluj, Sălaj, Suceava, Neamț și Prahova (F. Crăciun și colab., 1976).

4.7.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Specia *Viola tricolor* L. se cultivă după plante care lasă terenul curat de burieni (prășitoare bine întreținute), pe același teren putând reveni după 2 - 3 ani. În cultură poate rămâne doi ani; în anul trei cultura se menține numai în cazul când plantele sunt viguroase, iar terenul este fertil și lipsit de buruieni (M. Alexan și colab., 1991).

Loturile semincere se amplasează izolat la 500 - 1500 m distanță de alte culturi cu această plantă.

Fertilizarea se face cu 50 - 60 kg/ha P_2O_5 și circa 40 kg/ha K_2O (tomna) și 40 - 50 kg/ha N (primăvara).

Lucrările solului. Arătura se face la 25 - 28 cm adâncime și se menține curată de buruieni, prin lucrări cu discul urmat de grapă, iar patul germinativ se pregătește cu combinatorul în preajma semănăturii.

Sămânța și semănatul. *Viola tricolor* L. se înmulțește prin semănat direct în câmp. Sămânța trebuie să aibă puritatea de cel puțin 90 %, iar germinația peste 70 %. Semănatul se face toamna târziu sau primăvara devreme, în rânduri duble (45 - 50 cm între benzi și 12 - 15 cm între rânduri apropiate), la 0,5 - 1,5 cm adâncime, folosindu-se cca. 6 kg/ha sămânță (amestecată cu 1-3 părți material inert și 100 - 150 g sămânță de salată - ca plantă indicatoră) (M. Alexan și colab., 1991).

Lucrările de îngrijire. În cei doi (eventual trei) ani cât durează cultura solul se menține curat de burieni și afănat, prin prașile și pliviri, de câte ori este nevoie.

În loturile semincere se execută purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și cele bolnave.

Recoltarea. Herba se recoltează la înflorire pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua. Plantele se taie cu seceri, coase sau cositori mecanice (în funcție de suprafață), la 4 - 5 cm de la colet, pentru a putea regenera. Loturile semincere se recoltează la maturitatea semințelor, dinmăea (pe rouă), prin tăierea plantelor (cu secera sau cu coasa), urmând ca după uscare să se treie, iar semințele se condiționează și se păstrează în saci.

Condiționarea. După recoltare, produsul se pune la uscat. Uscarea se face pe cale naturală (în strat subțire) în încăperi aerisite și amenajate special, sau pe cale artificială la 45 - 50 °C. Randamentul la uscare este 5 - 6 : 1.

Condițiile tehnice de recepție a produsului medicinal (*Viola tricoloris herba*) în stare uscată prevăd: ca impurități - plante decolorate, maximum 4 %, tulpini fără flori și frunze, maximum 2 %; plante cu rădăcini nefind admise; corpuri străine organice, maximum 4 %, cele minerale, maximum 1 %, iar umiditatea maximum 13 %.

La produsul în stare proaspăt, de asemenea, nu se admit plante cu rădăcini, iar ca impurități: plante decolorate, maximum 4 %, tulpini fără flori și frunze, maximum 2 %; corpuri străine organice, maximum 4 %, cele minerale maximum 0,2 %, iar umiditatea normală a produsului proaspăt la recoltare (fără urme de apă).

Producția care se realizează la ha este de 4 - 6 tone în stare proaspătă, din care rezultă cca. o tonă de produs în stare uscată.

Producția se sămânță la trei-frați-pătați este de 100 - 150 kg/ha

4.8. Familia HYPERICACEAE (GUTTIFERAE, CLUSIACEAE)

4.8.1. SUNĂTOAREA (*Hypericum perforatum* L.)

Fr: Milpertuis; E: Common St. John's wort;

G: Echtes Johanneskraut.

4.8.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Sunătoarea (pojarmita, iarba lui Sf. Ion) este o plantă medicinală veche, cunoscută din antichitate, fiind amintită (o specie care este răspândită în Grecia) de Plinius, Hypocrates (M. Gușuleac și E. I. Nyárády, 1956) și Dioscorides (H.P. Dörfler și G. Roselt, 1984).

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă (*Hyperici herba*) o constituie părțile terminale ale plantei (20 - 30 cm) la începutul înfloririi, partea cea mai groasă a tulpinii să nu depășească diametrul de 2 mm.

Părțile aeriene conțin 0,05 - 0,1 % ulei volatil (florile au 0,4 - 0,5 % ulei volatil), derivații polifenolici; tanin (până la 12 %), pigmentul (roșu - violet, aproape negru) hipericina (în flori 0,2 - 0,3 %, mai redus în celelalte organe) etc. (F. Crăciun și colab., 1976, W. Debska și colab., 1982, G. Pintore și colab., 2005, A. Raucic și colab., 2005). Uleiul este localizat în punctele transparente din frunze (care dau aspectul de perforat), iar hipericina, în punctele negre de pe suprafața plantei. Materia primă autohtonă conține 0,13 - 0,3 % hipericină, mai bogate fiind probele din zonele localităților Ploiești, Cluj, Pitești (E. Coiciu, 1967). Conținutul de hipericine (în special hipericină și pseudohipericină) poate varia între 0,06 - 0,75 % (în boboci) și 0,01 % (în părțile inferioare ale plantei, care un sunt permise în produs); un conținut minim de 0,04 % hipericină totală fiind necesar pentru asigurarea calității farmaceutice a produsului vegetal (U. Stănescu și colab., 2004). Cercetările întreprinse la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca (tabelul 4.8.1.1.) au relevat faptul că herba are conținutul cel mai ridicat de hipericină (0,7 %) și flavoane (8,7 %) la începutul înfloririi, iar conținutul de ulei volatil crește continuu de la butonizare (0,12 %) până la sfârșitul înfloririi (0,36 %).

Tabelul 4.8.1.1.

Conținutul în principii active în funcție de faza de vegetație
(USAMV Cluj-Napoca)

Faza fenologică	Conținutul în principii active		
	Ulei volatil ml %	Flavone g %	Hipericină g %
Înainte de butonizare	0,08	6,8	0,21
Butonizare	0,12	8	0,46
Începutul înfloririi	0,12	8,7	0,7
Înflorire deplină	0,2	6,5	0,32
Sfârșitul înfloririi	0,36	5,3	0,109

Utilizări. Principiile active din sunătoare au efect cicatrizant și antiseptic (hipericina), astringent (taninul) și spasmolitic (uleiul volatil). Se indică în plăgi și arsuri, precum și în colite, diaree, colicistopatii și gargarisme. Se folosește ca infuzie (2 %), iar uleiul de sunătoare (macerarea produsului într-un ulei vegetal) este recomandat în tratamentul arsurilor. Hipericina este utilizată și în tratamentul stărilor depresive (J.F. Rodriguez - Landa și C.M. Contreras, 2003, A.J.P. Francis, 2005). Intră în compoziția unor **ceaiuri: hepatic nr. 2, anticolitic, gastric nr. 2. Hyperici herba** figurează în *Farmacopeea Română*.

Sunătoarea produce fotosensibilitate. Persoanele care o folosesc nu trebuie să se expună la soare ("băi de soare") deoarece apare o roșeață a pielii, tumefiere (edem), prurit (mâncărime), umflarea buzelor și pleoapelor și chiar conjunctivită. Reacțiile de fotosensibilizare (datorate hipericinelor fotoactive) la expunerea prelungită la soare (sau la radiații UV) pot apărea la persoanele blonde, însă în mod normal dozele terapeutice active sunt de 30 - 50 de ori mai mici decât dozele fotosensibilizante (U. Stănescu și colab., 2004).

Hipericina (extracte standardizate) intră în compoziția unor medicamente antidepresive (**Hyperforat** - drajeuri, picături, fiole; **Jarsin** - drajeuri; **Psychotonin** - tinctură), iar extractele standardizate în hipericină, flavone și hiperforină, se folosesc în preparatul antidepresiv **Laif 600**, preparatele **Inconturina** și **Rahoival** (drajeuri, picături), folosite în tulburările de mișcune (în urologie), au în compoziția lor produsul vegetal al acestei plante (U. Stănescu și colab., 2004).

Răspândirea. Sunătoarea este răspândită aproape pe tot globul. Este originară din Europa și Asia de Vest. La noi în țară este frecventă în zona de câmpie și de dealuri. S-a luat în cultură datorită cerințelor tot mai mari de materie primă de la această plantă. Țările

din Europa de Vest sunt producătorul principal al acestui produs vegetal.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Hypericum perforatum* L. (fig. 4.8.1. după Flora României, vol. IV, 1956 și 4.8.1.a., original).

În cadrul genului *Hypericum*, în flora spontană se mai întâlnesc și speciile: *H. hirsutum* L., cu tulpini și frunze pătoase; *H. acutum* Munch, are tulpina cu 4 muchii, îngust aripate și separe lanceolate, acute; *H. maculatum* Cr., prezintă tulpini în 4 muchii, nearipate, separe eliptice până la ovate; *H. montanum* L., cu separe finbriate (cu glande negre) și petale nepunctate; *H. elegans* Steph., care are separe pe margini, cu finbrii glandulifere și frunze atenuate spre vârf (M. Gușeleac și E.I. Nyárády, 1956; E. Coiciu și G. Răcz, 1962).

Atât la noi cât și în alte țări, în medicina științifică sau populară (alături de *H. perforatum*), mai au utilizări și alte specii din genul *Hypericum*, după F. Crăciun și colab., 1976: (*H. acutum* Munch (*H. quadrangulum* L.), care are compoziția chimică și acțiunea similară cu a speciei *H. perforatum* L., *H. maculatum* Cr. și prezintă numai puncte negre nu și transparente, este utilizată în medicina empirică în tuberculoză, acnee etc., *H. elegans* Steph. (Floare de frigur), are tulpină cu 4 muchii, frunză lanceolată și este folosită empiric în "figuri".

Din specia *Hypericum perforatum* L., la noi în țară se cultivă soiul local (populația "De Secuieni", din 1975.

Particularitățile biologice. Sumătoarea este o plantă perennă, ierboasă. În sol prezintă un rizom scurt și un sistem radicular bine dezvoltat. Tulpina are înălțimea de 30 - 100 cm, grosimea de 3 - 5 mm, cilindrică, cu două muchii longitudinale, glabră lignificată la bază ramificată în partea superioară, cu numeroase ramuri sterile formate de la axilele frunzelor. Frunzele sunt sesile și dispuse opus, au forma ovat eliptică, de până la 3 cm lungime (pe ramurile sterile până la 1 cm lungime), sunt glabre, pe față cu puncte translucide (care privesc în transparență au aspect perforat, de unde și trage numele de "perforatum") și puncte (glanduloase), negre. Florile sunt formate din 5 separe lanceolate (lungi de 5 - 7 mm), 5 petale de culoare galben intens de 10 - 13 mm lungime și până la 8 mm lățime, multe stamine (cca. 80) și gineceu tricarpelar cu trei stiluri. Înflorirea are loc din luna iunie până în septembrie. Fructele sunt capsule ovale cu trei loje. Semințele sunt mici, cilindrice de circa 1 mm lungime și 0,4 mm grosime, brun negricioase, cu MMB de cca. 0,123 g.



Fig. 4.8.1. *Hypericum perforatum* L.
a - frunză

Cerințe față de climă și sol. Sunătoarea este o specie cu mare plasticitate ecologică, având cerințe reduse față de climă. Crește în condiții variate de temperatură și precipitații, pe un mare areal, fiind ceva mai pretențioasă față de lumină. Are cerințe reduse față de sol, însă producții mai mari se obțin pe soluri fertile, drenate, cu regim hidric favorabil. Nu preferă solurile grele care formează crustă, nici cele cu apă stagnantă.

Zonare. Este răspândită în flora spontană din țara noastră de la câmpie până în zona subalpină, mai frecvent în zona deluroasă. După M. Alexan și colab., 1991, cele mai favorabile condiții de cultură sunt în județele Cluj, Sălaj și Dâmbovița. Condiții favorabile oferă județele Bihor, Arad, Mehedinți, Argeș, Vrancea, Suceava, Botoșani, Neamț și Bacău.

4.8.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Sunătoarea se amplacează în afara asolamentului, fiind planta perenă, iar cultura durează mai mulți ani. Se cultivă după leguminoase, cereale păioase sau prășitoare timpurii bine întreținute. Pe același teren poate reveni numai după 6 - 7 ani (M. Alexan și colab., 1991). Pentru obținerea de sămânță se aleg parcelele cu plante tipice, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea se face cu 50 - 60 kg/ha P_2O_5 și 25 - 35 kg/ha K_2O (toamna) și 80 - 100 kg/ha N (primăvara) (G. Pânzaru, 1986). Dozele se stabilesc în funcție de fertilitatea solului și planta premergătoare, îngrășămintele asigurând sporuri de 25 - 30 % (V. Plugaru, 2000).

Lucrările solului. Arătura se face la 25 - 30 cm adâncime și se menține curată de buruieni, până la semănat, prin lucrări cu discul în agregat cu grapa. Patul germinativ se pregătește cu mare atenție, planta având semințe mici. Terenul trebuie să fie mărunțit și nivelat, folosindu-se în acest scop combinatorul. Înainte de semănat, terenul se tăvălușește.

Sămânța și semănatul. Sunătoarea se înmulțește prin semănat direct în câmp. Se folosește sămânță cu puritatea de 85 % (minimum 70 %) și germinația de 60 % (minimum 50 %). Semănatul se face cu semănători - universale (SUP-21, SUP-29) adaptate pentru semințe mici, toamna târziu sau în pragul iernii, în rânduri la 50 cm distanță și la adâncimea de 0,5 cm (E. Păun, 1995). Cantitatea de sămânță la ha este de circa 4 kg, amestecată cu balast (în proporție de 1 : 2), pentru o distribuție mai uniformă și cu o plantă indicatoare (pe soluri îmburuienate) (M. Alexan și colab., 1991).

Lucrările de îngrijire. În primele faze plantele de sunătoare cresc lent, buruienile putând compromite cultura. Se menține solul curat de buruieni prin prașile și pliviri ori de câte ori este nevoie. Pe soluri îmburuienate, dacă s-a semănat cu o plantă indicatoare, se face o prașilă (oarbă) între rânduri, înainte de răsărirea sunătoarei (când rândurile sunt marcate de planta indicatoare). În cazul atacului de făinare (*Erisiphe hiperici*) se fac tratamente pe vegetație cu Benlate 50 WP sau Derosal 60 WP, în concentrație de 0,1 % (V. Plugaru, 2000).

În loturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. Herba se recoltează de la începutul înfloririi (25 - 30 %) până la înflorirea deplină. Din cercetările întreprinse la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca (tabelul 4.8.1.2.) s-a constatat că producția de herba verde a fost la butonizare de 20,3 q/ha, la înflorirea deplină de 31,4 q/ha, iar la sfârșitul înfloririi, de 36,8 q/ha; conținutul maxim de hipericină și flavone fiind la începutul înfloririi, iar cel de ulei volatil, la sfârșitul înfloririi (tabelul 4.8.1.1.).

Se recoltează partea superioară nelignificată a plantei (cca. 25 cm de sus), cu secera, coasa sau cositoarea mecanică (reglate să taie la cca. 25 - 35 cm de la sol).

Tabelul 4.8.1.2.
Producția de herba la sunătoare în funcție de faza de vegetație
(USAMV Cluj-Napoca)

Faza de vegetație	Producția de herba	
	q/ha	%
Înainte de butonizare	10,2	32,4
La butonizare	20,3	64,7
La înflorirea deplină	31,4	100
Sfârșitul înfloririi	36,8	117,2

Loturile semincere se recoltează când semințele se brunifică, prin tăierea plantelor care după uscare se treieră, iar semințele se condiționează.

Condiționarea. Materia primă vegetală recaltată se usucă pe cale naturală sau artificială. În mod natural, uscarea se face la umbră, în încăperi curate și aerisite, în strat subțire, întorcându-se din timp în timp cu atenție să nu se scuture frunzele. Artificial, uscarea se face la 35 °C. Randamentul la uscare este de 3 - 4 : 1.

Condițiile tehnice de recepție admit ca impurități: maximum 5 %, flori brunificate, maximum 5 % tulpini ce depășesc diametrul de 2 mm (însă sub 4 mm diametru), maximum 1 %, tulpini fără flori și

frunze. Corpuri străine organice se admit maximum 1 %, cele minerale maximum 0,5 %, iar umiditatea maximum 13 %.

Producția medie de herba uscată este de 12 - 15 q/ha.

Producția se sămânță la sămănare este de 100 - 150 kg/ha

4.9. FAMILIA ELAEAGNACEAE

4.9.1. CĂȚINA

(*Hippophaë rhamnoides* L.)

Fr: Argousier; E: Sea buckthorn; G: Sanddorn

4.9.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie.

Cățina, numită și cățina albă sau cățina de râu etc., este răspândită în țara noastră și este recoltată din flora spontană. Ea a fost introdusă în cultură și la noi în țară datorită cerințelor tot mai mari de materie primă, fiind considerată o adevărată poliovitamină naturală, cu multiple utilizări în medicină și în diverse industrii.

Materia primă și compoziția chimică. În scopuri farmaceutice se folosesc fructele de cățină (*Hippophaë fructus*), care au o compoziție complexă. Fructele de cățină conțin vitamine hidrosolubile și liposolubile (C, E, B₁, B₂, B₆, PP), carotenoide (provitamina A), flavonoide (vitaminoid P), proantociani, ulei volatil și ulei gras, pectine etc. (E. Grigorescu și colab., 2001, I. Brad și colab., 2002, M. Tămaș și colab., 2005 etc.). Fructele conțin 400 - 1500 mg % acid ascorbic, iar conținutul de ulei gras (*Oleum Hippophaës*) în pericarpul fructului este de 12 - 14 %, fiind, după uleiul de palmier, cel mai bogat material natural în carotenoide și indeosebi în β - caroten (E. Grigorescu și colab., 2001 etc.). Frunzele conțin cantități remarcabile de serotonină (I. Brad și colab., 2002).

Utilizări. Fructele de cățină sunt o importantă sursă de polivitamine, fiind considerate adevărate "polivitamine naturale" și folosite în compoziția ceaiurilor vitaminizante (E. Grigorescu și colab., 2001 etc.). Sucul din fructele de cățină se folosește la prepararea unor comprimate polivitaminizante. Uleiul gras, obținut prin presare la rece, are acțiune cicatrizantă. În unele țări, uleiul este utilizat în tratamentul ulcerului și arsurilor, precum și în tratamentul unor dermatoze și micoze. I. Brad și colab., 2002, menționează efectul fotoprotector, radioprotector, antitumoral și imunostimulator etc. al produselor obținute din cățină. Substanțele fiziologic active din cățină reglează metabolismul în ansamblul lui și nu conduce la perturbări metabolice cu consecințe negative (I.L. Brad, I. Brad și colab., 2002). Fructele de cățină prelucrate sub formă de suc, gem, sirop, vin, lichior

se pot folosi ca aliment tonifiant general al organismului, în calitate de polivitamină naturală. În unele țări se utilizează și frunzele bogate în vitamina C.

Răspândire. Cătina este o specie eurasiatică, cu o arie naturală de răspândire de la Oceanul Atlantic la Oceanul Pacific, deținând o pondere mai mare în Asia Centrală (I. Brad și colab., 2002). În țara noastră crește din zona litorală până în cea montană, o extindere mai mare având pe pantele și albiile râurilor din Muntenia și Moldova, în Dobrogea și Dela Dunării. Este o plantă foarte bună fixatoare a terenurilor supuse erodării (datorită drăgonării puternice).

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Hippophaë rhamnoides* L. (fig. 4.9.1., după Flora României, vol. IV, 1956 și 4.9.1.a., original). Această specie cuprinde subspeciile: *Eur-rhamnoides* (L.), (cu diferite varietăți); *Salicifolia* (Don); *Tibetana* (Schlecht), *Carpatica* (I. Topa 1960) (I. Brad și colab., 2002).

În cultură sunt diferite populații, studiate la Institutul de Cercetări Pomicole Mărăcineni, Stațiunea de Cercetări Pomicole Baciu etc. S-au obținut și unele forme fără ghimpi, cu însușiri superioare privind culoarea, forma și mărimea fructului, însușirile de producție și calitate. Valoarea materialului biologic autohton este prezentată în detaliu de I. Brad și colab., 2002, pe baza studiilor efectuate în diferite unități de cercetare în ultimele decenii.

Ca material de înmulțire se poate utiliza și cel din flora spontană, alegând în acest scop, plante cu fructe multe și cât mai puțini ghimpi.

Particularități biologice. Cătina este un arbust foarte ramificat, tufos și spinos, de 1 - 3 (6) m, acoperit cu peri solzoși și stelați de culoare albicioasă. Este unisexuat - dioică, cu plante (tulpini) cu flori masculine și plante cu flori femele, însă s-au identificat și exemplare hermafrodite (E. Păun, 1995). Frunzele sunt dispuse altern, întregi, îngust lanceolate, de 2 - 6 cm lungime, pe partea inferioară cu peri stelați argintii. Florile unisexuat - dioice apar înaintea frunzelor, sunt mici, galbene, dispuse în inflorescențe (cele masculine cu aspect globulos, având două sepale și patru stamine, iar cele femele ușor alungite, cu două sepale). Fructul este o drupă falsă, de formă ovoidă, lungă de 6 - 8 mm, lată de 4 - 5 mm, de culoare portocalie, cărnosă, cu un sâmbure tare. Fructele rămân pe ramuri și după căderea frunzelor. Pulpa fructului provine din receptacul, iar sâmburele este o achenă ovoidă. Înfloarește în martie-aprilie, iar fructele ajung la maturitate în august-septembrie. Fructifică abundant începând de la vârsta de 4 - 5 ani (pe rămurele de doi ani mai ales spre vârful

acestora) (I. Brad și colab., 2002). Aceiași autori menționează însușirea cătinei de a asimila azotul, în nodozitățile formate pe rădăcini, prin simbioză cu bacterii (ca și leguminoasele) sau o ciupercă din genul *Actinomicetae*.



Fig. 4.9.1. *Hippophaë rhamnoides* L.
a - ramură floriferă; b - ramură fructiferă;
c - păr solzos stelat

Cerinte față de climă și sol. Cătina este o plantă cu rezistență deosebită față de condițiile pedoclimatice. Are o foarte bună rezistență la secetă, ger și nu are pretenții deosebite față de sol. Vegetează în climă foarte variată, cu deosebire continentale. Este iubitoare de lumină, vegetând bine în locuri deschise, luminoase și călduroase. Valorifică terenurile nisipoase, prundișuri, soluri crude, terenuri în pantă, fixând solul prin drajonare puternică. Terenurile supuse eroziunii, improprii altor culturi, se pot cultiva cu cătina, specie extrem de valoroasă.

Zonare. Cultura cătinei se recomandă în arealele de răspândire naturală, în diferitele zone agricole ale țării. Se poate folosi ca și plantă fixatoare la terenurile supuse erodării și pe soluri ușoare, mai puțin propice altor plante. F. Crăciun și colab. 1976 arată că la formele spontane din zona de deal din jud. Buzău, Prahova, Argeș, Dâmbovița, conținutul în vitamina C este mai ridicat decât în jud. Bacău și în Delta.

4.9.1.2 Tehnologia de cultivare

Rotăția. Cătina, fiind plantă perenă, se amplasează în afara asolamentului, după diferite plante de cultură. Se va cultiva pe parcele de diferite mărimi, în funcție și de configurația terenului.

Fertilizarea. La înființarea culturii se aplică 30 - 40 t/ha gunoi de grajd, apoi anual îngrășăminte minerale în funcție de fertilitatea solului.

Lucrările solului. Înainte de înființarea culturii, toamna se efectuează o arătură de desfundat la circa 50 cm sau arătură adâncă la 30 cm, cu care se încorporează în sol îngrășămintele organice. Până la plantare se menține terenul curat de buruieni prin lucrări cu discul sau cultivatorul.

Înmulțirea. Cătina se înmulțește obișnuit vegetativ, prin butași din rădăcină (drajoni) (E. Păun, 1995, I. Brad și colab., 2002), însă se poate înmulți și prin sămânță, producând răsad în pepinieră (I. Brad și colab., 2002).

Înmulțirea vegetativă. Butașii se plantează toamna sau primăvara timpuriu la distanța de 3x1,5 - 2m, în raportul de opt plante

femele și două plante masculine, față de care nu se obțin fructe. **Înmulțirea prin răsad.** Semițele (după ce se înlătură pulpa) se înșămânțează în pepinieră toamna sau primăvara (2 - 3 g sămânță la m linier, rezultând circa 30 plante/m). Răsadul de cătina este apt pentru

circa 10 mii plante/ha, în gropi făcute manual sau mecanic, asigurându-se udatul dacă este cazul, pentru prindere.

Lucrările de îngrijire constau în prașile mecanice între rânduri și manuale pe rând, ori de câte ori este nevoie, pentru a menține terenul afănat și curat de buruieni în cursul vegetației.

Recoltarea fructelor se poate face începând din luna august (când au culoarea portocalie) până la primul îngheț (care provoacă scăderea accentuată a conținutului în vitamina C). Fructele se desprind de pe ramuri cu foarfecile (se taie ciorchinii ce poartă fructele) sau prin „bătutul” tufelor (metoda productivă, însă calitatea fructelor scade, fiind amestecate cu impurități iar în parte sunt zdrobite).

Condiționarea. După recoltare se înlătură impuritățile (frunze sau ramuri) din produs, apoi fructele se pun în lădițe sau coșuri căptușite cu hârtie, pentru a fi transportate la locul de prelucrare. Fructele recoltate nu se țin la soare mai mult de 2 - 3 ore, ci vor fi transportate în cel mai scurt timp la centrelor de colectare specializate, unde se vor congela sau se vor usca.

Congelarea se realizează în două faze, întâi o răcire la 2 °C, apoi congelarea la temperatura de -35 °C, până la -40 °C, în această stare putând fi transportate la fabrici pentru prelucrarea industrială.

Uscarea se face numai artificial la 50 - 60 °C, pentru ca procesul să se realizeze rapid. Uscarea lentă, pe cale naturală, determină pierderi mari în vitamina C. Randamentul la uscare este de 4 - 5 %.

Condițiile tehnice de recepție prevăd ca impurități, resturi de codițe - max 1 %, fructe înegrite, zdrobite, pătate - max 1 % și fructe nedevelopate sau supracapte - max 5 %, corpuri străine minerale - max 0,5 %. Nu se admit fructe lipite între ele și corpuri străine organice. Umiditatea va fi cea normală a fructului proaspăt.

Producția. De la o tufă de cătina se pot obține între 4 - 9 kg fructe, iar de pe un hectar plantație se pot realiza în medie 9000 kg (6000 - 12000 kg) fructe (I. Brad și colab., 2002). Randamentul de suc al pulpelor de cătina este de circa 75 %.

4.10. Familia ROSACEAE

4.10.1. TRANDAFIRUL PENTRU ULEI (Trandafirul de damasc) (*Rosa damascena* Mill.)

Fr: Rose de Damasc, Rose pale;

E: Damask rose, Rose of Damask; G: Damaszner Rose

4.10.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Trandafirul se cultivă din antichitate în Persia, China, Grecia și Imperiul Roman, primele inscripții pe metal referitoare la trandafir (în mormintele din Atai) datând de circa 4000 de ani î.e.n., iar surse scrise și găsite în Egipt arată faptul că trandafirul era cunoscut în sec. 13 î.e.n. (în timpul domniei lui Ramses al II-lea). Despre trandafir și uleiul său fac referiri autorii antici greci, Homer (în *Iliada* și *Odissea*, sec. VIII, î.e.n.), Herodot (sec. V, î.e.n.), Teophrast (sec. IV, î.e.n.) și în Imperiul Roman (Horațiu, Ovidiu, Virgiliu, Cicero, Plinius), trandafirul fiind considerat sacru, simbol al nevinovăției și frumuseții (E. Păun, 1988). Trandafirul de Damasc, arată același autor, este una din cele mai apreciate plante aromatice, decorative, antierozionale și pentru îngrădiri, petalele și fructele sale fiind folosite în prepararea unor produse aromatice, a unor băuturi (vin, ceai), dulciuri, oțet, medicamente și coloranți.

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă (*Rosae petalum*; *Rosae damascenae flos*) este formată din petale de culoare roz - roșu, cu miros specific de trandafir (mai puternic în stare proaspătă) și cu gust aromat.

Produsul conține ulei volatil (0,04 - 0,06 %), format din geraniol (50 - 70 %) și alte hidrocarburi, alcoolii și aldehide monoterpenice, taninuri, glicozide, glucide, acizi (usolic, palmitic, oleic, linoleic) etc. (I. Ciulea și colab. 1993, E. Grigorescu și colab. 2004, J.C. Caissard și colab., 2006 etc.).

Conținutul în ulei volatil al produsului (0,06 % în petale și 0,01 % în celelalte părți ale florii) este dependent de biotip, condițiile pedoclimatice, recoltare, transport și timpul de la recoltare la prelucrare (M. Alexan și colab. 1991). În condițiile de la SCPMA - Fundulea (media pe patru ani), populația de Kazanlık (Bulgaria), a

avut conținutul de ulei 0,054 % (cu variații între 0,03 - 0,073 %). (E. Păun, 1986). S-a constatat că cea mai mare parte a uleiului volatil se află în epiderma superioară a petalelor, celelalte organe ale florii având un conținut mai scăzut. Uleiul volatil de trandafir este format din două părți: 15 - 30 % stearopten (parafine) și 70 - 85 % eleopten (V. Istudor, 2001). F. Crăciun și colab., 1977 și E. Păun, 1988, arată că uleiul volatil de trandafir are un conținut mediu de 20 % stearoptene și 80 % celelalte componente (eleoptenul).

În *eleopten* (partea volatilă mai valoroasă), circa 70 - 75 % este geraniol, citronelol și nerol, urmat de alcool fenil etilic și alți compuși mai puțin importanți (eugenol, linalool, citrol etc.); iar *stearoptenul* este un amestec de hidrocarburi saturate, solide (dizolvate în eleopten).


Utilizări. Principala utilizare a acestei plante aromatice este în industria parfumurilor și în cosmetică, uleiul său volatil fiind foarte mult apreciat. Cel mai apreciat ulei volatil de trandafir în lume este cel bulgăresc, prețul lui depășind prețul aurului (E. Păun, 1988). În scop farmaceutic, uleiul de trandafir se folosește ca aromatizant (unguente, creme etc.). Se studiază în Bulgaria și în alte țări posibilitățile utilizării lui în terapeutică. Mierea în care s-au macerat petale de trandafiri (*Mel Rosatum*) se folosește în microze bucale și afte la sugari (A. Laza și G. Răcz, 1975).

Răspândirea. Specie originară din Orientul Apropiat este răspândită în țările mediteraneene (E. Păun, 1995). S-a luat în cultură în diferite țări pentru valoarea uleiului volatil. Trandafirul pentru ulei nu crește în flora spontană, ci este cultivat în parcuri ca plantă decorativă.

În țara noastră se cunoaște numai ca plantă cultivată în scop decorativ. Încercările făcute pentru producția de ulei "nu au fost încununate de succes" (E. Păun, 1995).

Sistematică. Soluri. Specia cultivată este *Rosa damascena* Mill. (Trandafirul pentru ulei, Trandafir de lună, Trandafir de Damasc) (fig. 4.10.1. după Flora României, vol. IV, 1956 și 4.10.1.a., original).

După A. Laza și G. Răcz, 1975, *Rosa damascena* Mill are $2n = 14,28$. La noi în țară materialul existent face parte din var. *balcanica* Prod. (I. Prodan și Al. Buia, 1956). La La SCPMA - Fundulea s-a luat în studiu populația bulgărească "De Kazanlık" și soiul rusec "Festivalnaia". Soiul rusec are un conținut mai ridicat în ulei, însă uleiul volatil este inferior populației din Bulgaria (E. Păun, 1986).

Fig. 4.10.1. *Rosa damascena* Mill.

Particularități biologice. *Rosa damascena* Mill. este un arbust cu înrădăcinare adâncă, tulpină (1,5 - 2 m înălțime) ramificată, cu ghimpi, frunze imparipenat-compuse (5 - 7 foliole), florile dispuse în inflorescențe (tip dihaziu cu 3 - 5 flori) având corola bătăută, cu multe petale (roșii sau roz), caduce, fructe false (tip măceasă), adesea caduce. Mugurii floralii și florile se formează pe lemn în vârstă de un an (E. Păun, 1982).

Cerințe față de climă și sol. Trandafirul pentru ulei este o plantă specifică climatului mediteranean. Ramurile bine dezvoltate rezistă în cursul iernii până la -28 °C, însă după pornirea în vegetație, ramurile florifere devin sensibile la înghețuri. În cursul vegetației are cerințe ridicate față de lumină, care influențează producția și calitatea uleiului volatil. După cum arată E. Păun, 1995, "trandafirul pentru ulei

poate crește pretutindeni, dar nu produce ulei oriunde și oricum. Unul din cei mai importanți factori este temperatura". Pentru creștere și dezvoltare pretinde temperaturi ridicate (vara și iarna) cu diferențe între temperaturile înregistrate ziua și noaptea de 10 - 12 °C. "Spre exemplu, procesul de formare a florilor decurge normal dacă noaptea temperatura este sub 4 °C, iar ziua peste 16 °C" (E. Păun, 1995).

Cerințele față de umiditate sunt mijlocii, planta diminuându-și capacitatea de producție în condiții de deficit sau exces de umiditate. Este importantă atât umiditatea atmosferică, cât și cea din sol, în special în lunile mai și iunie (E. Păun, 1995).

Condițiile climatice ale anului influențează puternic producția de flori și ulei volatil la trandafir, după cum se desprinde din tabelele 4.10.1.1. și 4.10.1.2. (după E. Păun și C. Barbu, 1988), la ambele moduri de obținere a plantelor (altoit și nealtoit).

Tabelul 4.10.1.1.

Evoluția producției de flori și a principalelor ei componente la trandafirul pentru ulei în funcție de moduri de obținere a plantelor și condițiile climatice ale anului

Indicii	Modul de obținere al plantelor		1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	Medie
	de flori	de fructe	de flori	de fructe	de flori	de fructe	de flori	de fructe	de flori	de fructe	de flori	de fructe
Producția de flori (g/ha)	Altoit	Nealtoit	87,4	75,5	116,5	102,5	68,9	34	83,3	34,5	100	78
Flori pe tulpă (nr)	Altoit	Nealtoit	764	654	1025	854	623	328	760	303	861	685
Greutatea medie a unei flori (g)	Altoit	Nealtoit	2,3	2,3	2,3	2,4	2,2	2,1	2,2	2,3	2,2	2,2
Producția de flori pe tulpă (kg)	Altoit	Nealtoit	1,75	1,5	2,35	2,05	1,57	0,68	1,67	0,69	2	1,5
	Altoit	Nealtoit	-	-	-	1,3	1,01	0,6	1,05	0,77	1,65	1

Producția de flori proaspete a oscilat între 34 g/ha (1983) - 116,5 g/ha (1981) la trandafirul altoit și 29,7 g/ha (1983) - 82,5 g/ha (1986) la trandafirul înmulțit prin rădăcini proprii. Hotărâtoare au fost nivelul precipitațiilor și a temperaturilor minime înregistrate în perioada decembrie - aprilie. Anii 1983 și 1985 au fost deficitari în precipitații și temperaturi minime până la -14 °C, fapt care a condus la producții scăzute de flori. Factorii climatici menționați au influențat formarea mugurilor floralii și respectiv numărul de flori pe plantă (E. Păun și C. Barbu, 1988).

Tabelul 4.10.1.2.

Evoluția conținutului și a producției de ulei volatil la trandafirul pentru ulei în funcție de modul de obținere a plantelor și condițiile climatice

Indici	Modul de obținere al plantelor	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	Media
Conținutul în ulei volatil (ml %)	Altoit	0,048	0,056	0,049	0,046	0,048	0,038	0,046	0,036	0,045	0,045
	Nealtoit	-	-	-	0,042	0,051	0,04	0,046	0,032	0,042	0,042
Ulei volatil (kg/ha)	Altoit	3,7	3,8	5,1	4,2	3	1,1	3,5	1,1	4	3,3
	Nealtoit	-	-	-	2,5	2,5	1	2,1	1,1	3,1	2

Conținutul și producția de ulei volatil la trandafir au fost influențate de modul de obținere a plantelor dar și de condițiile climatice ale anului.

Trandafirul pentru ulei dă rezultate bune pe soluri adânci, fertile, drenate cu apă freatică sub 1,5 m, cu o ușoară expoziție sudică. Plantele pier în condiții de soluri cu apă stagnantă.

Zonare. Ținând seama de cerințele pedoclimatice ale plantei, s-a recomandat în cultură în partea de vest (jud. Timiș) și sud - est (jud. Călărași, Giurgiu și Constanța) a țării (F. Crăciun și colab., 1977; E. Păun, 1988).

4.10.1.2. Tehnologia de cultivare

rotația. Trandafirul pentru ulei se cultivă în afara asolamentului, fiind semiarbust peren, în condiții pedoclimatice adecvate.

Fertilizarea. Se face diferențiat, în funcție de fertilitatea solului. La înființarea plantației, cu desfundatul, se încorporează 30 - 40 t/ha gunoi de grajd, și apoi la 3 - 4 ani, se aplică 30 t/ha gunoi de grajd (îngropat cu arătura de mușuroire). Îngrășămintele chimice se folosesc în doze de 120 - 140 kg/ha P_2O_5 și 60 - 70 kg/ha K_2O (toamna) și 65 - 70 kg/ha N (primăvara, în două faze) (E. Păun, 1986).

Lucrările solului. După eliberarea terenului de către planta premergătoare, se face arătura de desfundare la 60 cm, după care până la plantat (toamna sau primăvara), terenul se întreține prin lucrări cu discul, urmat de grapa cu colți.

Înmulțirea se face numai pe cale vegetativă, prin altoire sau prin înrădăcinarea ramurilor (redate mai jos, după E. Păun, 1988 și 1995).

a. **Înmulțirea prin altoire** are avantajul că în timp foarte scurt se poate înmulți un soi valoros, însă prezintă inconvenientul că în

plantații se dezvoltă ramuri din portaltoi, care trebuie mereu îndepărtate (fiind greu de înțeles suplimentare la întreținere). Portaltoiul este măceșul obținut din sămânță. Se folosesc semințe recoltate de la fructe în pârgă și semănate toamna în straturi reci, în rânduri la 25 cm (2 - 3 g la m^2). În cursul anului următor, se fac lucrări de întreținere (prașile, pliviri, udări), apoi toamna, plantulele de măceș (portaltoi) se transplantează în câmpul de altoire la 80/70 cm. Altoirea se face în anul următor, cu mugure crescând (în mai - iunie) sau dormind (august-septembrie), la baza coletului, pentru a preveni lăstărirea portaltoiului. Altoiul (tăiat împreună cu o scoarță mică) se introduce într-o tăietură în formă de T a portaltoiului, apoi se leagă cu rafie și se acoperă cu sol bine mărunțit. Terenul se menține curat de buruieni, prin prașile și pliviri. Când altoiul a format 5 - 6 frunze se taie vârful de creștere, pentru a forma viitoarea tufă de trandafiri. Plantarea la locul definitiv se face în toamna anului în care s-a făcut altoirea sau în anul următor (în funcție de epoca de altoire).

b. **Înmulțirea prin înrădăcinarea ramurilor.** Este o metodă mai costisitoare, însă prezintă avantajul că nu mai apar lăstari din portaltoi, ca la înmulțirea prin altoire. Înrădăcinarea ramurilor se poate face la locul definitiv sau prin producerea de „răsad”, prin două procedee (metoda Staikov - Dimitrova și metoda Topalav).

- **Înrădăcinarea ramurilor la locul definitiv** (metoda Kesme) se face în șanțuri late de 40 - 50 cm și adânci de 40 cm, deschise la distanța stabilită a se realiza între rândurile de trandafiri. Se folosesc ramuri recoltate cât mai aproape de colet (se decoptează solul de la baza tufelor). Imediat după recoltare, ramurile se așează în straturi (câte 1 - 3) orizontal și suprapuse cca. 25 % din lungime. Se acoperă cu 8 - 10 cm de pământ mărunțit și suficient de umed, peste care se adaugă 5 - 6 cm îngrășământ organic. Din mugurii ramurilor, primăvara, se formează plante sub forma unui gard viu. Prezintă inconvenientul că se îngreunează lucrările de întreținere din interiorul rândurilor. Raportul de înmulțire este redus, dintr-un ha plantație veche se pot realiza 2 - 4 ha de noi plantații.

- **Producerea de „răsad”** (în rădăcinarea ramurilor în locuri speciale) mărește raportul de înmulțire față de metoda precedentă. În cadrul acestui sistem de producere a materialului de plantare, se practica două metode (Staikov - Dimitrova și Topalov).

Prin metoda Staikov - Dimitrova, producerea „răsadului” se realizează în șanțuri late de 50 cm, adânci de 30 - 35 cm de lungimi variabile (cu spațiu de 1 m între ele), în care se așează orizontal ramurile de trandafir (suprapuse cea 25 %). Ramurile se acoperă cu

pământ mărunți (8 - 10 cm grosime) și gunoi proaspăt sau paie bine tocate (5 - 6 cm). Acoperirea ramurilor se face după căderea frunzelor (octombrie - noiembrie). În anul următor, se fac lucrări de întreținere (prașile, pliviri, udări) și ciupirea vârfului de creștere când lăstarii au 4 - 5 frunze. Toamna după căderea frunzelor, se descoperă șanțul și se detașează din ramura o mână fragmente cu lăstari și rădăcini, cu foarfecă de vie. „Răsadul” obținut se sortează pe clase de calitate. Clasa a I-a se folosește pentru plantat la loc definitiv, iar clasa a II-a se mai plantează încă un an (pe un teren irigabil), la distanța de 70/30 cm, pentru a se forma un „răsad” complet dezvoltat. Prin această metodă, din ramurile de pe un ha se obțin cca. 65 - 70 mii fire de trandafir, cu care se pot planta 6,5 - 7 ha.

Prin metoda Topalov, „răsadul” se obține în plantații speciale lângă surse de apă. Se sapă șanțuri paralele cu rândurile de trandafir, cu lățimea egală cu lungimea lăstarilor și adâncimea de 25 - 30 cm, începând de la marginea plantației, între rânduri, lângă coletul plantelor. În șanțuri se apleacă și se apasă toate ramurile (cu o scândură lungă de 2 - 3 m), fără să se taie. Stratul de pământ (8 - 10 cm) cu care se acoperă ramurile se ia prin deschiderea șanțului de lângă rândul următor, peste pământ adăugându-se 5 - 6 cm gunoi de grajd proaspăt fermentat sau paie tocate. Perioada și modul de efectuare a lucrărilor de întreținere și clasarea materialului respectă demersurile stabilite la metoda precedentă. De pe un ha se pot obține 150 - 170 mii fire de trandafir, cu care se plantează 16 - 17 ha.

În ambele metode, ramurile viabile care nu au format lăstari se mai așează pentru încă un an în șanțuri (la metoda Topalov, noile șanțuri se deschid începând din cealaltă parte a plantației).

Materialul de înmulțire se plantează la locul definitiv la sfârșitul lunii octombrie - începutul lunii noiembrie sau primăvara timpuriu, la 2,2 m între rânduri și 0,5 - 0,8 m pe rând (la 2,2/0,5 m rezultă 9.090 plante/ha) (tabelul 4.10.1.3., după Atanasov și colab, citat de E. Păun, 1988), cu coletul la 6 - 8 cm sub nivelul solului.

Tabelul 4.10.1.3.

Distanța de plantare (media a 6 ani), m	Nr. de plante la ha	Producția de flori	
		q/ha	%
2,2 x 1	4545	28	100
2,2 x 0,8	5681	41,1	147
2,2 x 0,5	9050	39,4	141

Lucrările de îngrijire. Buruienile se combat prin prașile între rânduri și pe rând. Se pot folosi și erbicidele Herbazin-50 (4 kg/ha) în perioada de toamnă - primăvară și Omidel (8 kg/ha) în luna mai, precum și Gesagard 50 (5 kg/ha), Gesaprim (5 kg/ha), Aftalon (4 kg/ha), aplicate primăvara înainte de pornirea în vegetație. La 8 - 10 ani, când tufele înbătrânesc, se face tăierea la colet, de regenerare (întinerire), obținut toamna.

Rugina (*Phragmidium subcoriticum*) se combate prin stropiri cu TMTD (6 kg/ha), după deschiderea mugurilor vegetativi (2 - 3 tratamente la 15 zile interval). Dăunătorul *Agrius mokrzecki* se combate prin tratamente împotriva adulților la sfârșitul lunii mai (înainte de depunerea ouălor) cu Sinoratox 35 CE (1,5 - 2 l/ha) (E. Păun, 1986).

Recoltarea. Trandafirul pentru ulei se recoltează la deschiderea florilor (între 20 V - 25 VI), numai dimineața până la ora 10, când conținutul în ulei volatil este mai ridicat (tabelul 4.10.1.4., după Diakov, citat de E. Păun, 1988).

Tabelul 4.10.1.4.

Conținutul în ulei volatil	Ora recoltării							
	4	5,3	7	9	12	16	20	
% din substanța uscată	0,22	0,33	0,31	0,27	0,24	0,21	0,14	
% față de ora 5,3	67	100	94	82	73	64	42	

Valorile conținutului în ulei volatil al florilor de trandafir în funcție de ora recoltării

Se recomandă, dacă e posibil, ca recoltarea să se facă numai între orele 3 - 7 dimineața. Spre prânz, conținutul în ulei volatil scade, crescând din nou pe la orele 18 - 20; conținutul maxim fiind între orele 4 - 6 dimineața (M. Alexan și colab., 1991; E. Păun, 1988).

Se recoltează obșnuit petalele fără caliceu, însă în Bulgaria se practică cu bune rezultate recoltarea florilor cu receptacul (E. Păun, 1986). Recoltarea florilor se face cu mâna numai pe timp frumos. Produsul se strânge în coșuri (fără să se îndese) de maximum 20 kg, urmând să se predea în cel mai scurt timp la distilerii.

Condiționarea. O conservare bună a florilor după recoltare se realizează în bazine speciale cu apă curată (raportul flori și apă este de 1 : 2), prevăzute cu pompe pentru trecerea amestecului respectiv în distilatoare (E. Păun, 1986). Uscarea petalelor, când este cazul, se face pe cale naturală la umbră, în încăperi bine aerisite și curate, pe rame acoperite cu hârtie, în strat subțire, sau pe cale artificială (la 30 - 35 °C). Rândamentul la uscare este de 7 - 9 : 1.

Condițiile tehnice de recepție a produsului uscat admit ca impurități: maximum 5 % petale brunificate, maximum 1,5 % resturi de sepale, stamine; nu admit corpuri străine organice sau minerale, iar umiditatea, de maximum 12 %.

Producția medie de flori proaspete este de 3000 - 5000 kg/ha. După E. Păun, 1986, din 3500 - 4000 kg flori se obține circa 1 kg ulei volatil.

4.10.2. MĂCEȘUL (*Rosa canina* L.)

Fr: Églantier; E: Wild rose; G: Heckenrose, Hunds Rose

4.10.2.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Măceșul (trandafir sălbatic, rug, cacadâr, rujă) crește spontan în țara noastră de unde se recoltează în mod frecvent. Măceșul din flora spontană a fost distrus în bună parte prin lucrările de amenajare a fânetelor, pășunilor și a terenurilor cultivate. Arealul de răspândire a acestei plante în flora spontană se reduce an de an și la noi în țară, în multe țări fiind plantă cultivată. Cultura măceșului în țara noastră se poate face pe terenuri în pantă mai greu valorificabile cu alte specii, în lucrări de îmbunătățiri funciare, în amestec cu alte specii antierozionale, în garduri vii etc. (F. Crăciun și colab., 1976, E. Păun, 1995), realizându-se astfel o valorificare superioară a acestor suprafețe agricole.

Materia primă și compoziția chimică. De la măceș se utilizează pseudofructele (*Cynosbati fructus*). Receptaculul cărnos al pseudofructelor de măceș este bogat în acid ascorbic (vitamina C), fiind unul dintre cei mai valoroși produși indigeni din această categorie. Pericarpul fructului fals de măceș reprezintă o foarte importantă sursă de vitamina A (D.S. Moiceanu, 1997). Mai conține vitaminele B₁, B₂, P, K, flavonoide, α și β tocoferol (vitamina E), glucide; pectine, acizi (citric, malic), tanin, ulei volatil și ulei gras (circa 10 %), săruri minerale etc. (F. Crăciun și colab., 1976, D.S. Moiceanu, 1997 etc.). Achenele conțin ulei gras, vitamina E etc. (D.S. Moiceanu, 1997, M. Tămaș și colab., 2005). Conținutul pseudofructelor de măceș în acid ascorbic (vitamina C) este de 250 - 500 mg %, ajungând la unele varietăți cultivate până la 14000 mg % acid ascorbic în fructul proaspăt (E. Grigorescu și colab., 2001).

D. Moiceanu și M. Tămaș, 1996, au stabilit că fructul fals (măceșă) acestei specii conține (în pericarpul uscat) 22,5 - 44,13 g % pectine (în funcție de natura produsului vegetal și stadiul de maturitate al fructului); pentru fiecare din produsele analizate (pericarp de culoare portocalie și pericarp de culoare roșie) au fost izolate câte patru fracțiuni pectice diferite. Prin uscare, o mare parte din acidul ascorbic se pierde. Analiza cantitativă și calitativă a uleiului gras extras din achenele de măceș, au dovedit că acestea conțin 5,45 - 9,2 % ulei gras (raportat la materialul vegetal uscat), în compoziția căruia au fost identificați acizii: palmitic, stearic, oleic, linoleic și linolenic (D.S. Moiceanu, 1997).

Utilizări. Complexul vitaminic din pseudofructele de măceș este un tonic vitaminizant, scade permeabilitatea și fragilitatea capilarelor, are acțiune diuretică, fiind recomandat în avitaminoza C, în afecțiuni hepatice și renale, ca diuretic etc. Având conținut ridicat în vitamina C, produsul prezintă importanță pentru funcționarea normală a glandelor cu secreție internă, a ficatului, splinei, cordului și creierului. Produsul intră în compoziția **ceaiurilor aromat, hepatic nr. 2, tonic aperitiv**; în prepararea unor siropuri, gemuri etc.

Răspândire. Măceșul este o plantă cu un areal de răspândire foarte larg, din zonele litorale până la circa 1200 m altitudine. Fiind specie iubitoare de lumină, vegetează în locuri deschise, în pășuni și fânețe, pe coaste însoțite, în spațiile necultivate între parcele, pe marginea drumurilor și căilor ferate. Măceșul nu suportă umbrirea, de aceea crește numai pe marginea și în răiturile pădurilor de foioase.

Sistematică. Soluri. Alături de *Rosa canina* L. (fig. 4.10.2., după F. Crăciun și colab., 1976 și 4.10.2.a., original) din flora spontană se acceptă recoltarea fructelor bogate în vitamina C și de la alte specii între care: *R. pendulina* L., *R. micrantha* Sm., *R. tomentosa* Sm., *R. rubiginosa* L., *R. corymbifera* Borkh. (*R. dumetorum* Thuill.).

În cultură sunt proveniențe din specia *Rosa canina* L. F. Crăciun și colab., 1976 menționează că se mai cultivă specia *Rosa rugosa* Thunb (cu fructe globuloase, turtite și diametrul până la 25 mm), iar de perspectivă este răspândirea speciei *Rosa pendulina* L., din zona montană, (măceșul de munte, lipsit de ghimpi, mai bogat în vitamina C decât *Rosa canina* L.).

Particularități biologice. *Rosa canina* L. este un arbust ghimpos, înalt de 2 - 3 m, cu ramuri arcuite în afara tufei. Tulpina este ramificată, ramurile sunt lungi, cu ghimpi puternici, comprimați, încovoiați ca o seceră (de 3 - 12 mm lungime).




Fig. 4.10.2. *Rosa canina* L.
A - aspectul unei ramuri cu flori și frunze;
B - diferențieri între *R. canina* (c) și *R. rugosa* (r) privind aspectul tulpinii (I)
și al măceșelor (II)

Frunzele sunt imparipenat compuse, dispuse altern, cu 5 - 7 foliole ovate (lungi de 3 - 4 cm și late de 1 - 2 cm), cu marginea serată, glabre pe partea inferioară, cu stipele persistente la bază. Florile sunt dispuse (solitar sau grupate câte 2 - 3) în vârful ramurilor, cu sepal răsfrațe (se păstrează mult timp), petale lungi de 2 - 2,5 cm, de culoare roz, emarginate, cu numeroase stamine și stile. Pseudofructul provine din receptaculul care devine cărnos (măceasa), în formă de cupă, la început verde, apoi de culoare roșie - portocalie, iar la maturitate roșu aprins, lucios. Conține în interior numeroase fructe (achene; numite impropriu semințe), de formă triunghiulară, cu peri aspri (sămânța fiind în interiorul achenei).

Cerințe față de climă și sol. Măceșul este o plantă cu o mare plasticitate ecologică. Are o foarte bună rezistență la temperaturi

scăzute, la -20 °C până la -30 °C, fiind afectate numai ramurile de un an. Are cerințe scăzute și față de umiditate (la umiditate atmosferică ridicată, scade conținutul în vitamina C al pseudofructelor). Măceșul este o specie iubitoare de lumină, vegetând bine pe terenuri însorite (nu suportă umbrirea). Față de sol măceșul are cerințe reduse, valorificând bine solurile sărace, scheletice, erodate sau supuse eroziunii, însă nu merge pe terenuri înmlăștinite sau în turbării.

Zonare. Cultura măceșului se recomandă în arealele de răspândire naturală, în diferite zone agricole ale țării. Se poate amplasa pe terenuri sărace, improprii altor culturi și pe terenuri supuse eroziunii (ca specie antierozională).

4.10.2.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Fiind un arbust multiannual, măceșul rămâne pe același teren 15 - 25 de ani. Măceșul se amplasează în afara asolamentului, după plante care permit efectuarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înființarea culturii în condiții optime (cereale sau plante tehnice, bine întreținute).

Fertilizarea. La pregătirea de bază a terenului, toamna se aplică 30 t/ha gunoi de grajd. Cu arătura de toamnă se încorporează P₈₀₋₉₀ și K₅₀₋₇₀, iar primăvara se aplică N₅₀₋₇₀. În anii următor, în funcție de fertilitatea solului se aplică P₃₀₋₄₀, K₂₀₋₃₀ (toamna) și N₃₀₋₄₀ (primăvara).

Lucrările solului. Pregătirea de bază a terenului constă într-o desfundare a terenului la circa 50 cm adâncime, urnată de lucrări cu discul sau cu cultivatorul pentru a menține terenul curat de buruieni până la plantare.

Înmulțirea. Se recomandă înmulțirea măceșului prin răsad, (E. Păun, 1995), însă cultura se poate realiza și pe cale vegetativă (înădăcinarea butașilor, marcotaj etc.) în situații speciale pentru înmulțirea unor varietăți deosebite și pe suprafețe reduse (un număr mic de plante necesare familiei).

Înmulțirea prin răsad. Pentru producerea răsadului se recoltează fructe la începutul maturării (când au culoarea galben - portocaliu) de la plante tipice, bine dezvoltate cu însușiri de producție și calitate ridicate. Semințele se obțin după uscarea fructelor, prin traterarea acestora (cu batoza pentru trifoliene) sau prin presare (în cantități mici), apoi se selectează și se stratifică în nisip umed la (12 - 16 °C, circa 90 de zile), după care se înșămânțează (începutul germinării trebuie să coincidă cu perioada înșămânțării). Terenul pentru producerea răsadului se pregătește grădinarște, cu

combinatorul sau manual pentru suprafețe mai mici. Semănatul se face toamna (octombrie - noiembrie) cu semănători universale (SUP) pe suprafețe mari (cu sămânță sortată). Răsadul pentru un hectar se realizează pe 150 - 200 m² de strat, folosind 200 - 250 g semințe semănate în rânduri la 45 cm și 4 - 5 cm adâncime. Plantele răsar primăvara devreme, în cursul anului terenul se menține afânat și curat de buruieni, iar toamna răsadul se scoate și se plantează la locul definitiv. Înainte de plantare răsadul se făsonază (tulpina la circa 40 cm lungime) și se mocirlește.

Plantarea la locul definitiv a răsadului se face la 2 m între rânduri și 1,5 m pe rând, iar pentru gard viu se recomandă 2 rânduri la 50 cm între ele și 50 cm între plante (E. Păun, 1995). Plantarea se face în gropi executate mecanic sau manual, cu dimensiuni de 40x40x40 cm (în teren desfundat) sau 60x60x80 cm (în teren nedesfundat). La plantare, coletul plantelor trebuie să fie cu 3 - 4 cm sub nivelul solului. *Înmulțirea prin ramuri înrădăcinate* (lăstari înrădăcinați) care rezultă din despărțirea tufelor în tulpinițe cu rădăcini fasonate (partea aeriană scurtată la 40 - 50 cm) și mocirlite și plantate toamna (cu coletul la 2 - 3 cm sub nivelul solului), iar la venirea înghețului, măceșii se vor mușuroi.

Înmulțirea prin marcotaj. O treime din lăstarii de un an a unei tufe supuse marcotării sunt îndoiți la sol și așezați în gropi de 10 - 12 cm, fixați cu cârlige, apoi se acoperă cu pământ. În rădăcinarea are loc în iunie - iulie, iar până în octombrie se formează tufe cu o coroană de rădăcini, devenind plante de sine stătătoare, care se plantează ca și la celelalte metode de înmulțire.

Lucrările de îngrijire constau din prașile mecanice între rânduri și manuale pe rând, de câte ori este nevoie, pentru a menține terenul afânat și curat de buruieni în cursul vegetației.

Dacă este cazul se vor efectua lucrări de completarea golurilor, imediat după plantare, pentru realizarea desimii stabile.

Recoltarea măceșelor se face fie în lunile august și septembrie, în funcție de ajungerea la maturitate a pseudofructelor (când au culoarea portocalie - roșie). Recoltarea se face manual, la nevoie aplecând ramurile cu cârlige de lemn, muncitorii trebuind să aibă mâinile protejate de mănuși. După recoltare produsul se așază în coșuri sau taci și se amestecă în saccași și la locul de prelucrare și interzice menținerea produsului recoltat la soare, deoarece se încing și fermentează, reducând conținutul în vitamina C).

Condiționarea constă în separarea produsului de impurități (frunze, resturi de codițe, fructe atacate de dăunători etc.), uscarea pe

cale naturală (în strat subțire) sau în uscătoare cu aer cald la 85 - 105 °C (procedeu mai bun, care stopează procesele biochimice de degradare a produsului și pierderea vitaminei C). După uscarea artificială se face spargerea fructelor cu ajutorul unor utilaje (tocător) cu valțuri și cuțite. Se îndepărtează fructele păroase, trecându-le printr-un ciur mecanic. Pulpa uscată se poate ulterior granula la dimensiuni diferite („feinschnitt”). Randalmentul la uscare este de 2 : 1 pentru fructe întregi și 6 : 1 pentru „feinschnitt”.

Condițiile tehnice de recepție prevăd pentru măceșe proaspete să aibă culoarea portocalie, să fie sănătoase, impurități - resturi de codițe și frunze - max 1 %, corpuri străine organice și minerale - 0,5 % pentru fiecare, iar umiditatea cea normală pentru produsul proaspăt.

Producția este dependentă de materialul biologic, de vârsta plantației și condițiile de cultură, fiind cuprinse între 6 - 10 t/ha produs în stare proaspătă.

Observație. Recoltarea și prelucrarea produsului din flora spontană se face în aceleași condiții prezentate la măceșul cultivat.

4.10.3. CERENȚELUL

(*Geum urbanum* L.)

Fr: Benoîte; E: Wood avens, Avens;

G: Benediktenkraut, Nelkewürz

4.10.3.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă o constituie rizomul și rădăcinile (*Gei rhizoma*) și uneori partea aeriană (*Gei urbani herba*). Gei rhizoma se compune din rizomi lungi de 5 - 7 cm și groși de 1 - 1,5 cm, cu rădăcini de 5 - 10 cm lungime și 1 - 2 mm grosime (E. Grigorescu și colab. 2001).

Produsul conține taninuri (10 - 24 % în produsul uscat), ulei volatil (0,04 - 0,65 % în produsul uscat), gennă (heterozidă sau glucozidă a eugenolului cu vicianoză), principii amare, mucilagii etc. (parfumul produsului fiind oferit de eugenol). Geina (0,01 - 0,2 %) datorită unei enzime din rizom hidrolizează în timpul uscării în eugenol (I. Ciulei și colab., 1993, M. Grieve, 1995, I. Marta, 2000). Eugenolul conferă produsului mirosul de cuișoare (E. Păun, 1995). FR VII (în care este inclus *Gei rhizoma*) prevede un conținut minim de 10 % taninuri, conținut care poate ajunge la 24 % taninuri la produsele

existente în comerț (V. Istudor, 1998). În tabelul 4.10.3.1. (după I. Marta, 2000) prezentăm conținutul în ulei volatil al produsului din flora spontană și din cultură.

Tabel 4.10.3.1.
Conținutul în ulei volatil la specia *Geum urbanum* L.
din flora spontană și din cultură

Proveniență <i>Gei rhizoma</i>	Umid (%)	Conținut în ulei volatil (ml %)		Conținut eugenol (%)
		Antrenare cu vapori de apă	Antrenare în prezența 1 % n-hexan	
Flora spontană (proaspătă)	42	0,045	0,06	34
Flora spontană (uscată)	11,5	0,14	0,21	40
Cultură (proaspătă)	40	0,05	0,06	69,1
Cultură (uscată)	12	0,16	0,23	81

Utilizări. *Gei rhizoma* datorită taninului, scade secreția mucoaselor având acțiune antidiareică; are efect hemostatic, datorită precipitării proteinelor din sânge; eugenolul conferă proprietăți antiseptice și calmante (M. Alexan și colab., 1991, E. Păun, 1995). Întregul complex de principii active are acțiune tonic amară, galactogogă, stomachică, analgezică, aromatică (I. Marta, 2000). Este indicat în enterite infecțioase, hemoragii de natură diferită, hemoroizi, gingivite, stomatite, plăgi; intră în produsele farmaceutice **Ceai antidiareic, Ceai pentru gargară, Ticiverol, Soluție pentru gargară**; extractele intră în pasta de dinți, indicate pentru gingivite, stomatite etc. (M. Tămaș și colab., 2005). Materia primă vegetală (*Gei rhizoma*), în asocieri cu rădăcinile de valeriană, intră în compoziția unor **ceaiuri sedative, cardiotonice** etc.

Răspândire. Specia *Geum urbanum* L. este răspândită în zona temperată din Eurasia. America de Nord și Australia (E. Păun, 1995). În țara noastră este frecventă în întreaga țară până în zona premontană, etajul pădurilor de fag, obișnuit pe marginea pădurilor și tufărișurilor din zona mai umedă și umbrasă.

Sistematică, soluri. Specia cultivată este *Geum urbanum* L. (fig. 4.10.3., după Flora României, vol IV, 1956 și 4.10.3.a., original). În cultură se află populații locale și diferite proveniențe. Mai răspândită este populația locală „De Brașov”.

Particularități biologice. Cerețelul este o plantă ierboasă, perenă. În sol are un rizom cilindric de până la 7 cm lungime și 1,5 - 2 (4,5) cm grosime, cu rădăcini adventive numeroase, tulpină erectă de 25 - 100 cm, frunzele cu 3 - 5 lobi penat, inflorescențele terminale, flori cu două rânduri de sepal (5+5), cinci petale galbene de 3 - 7

4. Plante medicinale și aromatice cultivate sau în curs de introducere în cultură în România
mm, multe stamine și gineceu apocarpic. Fructul este format din nucule scurt setoase, prevăzute cu un stil articular.




Fig. 4.10.3. *Geum urbanum* L.

Condiții de climă și sol. Este o plantă care vegetează bine în condiții de semiumbra, în zone umede, pe soluri ușoare și afânate.

Zonare. Se recomandă cultivarea în arealul de răspândire naturală, în zonele submontane și depresii, unde se întrunesc cerințele pedoclimatice ale acestei plante. Reușește și în zonele agricole din silvostepa țării.

4.10.3.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Cultura se amplasează după plante care lasă terenul curat de buruieni. Rădăcinile se recomandă să se recolteze în anul al doilea de vegetație, toamna, când producția și conținutul în principii active este mai ridicat (I. Marta, 2000).

Fertilizarea. Se recomandă fertilizarea cu gunoi de grajd (30 - 40 t/ha) și îngrășăminte chimice în funcție de fertilitatea solului (N 40 - 80 și P 40).

Lucrările solului. Arătura se execută la 25 - 30 cm adâncime, după eliberarea terenului de planta premergătoare, iar patul germinativ se pregătește cu combinatul.

Sămânța și semănatul. Cultura de cerețel se poate realiza prin semănat direct în câmp (I. Marta, 2000; V. Niță, 2000). Se folosește o sămânță sănătoasă, cu o valoare culturală (puritate și germinativitate) ridicată. Semănatul se face în luna august, la 50 cm între rânduri, folosindu-se 8 - 9 kg/ha (tabelul 4.10.3.2., media anilor 1993 - 1995, după I. Marta, 2000).

Influența epocii de semănat asupra producției de rădăcină proaspătă la specia *Geum urbanum* L.

la specia <i>Oreum urivum</i> L.						
Nr. var.	Epoca de semănat	Producția de rădăcină proaspătă			Cont. principii active*	
		q/ha	%	Dif.	Semnif.	Tainin % Ulei volatile ml %
V ₁	August (Mt.)	36,3	100	-	-	15,3 0,27
V ₁	Pragul iernii	21.5	59	-14.8	00	15 0,25
V ₁	Urgența I (martie)	13,8	38	-22,5	00	13,8 0,17
		DL 5% =7,02		DL 1% = 12,85		DL 0.1% = 37.2
*Continutul în principii active s-a determinat pe probă uscată de rădăcină						

Lucrările de îngrijire. În cursul vegetației, se fac prașile între rânduri și pe rânduri de curățare etc. nevoite, pentru a menține terenul curat de buruieni. Au dat rezultate bune și erbicicidele Afalon (4 kg/ha) + Galant (2 l/ha) (I. Marta, 2000).

Recoltarea. Partea subterană se recomandă să se recolteze cu dislocatorul, în toamna celui de-al doilea an de vegetație, când se realizează producții ridicate de rădăcini cu conținut mare de principii active: ulei (0,13 - 0,2 ml %) și tanin (7,2 - 11 %) (tabelul 4.10.3.3., după I. Marta, 2000).

Condiționarea. Materia primă se usucă în condiții naturale, la curent de aer rece când se realizează un conținut ridicat de ulei (28 ml %) și tanin (18,4 %), sau în condiții artificiale la temperatura de 35 °C (tabelul 4.10.3.4., după I. Marta, 2000).

Tabelul 4.10.3.3.

Conținutul mediu de principii active la specia *Geum urbanum* L.

Anul I de vegetație					
Nr. crt.	Materia primă vegetală	Specificare	Tanin ml %	Ulei volatil ml %	
1	iarba	proaspătă	5,7	0,01	
		uscată	11	0,02	
2	rădăcina	proaspătă	12,5	0,1	
		uscată	21	0,19	

Anul II de vegetație					
Nr. crt.	Materia primă vegetală	Perioada recoltării	Specificare	Tanin ml %	Ulei volatil ml %
1.	iarba	Iunie	proaspătă	2,7	0,009
			uscată	14	0,02
2.	Rădăcina (pl. fructificată)	August	proaspătă	4	0,008
			uscată	8,6	0,17
3.	Rădăcina (pl. nefructificată)	August	proaspătă	3,5	0,01
			uscată	8,3	0,17
			proaspătă	3,5	0,01
			uscată	7,2	0,13
4.	Rădăcina (pl. fructificată)	Octombrie	proaspătă	4,2	0,02
			uscată	11	0,2
5.	Rădăcina (pl. nefructificată)	Octombrie	proaspătă	3,1	0,05
			uscată	13,4	

Anul III de vegetație					
Nr. crt.	Materia primă vegetală	Perioada de recoltare	Specificare	Tanin ml %	Ulei volatil ml %
1.	Rădăcina (pl. nefructificată)	Mai	proaspătă	3,2	0,01
			uscată	9,7	0,23
2.	Rădăcină (fructificată)	Mai	proaspătă	2,7	0,01
			uscată	8,3	0,15
3.	Rădăcina (pl. nefructificată)	Octombrie	proaspătă	4,5	0,03
			uscată	11,4	0,28
4.	Rădăcina (pl. fructificată)	Octombrie	proaspătă	3,6	0,02
			uscată	10,5	0,18

Tabelul 4.10.3.4.

Conținutul în principii active la *Geum urbanum* L. în funcție de modul de uscare

Materia primă	Uscare		Durata uscării	Consum specific	Conținut principii active	
	Metoda	Sursa			Ulei volatili ml %	Tanin %
Rizom + răd.	Natural	Soare	4-6 zile	2,5:1	0,1	15,2
		Curenți	12-18 zile	2,7:1	0,28	18,4
Rizom + răd.	Artificial	35 °C	2-8 ore	3:1	0,15	16,4
		50 °C	1-2 ore	2,9:1	0,09	15

Randamentul la uscare este de 2,7-3,1 (V. Niță, 2000).

Producția. Se realizează producții de rizomi și rădăcini în stare uscată de 1,5 - 2 t/ha.

4.11. FAMILIA FABACEAE (LEGUMINOSAE)

4.11.1. LEMNUL DULCE (*Glycyrrhiza glabra* L.)

Fr: Régilisse, Boisdoux; E: Licorice; G: Sussholz

4.11.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Lemnul dulce (larba dulce, Rădăcina dulce) este o plantă cunoscută din antichitate. Rădăcinile s-au folosit în medicina Egiptului, a Indiei antice, în medicina greacă, arabă, chineză, scitică (V. Cucu și colab., 1982), fiind una din cele mai vechi plante medicinale. Teophrast o recomandă contra bolilor de piept, Dioscoride o numea Glycyrrhiza, însemnând "lemn dulce". În anul 1441 planta este descrisă în lucrarea "*Erbulario Bergomense*" de Guarnerius de Padua (E. Păun, 1986). În evul mediu se cunoștea sub numele de Liquiritia, nume latin cu aceeași semnificație, păstrat în denumirea materiei prime (V. Velican, 1965). În grecește "glykys" = dulce și "rhiza" = rădăcină. Se pare că grecii au preluat utilizarea rădăcinilor de lemn dulce de la sciti, fiind recomandat în tratamentul astmului, a tusei uscate și a afecțiunilor pectorale (U. Stănescu și colab., 2004).

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă o constituie rădăcinile (*Liquiritiae radix* sin. *Glycyrrhizae radix*).

Rădăcinile conțin saponine triterpenice, dintre care prezintă importanță acidul glicirizinic (acid glicirizic), aflat sub formă de sare de Ca, K și Mg, izolat de la începutul secolului al XIX-lea și numit glicirizină. În funcție de proveniență, conținutul în glicirizină este între 2,3 - 12 % și chiar mai mult (U. Ștefănescu și colab., 2004), iar după alți autori de 2,3 - 20,1 % (V. Cucu și colab., 1982; E. Grigorescu și colab., 2001). Produsul trebuie să conțină cel puțin 5 % acid glicirizic și 20 - 25 % substanțe solubile în apă (V. Istudor, 1998). Acidul glicirizic este de circa 50 de ori mai dulce decât zaharoza și reprezintă o diglucuronidă a acidului gliciretic (acid gliciretinic) fără gust dulce. Din hidroliza acidă a glicozidelor triterpenice, alături de acidul gliciretic, se mai găsesc și alte triterpene pentaciclice. Importanță farmacologică prezintă și flavonoidele (din grupa flavanoneilor, a chalconelor și izoflavonelor), în proporție de 1 - 1,5 %,

dintre care predominantă este liquiritina (0,45 - 0,6 %), apoi izoliquiritina (grupa chalconelor), formononetina (izoflavonă) etc. (V. Cucu și colab., 1982; D. Afchor și colab., 1980 etc.) Rădăcinile mai conțin tanin (urme) și cumarine, compuși azotați, lipide, glucide, ulei volatil (cantități mici), vitamine (din grupa B etc.), săruri minerale etc. Rizomii conțin mai multă glicirizină decât rădăcinile, mai bogați fiind rizomii tineri nesuberificați. Scoața rădăcinii are conținutul în glicirizină mai ridicat decât cilindrul central, de aceea se recomandă să nu se descojească înainte de uscare (E. Coiciu, 1967).

Utilizări. Glicirizina (ca și alți compuși triterpenici) are acțiune expectorantă prin fluidificarea secreției traheobronșice și faringiene. Flavonele imprimă o acțiune diuretică și antispasmodică. Acidul gliciretic imprimă o acțiune antiinflamatorie și antitumoră în ulcerul gastric. Produsele în care intră principiile active din lemnul dulce sunt: **Rotter** (în tratamentul ulcerului gastric), **Carbenoxolone** (în terapia antitumoră), **Caveds** (tablete masticabile), **Biogastrone** (indicat în tratamentul gastritelor și ulcerului gastric). În ansamblu, principiile active din pulberea rădăcinii de lemn dulce au o acțiune laxativă. Se folosește ca: laxativ, diuretic, expectorant etc. Intră în compoziția **Ceiurilor laxativ nr. 2, antireumatic** și **Species pectorales (Farmacopeea Română)**. Nu se recomandă bolnavilor cu hipertensiune. Rădăcina de lemn dulce (rădăcina de liquiriție) figurează în **Farmacopeea Română (Liquiritiae radix** sin. *Glycyrrhizae radix*). Se folosește și în patiserie, industria băuturilor (răcoritoare, ușor spumante) a tutunului (prevenirea uscării excesive) etc.

Răspândire. Este răspândit în Europa, Asia, Africa de Nord, crescând spontan și în țara noastră. Se cultivă în Spania, Italia, Franța, Marea Britanie, Grecia, Turcia, Europa Centrală, Iran, Irak, Rusia, SUA etc.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Glycyrrhiza glabra* L., (fig. 4.11.1., după Flora României, vol. V, 1957 și 4.11.1.a., original). Specia *G. glabra* L. are $2n = 16$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). În *Farmacopeea Română*, alături de rădăcinile acestei specii, sunt cuprinse și rădăcinile de la specia *Glycyrrhiza glandulifera* W et K. Această specie este asemănătoare cu *G. glabra* L. însă are ramurile păroase și aspre, foliolele mai ascuțite, racemul și păstăile mai mici.

Specia *Glycyrrhiza echinata* L., (Coringlav), care crește spontan dar se și cultivă, nu este medicinală, rădăcina ei (*Echinatae radix*) are întrebuințări industriale (spume, extincătoare). Are

inflorescențe globuloase (la *G. glabra* L. sunt raceme alungite) și fructe cu țepi (la *G. glabra* sunt glabre și izolate) cu circa 2 semințe.

Din specia *G. glabra* L., la noi în țară se cultivă soiul local (populația) De Drăgănești, (din anul 1977) și soiul Julide (din anul 2003).

Producția și calitatea soiului Julide, comparativ cu populația locală De Drăgănești se prezintă în tabelul 4.11.1.1. (după Al. Volcov și colab., 2005).

Tabelul 4.11.1.1.
Producția și calitatea soiului Julide (*Glycyrrhiza glabra* L.),
comparativ cu populația locală (De Drăgănești)

Soiul (populația)	Producția		Acid glicirizic		Macromoleculele glucide	
	kg/ha	% față De Drăgănești	Conținut %	% față De Drăgănești	Conținut %	% față De Drăgănești
Soiul Julide	16544	112,4	12,09	111,5	8,34	119,8
Populația De Drăgănești	14708	100	10,84	100	6,96	100

Particularități biologice. *G. glabra* L. este o plantă perenă (subarbut), cu vivacitate de circa 20 de ani. Partea subterană este formată dintr-un rizom scurt și gros cu ramificații (lungi de 1 - 2 m și 0,5 - 2 cm grosime) de pe care pornesc rădăcini puternice de până la 2 m lungime. Tulpina aeriană este viguroasă (până la 2 m lungime), puțin ramificată, cilindrică în partea inferioară și muchiată în cea superioară. Frunzele sunt imparipenat compuse, lungi de 10 - 20 cm, cu 13 - 15 foliole ovate sau lat-eliptice (obișnuit mucronate la vârf), lungi de până la 5 cm și late de 1 - 2,5 cm; stipelele sunt mici și caduce. Florile sunt grupate în raceme alungite (de lungimea frunzelor), dispuse axilar, cu numeroase flori papilionate, scurt pedicelate, de circa 1 - 1,5 cm lungime. Caliciul scurt - campanulat, păros cu dinții mai lungi decât tubul lor, corola din cinci petale albastre - violet (carena cu petale neunite); androceul din 10 stamine diadelfe, gineceul cu ovar monocarpelar. Înflorște în lunile iunie - iulie. Fructul este o păstaie glabră, lungă de 15 - 25 mm și lată de circa 4 - 6 mm, cuprinzând 3 - 5 semințe. Semințele sunt reniforme de 2 - 3 mm lungime, de culoare brunie, lucitoare, cu MMB, de circa 10 g.




Fig. 4.11.1. *Glycyrrhiza glabra* L.
a - floare; b - fruct; c - rădăcini

Cerințele față de climă și sol. Lemnul dulce este o plantă originară din zone calde, având cerințe ridicate față de temperatură. Nu suportă înghețurile de lungă durată. Preferă zone ferite de vânturi puternice și reci. Merge bine pe soluri cu textură mijlocie spre ușoară, suficient de umede, însă bine drenate. Datorită sistemului radical bine dezvoltat, se poate folosi și în lucrările antierozionale (pe pante), de fixare și valorificare a nisipurilor (P. Glăvan și colab., 1984).

Zonare. Se recomandă cultivarea în zonele sudice și sud-estice ale țării (jud. Tulcea, Constanța, Galați etc.), precum și în alte zone agricole ale țării.

4.11.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Lemnul dulce se amplacează în afara asolamentului, după cereale de toamnă sau prășitoare.

Materialul de înmulțire se obține din parcele cu plante tipice, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea. La înființarea culturii se încorporează cu arătura 30 - 40 t/ha gunoi de grajd, 40 - 60 kg/ha P_2O_5 și 30 - 40 kg/ha K_2O , iar primăvara se aplică 40 - 50 kg/ha N (S. Male, 1986). Dozele de îngrășăminte chimice se aplică la doi ani, fosforul și potasiu toamna, azotul primăvara devreme. Pe nisipurile din sudul Olteniei, cu $Na_6P_{60}K_{60}$, în condiții de irigare s-a obținut în anul al patrulea de cultură 20 t/ha rădăcini și stoloni de lemn dulce (P. Glăvan și colab., 1984).

Lucrările solului. După eliberarea terenului de planta premergătoare se execută arătura la 30 cm adâncime. Arătura se pregătește pentru plantat prin lucrări cu discul în agregat cu grapa cu colți sau cu combinatorul.

Plantarea. Înmulțirea prin stoloni sau despărțirea tufelor este metoda cea mai sigură de înmulțire. Se practică plantarea stolonilor porțiți de pe rădăcina principală (după anul al doilea de vegetație), fasonați la 15 - 20 cm, cu 2 - 3 ochi sănătoși. Se plantează primăvara (sau toamna), în paralel cu recoltarea stolonilor, în rigole de 10 - 12 cm adâncime, la 80 - 100 cm între rânduri și 25 - 30 cm pe rând, folosind 1,8 - 2 tone/ha butași de bună calitate (E. Păun, 1995).

Înmulțirea prin semințe, se face prin *semănat direct în câmp* (toamna sau primăvara, la distanță de 80 - 100 cm, la adâncimea de 2,5 - 3 cm, cu 3 - 4 kg semințe/ha), sau prin *răscăd* (produs în strături reci - pentru un ha pe 150 - 200 m², cu 1 - 1,5 kg sămânță), plantat la 80 - 100 cm între rânduri și 25 - 30 cm pe rând (S. Male, 1986; E. Păun, 1995).

Lucrările de îngrijire. Se combat buruienile prin prașile, iar toamna tulpinile se cosesc la 8 - 10 cm (putând fi folosite ca furaj), apoi se face o bilonare pentru a mări rezistența la iernare. Pentru combaterea buruienilor se poate folosi erbicidul cu acțiune totală, Basta (4 l/ha), aplicat înainte de pornirea plantelor în vegetație. În timpul vegetației se pot utiliza erbicidele Basagran (3 l/ha) sau Pivot (1,5 l/ha) pentru combaterea buruienilor dicotiledonate, iar pentru cele monocotiledonate, erbicidul Furor (2 - 3 l/ha) (V. Plugaru, 2000).

Recoltarea. Rădăcinile și rizomii de lemn dulce se recoltează din al doilea an sau al treilea an de cultură, toamna după încetarea vegetației sau primăvara devreme, până nu începe creșterea plantelor. E. Păun, 1986, recomandă recoltarea începând din luna septembrie până în lunile martie - aprilie, o dată la 2 - 3 ani, în funcție de vigurozitatea tufelor. Se recoltează numai stolonii laterali și rădăcinile secundare, lăsând rădăcinile principale pentru ca planta să poată regenera, să-și formeze noi ramificații a organelor subterane. Pentru recoltare se sapă șanțuri sau gropi în jurul plantei, după care se taie stolonii și rădăcinile secundare. Se recomandă recoltarea rădăcinilor și rizomilor subțiri (nedescojite) care conțin mai multă glicirizină (S. Male, 1986). Stolonii care au rădăcini se pot despărți de planta mamă, lăsându-se să se dezvolte independent, în vederea regenerării culturii.

Condiționarea. După tăiere, rădăcinile și stolonii se scutură de pământ (lucrarea se poate repeta la nevoie după zvântare), eventual se trec sub un curent de apă (scurt timp, deoarece se pierd substanțele solubile), apoi se făonează (îndepărtarea părților uscate, seci, atacate de viermi, sau prea subțiri).

Se recomandă ca produsul să se așeze în grămezi acoperite cu paie, coceni sau stuf, pentru fermentare (10 - 15 zile), proces care duce la mărirea cantității de zaharuri și intensificarea culorii galbene (M. Alexan și colab., 1991). Pentru a nu mucegai în cursul fermentării, la 2 - 3 zile grămada se descoperă, se vântură cu furca, apoi se reface la loc. După fermentare, rădăcinile și rizomii se taie în bucăți de 20 - 30 cm, iar cele groase se despică. La cerere se execută și decorticarea unor cantități de rădăcini.

Uscarea se poate face pe cale naturală (la soare sau pe timp nefavorabil în încăperi bine aerisite și amenajate în acest scop) sau pe cale artificială la 35 - 40 °C (peste această temperatură, produsul se depreciază prin caramelizare). Produsul uscat se rupe la îndoire. Randamentul la uscare este de cca. 4 : 1.

După uscare, materia primă se ambalează în saci și se păstrează în încăperi curate, uscate și aerisite.

Condițiile tehnice de recepție pentru produsul uscat prevăd ca principii active: substanțe extractive minimum 25 %, acid glicirizinic, minimum 5 %; ca impurități: rizomi și rădăcini de culoare brună la interior, seci, maximum 4 %; corpuri străine organice, maximum 1 %, cele minerale, maximum 1 %, iar umiditatea maximum 14 %.

La produsul în stare proaspătă se prevăd ca principii active: substanțe extractive, minimum 8 %; acid glicirizinic, minimum 1,6 %; ca impurități: rizomi și rădăcini de culoare brună la interior, seci, maximum 4 %; corpuri străine organice, maximum 1 %, cele minerale, maximum 0,3 %, iar umiditatea normală a produsului la recoltare (fără urne de apă).

Producția care se obține la primele recoltări este de 10 - 12 t/ha produs proaspăt (2,5 - 3 t produs uscat), după care producția poate crește treptat, la 10 - 15 ani, putând ajunge la 40 - 60 t/ha produs proaspăt.

4.11.2. SCHINDUFUL (*Trigonella foenum - graecum* L.)

Fr: Fénu grec; E: Fenugreek; G: Griechischer Hornklee

4.11.2.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Semintele de schinduf s-au bucurat de o mare considerație în antichitate, fiind menționate de Dioscoride, de medicii arabi și egipteni (E. Grigorescu și colab., 2001). În antichitate era și o plantă de cult la egipteni. Este prezentat în Papirusul din Ebers, fiind recomandat în tratamentul arsurilor.

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă o constituie semintele (*Trigonellae semen*; *Foenugraeci semen*), care conțin: circa 0,4 % compuși azotați - colina și trigonelina (N-metil-betaina acidului nicotinic), 20 - 30 % substanțe glucidice (stachinoză și galactomanane), care conferă semintelor aspectul mucilaginos (în contact cu apa); 8 - 10 % lipide sterolice (lecitina, fitina etc.), circa 30% protide, substanțe amare, uleiuri volatile, taninuri, săruri de fier și magneziu etc. Metil-betaina acidului nicotinic dă naștere la vitamina PP (amida acidului nicotinic), cu rol important în metabolismul glucidic, protidic și lipidic, în activitatea sistemului nervos central etc. (F. Crăciun și colab., 1976, M. Boipai și colab., 2005, A. Ahmadiani și colab., 2004 etc.).

Utilizări. Complexul de compuși esențiali ai materiei prime constituie un bun stimulent neuro - muscular. Se utilizează ca apetisant, tonic general în stările de slăbiciune datorate asteniei fizice și psihice, în anemii, convalescență, sarcină, subnutriție, tulburări digestive, diabet etc. În Israel semințele sunt utilizate ca hipoglicemiant, în Sudan (semințele macerate în apă) se folosesc în tratarea tulburărilor gastrice și a dizenteriei, iar în țările arabe semințele au utilizare și ca afrodisiac (E. Grigorescu și colab., 2001). Activitate antidiabetică și hipocolesterolemiantă au fracțiunea bogată în steroli, fibre și galactomani (probabil datorită absorbției glucozei și grăsimilor), iar la efectul hipocolesterolemiant contribuie și saponozidele (care precipită colesterolul intestinal), combinația fiind insolubilă, este eliminată din organism (V. Istudor, 2005).

Răspândire. Schinduful își are originea în Asia, îndeosebi în India. Se cultivă pe suprafețe mai mari în Nordul Africii și țările mediteraneene (E. Grigorescu și colab., 2001). În Franța, Italia, Elveția etc. se cultivă ca plantă medicinală și cu utilizări în cosmetică. Planta este cultivată și pentru furaj în Africa de N și S, Asia Mică, Egipt, Grecia, Italia, China etc.

În România se cultivă foarte rar, găsind condiții în zona de șes, mai ales în partea de sud - est a țării (E. Păun, 1995).

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Trigonella foenum-graecum* L. (fig. 4.11.2., după Flora României, vol V, 1957 și 4.11.2.a, original).

Din specia *Trigonella foenum - graecum* L se cultivă soiul Robusta, din anul 2000.

Particularități biologice. Schinduful este o specie ierboasă, anuală, erectă. Rădăcina este pivotantă; tulpina de 30 - 70 cm, ramificată în partea superioară; frunzele trifoliolate, foliolele obovate, slab păroase pe dos; florile câte 1 - 2 la subsuara frunzelor superioare, de tip papilionat, corola gălbui sau slab liliachie (de 1,2 - 1,8 mm); fructele sunt păstăi alungite, drepte sau ușor curbate, de 8 - 10 cm lungime și 0,5 - 1 cm lățime, cu 10 - 20 semințe (4 - 5 mm lungime și 3 - 4 mm lățime), brun-gălbui, cu miros de cumarină.

Cerințele față de climă și sol. Plantă originară din zona mediteraneană, are cerințe ridicate față de temperatură (germinează la 8 °C și suportă temperaturi de până la 35 °C), are cerințe reduse față de umiditate și sol.

Zonele cele mai favorabile de cultură sunt în sudul țării (jud. Brăila și Constanța) (M. Alexan și colab., 1991), însă se poate cultiva și în alte zone agricole ale țării.




Fig. 4.11.2. *Trigonella foenum - graecum* L.

4.11.2.2. Tehnologia de cultivare

rotația. Schinduful intră în sola leguminoaselor anuale. Nu este pretențioasă față de planta premergătoare. Pe același teren poate reveni după doi ani.

Pentru loturile semincere se asigură o izolare de 1500 - 2000 m față de alte culturi de schinduf.

Fertilizare. Se face cu îngrășăminte chimice, 50 - 60 kg/ha P_2O_5 și cca. 20 kg/ha K_2O (toamna) și 25 - 35 kg/ha N primăvara.

Lucrările solului. Arătura de toamnă (25 - 30 cm) se pregătește pentru semănat primăvara prin lucrări cu discul în agregat cu grapa cu colți sau cu combinatorul.

Sămânța și semănatul. Schinduful se înmulțește prin semănat direct în câmp. Sămânța folosită la semănat trebuie să fie sănătoasă și cu valoare culturală (puritate și germinație) ridicată. Semănatul se face cu semănători universale (SUP-21, SUP-29), primăvara devreme (germinează la 8 °C), pentru a valorifica apa existentă în sol, la 45 - 50 cm între rânduri și adâncimea de 1 - 2 cm, folosindu-se circa 20 kg sămânță la ha (M. Alexan și colab, 1991, E. Păun, 1995).

Lucrările de îngrijire. După răsărire, plantele se răresc la 8 - 10 cm pe rând. În perioada de vegetație se execută prașile și pliviri pe rând de câte ori este nevoie, pentru a menține solul curat de buruieni și afănat.

În loturile semincere se face purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. Se face când păstăile încep să se usuce, iar semințele s-au îngălbenit. Pe suprafețe mari, recoltarea se face cu combină adaptată în acest sens, iar pe suprafețe mici cu secera, urmând să se treiere cu combina sau cu batoza.

Condiționarea. Sămânța se separă de impurități și se usucă până la umiditatea de 12 % în încăperi, în strat subțire, sau artificial,

Producția medie de semințe la schinduf este cuprinsă între 1300 - 1800 kg/ha.

4.11.3. MĂTURICEA

(*Sarothamnus scoparius* (L.) Wimm.;
Cytisus scoparius Link.)

Fr: Genêt a balai; E: Broom; G: Besenfriem, Besenginster

4.11.3.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Măturicea (măturica, drob) este o plantă eurasiatică (E. Coiciu și G. Răcz, 1962), amintită în scrierile lui Dioscorides și Galen (H. P. Dörfler și G. Roselt, 1984).

Materie primă și compoziție chimică. Materia primă o constituie *Sarothamni scoparii herba*, formată din tulpini și ramuri tinere fără frunze și flori, de culoare verde închis, fără miros și cu gust amarui.

Ramurile tinere conțin alcaloizi (până la 1,5 %), între care sparteina (0,5 - 1 %) și stereoizomeri (genisteina și sarotamina), hidroxitiramina (dopamina), amine etc., iar florile conțin scoparozidul (flavonoid) și alți compuși flavonoidici (V. Istudor, 2005, M. Corieue, 1995, E. Grigorescu și colab., 2001). Produsul vegetal se folosește pentru extracția industrială a sparteinei.

Utilizări. Sparteina (alcaloid puțin toxic) se folosește ca sedativ sau tonic cardiac, în obstetrică, ca ocitocic etc. Florile au proprietăți diuretice (datorită flavonoidelor). În *Farmacopeea Română* figurează cu *Sparteini sulfas* (sulfat de sparteină), produs în țara noastră. Amintim preparatele **Depasan** (care conține sparteină) și **Spartiol** (extract din produsul vegetal, standardizat în 1 mg. sparteină/ml). Este contraindicată administrarea preparatelor din acest produs vegetal în caz de hipertensiune arterială, sarcină și alăptare (U. Sănescu și colab. 2004).

Răspândire. Planta își are originea în Europa sudică și centrală, de unde a fost introdusă și în țara noastră, mai ales ca hrană pentru vânatul erbivor și în parcuri ca plantă decorativă (E. Păun, 1995). Măturicea este răspândită în Europa, Asia și SUA, iar principalii furnizori ai produsului vegetal sunt Germania, țările fostei Iugoslavii și Bulgaria (U. Sănescu și colab., 2004).

În România s-a introdus din Europa sudică și vestică, întâi cultivată apoi răspândindu-se ca plantă spontană în județele Arad și Timiș, ocupând suprafețe mai mari în Banat, Crișana și județul Alba (H. Popescu, 1984; M. Alexan și colab, 1991).

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată în țara noastră este *Sarothamnus scoparius* (L.) Wimm (sin. *Cytisus scoparius* Link.). Din specia *Sarothamnus scoparius* (L.) Wimm. (fig. 4.11.3., după Flora României, vol. V, 1957 și 4.11.3.a., original). În țara noastră s-a extins în cultură soiul local (populația "De Ștefănești" (din anul 1977).



Fig. 4.11.3. *Sarothamnus scoparius* (L.), Wimm.

Particularități biologice. Măturicea este arbust erect, de 1,5 - 2 m înălțime. Rădăcina este pivotantă, ramificată, prevăzută cu nodozități. Tulpina principală prezintă numeroase ramificații, 5 - nuchiate, de culoare verde tot timpul anului. Frunzele sunt alterne trifoliolate cu foliole ovate de 1 - 2 cm. Florile papilionate, câte 1 - 2 la subsuara frunzelor, lungi de circa 2 cm, cu calicul bilabiat, corola galben - aurie, androceul format din 10 stamine (4 mai lungi), gineceul cu ovar păros, iar stilul spiralat curbat. Înfloarește în lunile mai - iunie. Fructul este o păstăie turtită (3,5 - 5 cm lungime și circa 0,8 cm lățime), negricioasă, păroasă, cu 8 - 15 semințe.

Cerințele față de climă și sol. Măturicea are cerințe ridicate față de temperatură și reduce față de umiditate. Este destul de rezistentă la secetă și suferă la temperaturi scăzute. Este o plantă cu pretenții reduse față de sol, valorificând terenuri improprie altor culturi. Fixează solul și-l îmbogățește în azot, prin intermediul bacteriilor cu care trăiește în simbioză.

Zonele de cultivare sunt în sudul și vestul țării.

4.11.3.2. Tehnologia de cultivare

Măturicea s-a introdus inițial în vestul țării, ca plantă cultivată sub forma unor plantații, iar ulterior s-a răspândit ca plantă subspontană, de unde se obține material primă.

Recoltarea. Părțile aeriene (ramurile tinere) se recoltează în perioada octombrie - martie, când conținutul de sparteină este mai ridicat. Ramurile tinere se taie cu foarfeci de vie, se curăță de cele bătrâne sau înegrite.

La cerere, se recoltează (în luna mai) și florile (*Sarothamni flos*) în stare uscată, de culoare galbenă - brunie, fără gust și cu miros plăcut.

Conditionarea. Uscarea se face pe cale naturală (soproane etc.) sau artificială la 50 - 60 °C. Randamentul la uscare este de circa 2:1.

Condițiile tehnice de recepție nu admit tulpini cu baza mai groasă de 1 cm și corpuri străine organice, corpuri străine minerale, maximum 1 %, iar umiditatea, maximum 13 %.

Producția. La ha se obțin circa 20 t herba în stare proaspătă.

Observații. Culturile de măturice existente trebuie menținute și protejate de unele tendințe de defrișare. Măturicea folosește terenuri improprie altor plante, îmbogățește solul în azot și se poate valorifica economic ca plantă medicinală.

4.11.4. CIUMĂREA

(*Galega officinalis* L.)

Fr: Galéga; E: Goat srue; G: Geissraute

4.11.4.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Materia primă și compoziția chimică. De la ciumărea (scrântitoare) se folosește în scop farmaceutic partea aeriană a plantei (*Galegae herba*).

Produsul vegetal conține galegină (un derivat al guanidinei), guanidină, derivați flavonici, un alcaloid etc. (K. Klugh, 1998, E. Grigorescu și colab., 2001). Conținutul de galegină este de 0,1 - 0,3 % în herba și până la 0,5 % în semințe (V. Istudor, 2005). Dintre derivații flavonici, s-a pus în evidență luteolina în stare liberă și legată de glucoză (galuteolină) (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Conținutul în flavone al herbei (într-un studiu întreprins la Cluj-Napoca) a fost de 0,675 g % (înainte de înflorire) - 0,782 g % (în timpul înfloririi) (L.S. Muntean și colab., 1992/93).

Utilizări. Principiile active au acțiune galactogă și hipoglicemiantă - în diabetul incipient (M. Alexan și colab, 1991). Acțiunea hipoglicemiantă rezultă ca un efect excitant al pancreasului endocrin. Produsul vegetal (sub formă de infuzie) se administrează ca adjuvant în tratamentul diabetului, intră în compoziția unor medicamente cu proprietăți antidiabetice (**Antidiabeticum hanosan**) etc. (U. Sănescu și colab. 2004). Produsul vegetal și preparatele pe baza principiilor sale active au efect galactogog (fără efecte secundare nedorite), mărind atât volumul secreției lactate, cât și conținutul de substanță uscată al acesteia (E. Grigorescu și colab., 2001). Se menționează și efectul diuretic, diaforetic, antihelmintic, antispasmodic etc. Este cunoscută și ca plantă ornamentală.

Sistematică și soluri. Specia cultivată este *Galega officinalis* L. (fig. 4.11.4. după Flora României, vol V, 1957 și 4.11.4.a., original). În cultură sunt populații locale.

Particularități biologice. *Galega officinalis* L. este o plantă ierboasă perenă. În sol are un rizom scurt și sistem radical bine dezvoltat. Tulpinile erecte, au înălțimea de circa 100 cm, în cultură ajungând la 175 cm. Frunzele sunt pețiolate, dispuse altern, sunt imparipenate, lungi de până la 20 cm, cu 11 - 17 foliole lanceolate

(lungi de 2 - 4 cm și late de 0,4 - 2 cm) și două stipele lungi de circa 1 cm.



Fig. 4.11.4. *Galega officinalis* L.
a - racem fructifer

Florile sunt dispuse în raceme laxe de circa 10 - 12 cm, cu caliciul campanulat 5 dințat, corola palid liliachie, albăstrui sau albă, 10 stamine monodelte și ovar superior. Fructul este păstăie, lineară, glabră, de 2 - 3 cm lungime și 2 - 3 mm grosime, de culoare roșie brună, cu 5 - 7 semințe. Semințele sunt alungite de circa 7 mm, comprimate, de culoare brună (A. Nyárády, 1957).

Fenologia speciei *Galega officinalis* (L.) în primul și al doilea an de vegetație, în condițiile de la Cluj-Napoca, în funcție de sistemul de cultură (semănat direct în câmp sau plantat) se prezintă în tabelul 4.10.4.1. (după L.S. Muntean și colab., 1992/93).

Tabelul 4.10.4.1.

Fazele fenologice la *Galega officinalis* L., anul întâi și doi de vegetație, la plante provenite din semănat direct în câmp și din plantat răsad, în condițiile de la Cluj-Napoca

Fazele fenologice	Perioada	Nr. de zile	% din total
Anul I - semănat direct în câmp^{xi}			
• Semănat-apariția primelor frunze	7 V - 10 VI	35	23
• Apariția primelor frunze-apariția lăstarilor	11 VI-8 VIII	59	39
Apariția lăstarilor-încheierea vegetației	9 VIII-2 X	55	38
Total		149	100
Anul I - plantat răsad^{xxi}			
• Semănat în ghivece nutritive	6 III	-	-
• Apariția primelor frunze-plantat în câmp	18 III-6 V	50	25
• Plantat în câmp-îmbobocit	7 V-8 VII	64	33
• Îmbobocit-înflorire maximă	9 VII-4 VIII	27	15
• Înflorire maximă-coacerea semințelor	5 VIII-26 IX	53	27
Total		194	100
Anul II de vegetație:			
• Apariția rozetei bazale-apariția lăstarilor	1 IV-20 IV	20	18
• Apariția lăstarilor-îmbobocit	21 IV-28 VI	69	61
• Îmbobocit-înflorire maximă (recoltare)	29 VI-23 VII	24	21
Total		113	100

Notă: x) Media variantelor semănat direct în câmp - la 75 cm și 100 cm între rânduri

xx) Media variantelor plantate la distanța de (cm): 100/100; 100/75; 100/50; 75/75

În primul an de vegetație, plantele provenite din răsad au înflorit în proporție de 60 %, iar cele din semănat direct în câmp au înflorit sporadic (5 - 6 %).

Răspândire - zone de cultură. *Galega officinalis* L. este originară din Europa Meridională. Furnizorii principali ai produsului vegetal sunt Polonia, Bulgaria și Ungaria.

La noi în țară este întâlnită frecvent în livezi, pajiști umede, pe malul apelor și dumbrăvi.

Se recomandă cultivarea în arealul de răspândire naturală.

4.11.4.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Cultura se amplasează după plante care lasă terenul curat de buruieni și cu o bună stare de fertilitate.

Lucrările solului. Arătura se face la 25 cm adâncime, imediat după eliberarea terenului de planta premergătoare. Patul germinativ se pregătește cu combinatul.

Fertilizarea. Se aplică îngrășăminte chimice ($N_{40-80}P_{40-60}$) în funcție de fertilitatea solului.

Înmulțirea se poate face și prin semănat direct în câmp, sau prin plantat răsad produs în seră. Plantele provenite din răsad, în primul an de vegetație, înfloresc peste 50 %, iar cele semănat direct în câmp înfloresc doar sporadic. Din anul doi de vegetație, fazele fenologice la cele două sisteme de cultură sunt similare.

Semănatul direct în câmp se face la sfârșitul lunii aprilie, la 62,5 - 75 cm între rânduri, folosind circa 2 kg/ha sămânță (circa 15 pl/m², la rășuire).

Pentru producerea răsadului, în seră, semănatul se face în prima decadă a lunii martie, în ghivece nutritive. Plantarea în câmp are loc la sfârșitul lunii aprilie, la distanță de 75 cm între rânduri și 30 cm pe rând.

Lucrări de îngrijire. În cursul vegetației cultura se menține curată de buruieni, prin prașile între rânduri și pliviri pe rând.

Recoltarea părții aeriene se face la înflorire, prin cosire. În anul al doilea și al treilea se fac 2 recolțări pe an.

Producția. Se obțin circa 20 - 25 t/ha produs proaspăt, din anul al doilea de vegetație.

4.12. FAMILIA ONAGRACEAE

4.12.1. LUMINIȚA (*Oenothera biennis* L.)

Fr: Onagre; E: Evening primrose ;G: Die Nachtkerze

4.12.1.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Luminița este originară din America, unde se folosea de către băștinași în vindecarea afecțiilor și a unor răni, în tratarea răgușelilor (cu extract fluid din frunze și tulpini etc.). Uleiul din semințele acestei plante a fost folosit de indienii din America de Nord ca remediu cicatrizant pentru răni și antifusiv (E. Grigorescu și colab., 2001). O lungă perioadă luminița nu a fost folosită în medicina cultă, însă a revenit în ultimul timp în actualitate prin utilizarea uleiului obținut de la această plantă în diverse afecțiuni (I. Borcean și colab., 1989, L.S. Muntean și colab., 1996/97, E. Rock și A. DeMichele, 2003, A. Horablagă-Mihalea, 2005).

Materia primă și compoziția chimică. Luminița (luminița nopții) este cunoscută ca plantă ornamentală și cu utilizări medicinale. Planta conține fitosterine, alcool cerilic, rășini, mucilagii etc. Are proprietăți depurative, emoliente și antidiareice etc., cu utilizări limitate până în prezent.

Materia primă o constituie semințele (*Oenotherae semen*) și uleiul gras (*Oenotherae oleum raffinatum*). Se folosește, cu rezultate notabile, ca materie primă în industria de medicamente, uleiul din semințele de luminiță (G. Pintilie și colab., 1993; L.S. Muntean și colab., 1996/97; A. Horablagă - Mihalea, 2005). Uleiul din semințele acestei plante are un conținut însemnat de acizi grași polinesaturați dintre care se remarcă acidul γ -linolenic (8 - 14 %), acidul linoleic (65 - 80 %), acid oleic esterificat (6 - 11 %) (V. Istudor, 1998). Conținutul mediu de ulei gras al semințelor este de 18 - 22 % (E. Grigorescu și colab., 2001). După G. Pintilie și colab., 1992, semințele conțin 17,5 - 23,4 % ulei, cu 6,34 % ac. γ -linolenic, respectiv 73 % ac. linolenic.

Din studiile întreprinse la Cluj-Napoca (prin analiză cromatografică în fază gazoasă) s-a stabilit următorul conținut al uleiului din semințele de luminiță: acid palmitic (6,19 %), acid stearic

(1,47 %), acid oleic (11,9 %), acid linoleic (70,94 %) și acid γ -linolenic (9,49 %) (L.S. Muntean și colab., 1996/97).

Utilizări. Prin conținutul de acizi grași polinesaturați (între care acidul gama - linolenic și acidul linoleic), uleiul de luminiță a dat rezultate bune în tratamentul unor afecțiuni, între care și hiperlipemia (G. Pintilie și colab., 1993). Studiile întreprinse în ultimii ani, atestă reale calități a uleiului din semințele de luminiță, ca agent terapeutic hipoglicemiant.

Acidul gamma - linolenic este un acid gras nesaturat, precursor al prostaglandinelor, utilizat în tratamentul afecțiunilor hepatice, în reumatism, unele afecțiuni cardio - vasculare, boli dermatologice, care sunt cauzate de dereglări ale metabolismului prostaglandinelor.

Uleiul de luminiță se utilizează și în cosmetică pentru întreținerea tenului.

Răspândire. *Oenothera biennis* L. este originară din America de Nord și Centrală, a fost adusă în Europa la începutul secolului al XVII-lea (1612). În țara noastră specia este răspândită pe terenuri nisipoase, în lunci și zăvoaie, pe malul râurilor, locuri ruderaie, este cultivată ca plantă ornamentală și medicinală în ultimii ani. Studiile întreprinse în țara noastră, au dovedit preabilitatea culturii luminiței cu rezultate bune în condițiile din vestul țării (I. Borcean și colab., 1989, A. Anablagă-Mihalea, 2005).

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Oenothera biennis* L. (fig. 4.12.1., după Flora României, vol. V, 1957 și 4.12.1.a., original). În cultură sunt populații locale și diferite proveniențe.

Particularități biologice. *Oenothera biennis* L. este o plantă bienală ierboasă, cu rădăcină napiformă, care formează în anul întâi o rozetă de frunze, iar în anul doi tija florală. Tulpina floriferă este erectă, de circa 1 - 1,5 (2) m și ramificată. Frunzele bazale sunt alungit obovate sau eliptice, îngustate într-un pețiol lung, cele tulpinale sunt pețiolate sau subsesile, alungit lanceolate, de circa 10 cm lungime și 3,5 cm lățime. Florile sunt de 2 - 3 cm lungime, axilare, solitare, mirositoare, cu patru petale galbene sulfurii și opt stamine. Fructele sunt capsule liniar alungite (circa 3 cm), cu numeroase semințe brune, de circa 1,5 mm. Fenofazele la *O. biennis* L. cultivată prin semănat direct în câmp în condițiile de la Fundulea (1986 - 1989), se prezintă în tabelul 4.12.1.1. (după M. Mircea, 1992).

În Câmpia vestică a țării, prin semănat direct în câmp în prima decadă a lunii aprilie, luminița formează în anul I o rozetă viguroasă de frunze, în anul II o tulpină înaltă de circa 1 m și o producție de semințe de 750 - 800 kg/ha (I. Borcea și colab., 1989).



Fig. 4.12.1. *Oenothera biennis* L.
a - porțiune din racemul fructifer

Cultivată prin răsad, *Oenothera biennis* L. în primul an de vegetație formează primele tije florale. În anul al doilea de vegetație plantele, în perioada înfloririi, au atins înălțimea de 150 - 170 cm (tabelul 4.12.1.2., după L.S. Muntean și colab., 1996/97).

Tabelul 4.12.1.1.

Principalele fenofaze de vegetație la specia *Oenothera biennis* L. cultivată prin semănat direct în câmp în condițiile de la Fundulea

Fenofaza	Varianta - perioada de semănat		
	în pragul iernii	primăvara (marie)	primăvara (aprilie)
Data semănării	6.11	15.03	5.04
Data răsării	15.04	20.04	25.04
Inceputul înfloririi	1.07	4.07	5.07
Recolta	10.09	12.09	12.09
Durata fenofazelor	numărul de zile		
Semănat-răsărit	30	36	20
Răsărit-începutul înfloririi	76	75	71
Răsărit-recolat	148	145	140

În condițiile din vestul țării, prin semănatul luminii toamna, plantele fructifică normal în anul următor, tulpina are în medie 140 - 150 cm, numărul de ramificații este de 6 - 9 pe plantă, iar numărul de capsule pe plantă de 130 - 340 (A. Horablagă - Mihalea, 2005).

Zonare. Planta se poate cultiva pe soluri mijlocii, fertile, în diferite zone agricole ale țării. Întârnește condiții pedoclimatice favorabile în Câmpia de Vest a României (I. Borean și colab., 1989, A. Horablagă - Mihalea, 2005).

4.12.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Luminia se amplasează după plante care eliberează terenul vara sau la începutul toamnei, pentru a permite pregătirea terenului în condiții optime.

Fertilizarea. În funcție de starea de fertilitate a solului, se aplică doze de 80 - 90 kg azot, 60 - 70 kg fosfor și 50 - 60 kg potasiu. Doze prea mari de azot reduc conținutul de ulei în semințe. În Câmpia de Vest a țării se recomandă N₅₀ P₆₀ K₆₀ (A. Horablagă și I. Borean, 2005).

Într-un studiu, întreprins de I. Borean și colab., 1989, în condițiile din vestul țării, la SDE a USAMV a Banului Timișoara, între anii 1986 - 1988, privind nivelul de fertilizare și perioada de semănat la *Oenothera biennis*, s-a constatat că îngrășămintele cu azot au influențat favorabil producția de semințe și ulei la doza de N₈₀, pe fond de P₇₀K₇₀, doza mai economică dovădindu-se N₄₀. În tabelul

4.12.1.3. (după I. Borcean și colab., 1989) prezentăm conținutul în ulei la această plantă, în funcție de fertilizare și perioada de semănat, în condițiile de la Timișoara.

Tabelul 4.12.1.2.

Formarea organelor vegetative și generative la specia *Oenothera biennis* L., cultivată prin răsăd în condițiile de la Cluj-Napoca

Fenofaze	Prinul an de vegetatie			Al doilea an de vegetatie		
	Perioada	Nr. zile	%	Perioada	Nr. zile	%
Semnănat în ghivece nutritive (seră)-formarea a 1-2 frunze	16 III-22 III	7	4	-	-	-
Formarea a 1-2 frunze-transplantare (4-6 frunze)	23 III-6 VI	76	41	-	-	-
Transplantare (4-6 frunze)-aparitia tijeilor florale	7 VI-29 VII	53	29	16 V	13	11
Aparitia tijeilor florale-aparitia butonilor florali	30 VII-10 VIII	12	8	28 V	25	22
Aparitia butonilor florali-inflorirea maximă	11 VIII-13 IX	34	18	22 VI	39	32
Inflorirea maximă-formarea capsulelor	-	-	-	31 VII	42	35
Formarea capsulelor-recoltarea semințelor	-	-	-	11 IX		
Total		182	100		119	100

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 23 - 25 cm adâncime, cu plugul în agregat cu grapa stelată. Patul germinativ se pregătește cu combinatul. Dacă terenul se afânează prea adânc se recomandă tăvălugitul înainte de semănat pentru a se putea respecta adâncimea de semănat de 0,5 - 1 cm.

Tabelul 4.12.1.3.

Conținutul în ulei total (%) la *Oenothera biennis* L. în funcție de fertilizare și perioada de semănat în condițiile de la Timișoara

Nivelul de fertilizare	Perioada de semănat	
	1-10 aprilie	20-30 aprilie
$N_{50}P_{70}K_{70}$	19,43	18,88
$N_{50}P_{70}K_{70}$	19,53	19,21
$N_{50}P_{70}K_{70}$	19,56	19,8
$N_{50}P_{70}K_{70}$	19,88	19,87
		17,55

Sămânța și semănatul. Luminița se înmulțește în mod obișnuit prin semănat direct în câmp. Sămânța trebuie să fie sănătoasă și cu valoare culturală (puritatea și germinația) cât mai ridicată. Luminița se poate semăna primăvara, în luna aprilie (tabelul 4.12.1.3., după I. Borcean și colab., 1989). În condițiile de la Fundulea (1986 - 1989) s-au obținut cele mai bune rezultate prin semănatul luminiiței

primăvara imediat ce se poate lucra în câmp (tabelul 4.12.1.4., după M. Mircea, 1992).

Tabelul 4.12.1.4.

Influența perioadei de semănat asupra desimii, înălțimii, ramificării și a producției de semințe la *Oenothera biennis* L., în condițiile de la Fundulea

Varianta	Desimea (pl/m ²)	Înălțimea (cm)	Nr. ramificațiilor	Lungimea ramificațiilor (cm)	Producția de semințe (g/ha)
Semănat în pragul iernii	6,2	112,1	10,7	53,3	5,8
Semănat primăvara (martie)	9,3	110,2	9,8	52,6	7,6
Semănat primăvara (aprilie)	8,1	108,1	9,9	52,9	6,7

În condițiile din vestul țării, după cum rezultă din tabelul 4.11.1.5., (după A. Horabla și I. Borcean, 2005), s-a constatat că luminița se poate semăna atât toamna (la sfârșitul lunii octombrie) cât și primăvara (la finele lunii martie), rezultatele obținute fiind sensibile egale. Prin semănatul primăvara nu se obțin diferențe semnificative de producție față de semănatul de toamnă, însă se pierde un an de recoltă, cu altă cultură, fapt important sub aspect economic, privind valorificarea eficientă a terenului. Din aceste considerente, în vestul țării se recomandă semănatul luminiiței toamna, după premergătoare care eliberează terenul devreme (A. Horabla - Mihalea, 2005).

Tabelul 4.12.1.5.

Producția de sămânță la *Oenothera biennis* L. în funcție de perioada de semănat și nivelul de fertilizare, în condițiile de la Timișoara (sinteza pe ciclul exp. 2002-2004)

Factorul A Epoca de semănat	Factorul B - nivelul de fertilizare			Mediile factorului A		
	$N_{50}P_{70}K_{50}$	$N_{50}P_{70}K_{50}$	$N_{50}P_{70}K_{50}$	Producțiile de semințe (kg/ha)	%	Dif. kg/ha
A ₁ - semănat 20-30 III	578	886	926	797	100	-
A ₂ - semănat 20-30 X	589	874	902	788	98	-9
Mediile factorului B				DL 5 % = 17 kg/ha; DL 1 % = 40 kg/ha; DL 0,1 % = 127 kg/ha		
Producția de sămânță (kg/ha)	583	880	914			
%	100	151	157			
Diferența (kg/ha)	-	297	331			
Semnificația	-	xxx	xxx			
DL 5 % = 16 kg/ha; DL 1 % = 23 kg/ha; DL 0,1 % = 30 kg/ha						

Semnăatul se face în rânduri la 50 cm distanță, caz în care se obțin producții mai mari decât la 12,5 cm, sau 25 cm, sau 75 cm între rânduri (A. Horablaga - Mihalea, 2005). Adâncimea de semănat este de 0,5 - 1 cm, iar cantitatea de sămânță de 2 - 4 kg/ha.

Lucrările de îngrijire. În cursul vegetației, cultura se menține curată de buruieni, prin trei prașile mecanice între rânduri și două prașile pe rând (sau pliviri).

Recoltarea se face când se brunifică semințele în capsule, manual (pe suprafețe mici) sau cu combina, adaptată în acest scop (pe suprafețe mai mari).

Condiționarea. După recoltare semințele se usucă la umiditatea de păstrare (11 %).

Producția de semințe este de 600 - 900 kg/ha, iar producția de ulei 100 - 150 kg/ha.

4.13. Familia MALVACEAE

4.13.1. NALBA MARE

(*Althaea officinalis* L.)

Fr: Guinauve; E: Marshmallow;

G: Gebräuchlicher Eibisch, Echer Eibisch

4.13.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Nalba mare a fost cunoscută din antichitate de greci și romani, fiind amintită în scrierile lui Dioscorides, Theophrast, Galen și Plinius (H.P. Dorfner și G. Roselt, 1984). Numele genului derivă de la grecescul "*althain*" = a ajuta, a vindeca, cu referire la însușirile medicinale ale plantei (I. Morariu, 1958).

Materia primă și compoziția chimică. De la nalba mare se folosesc frunzele (*Althaea folium*), florile (*Althaea flos*) și rădăcinile (*Althaea radix*).

Rădăcinile conțin mucilagii (25 - 35 %), amidon (30 - 35 %), pectine (10 %), glucide simple, aminoacizi (asparagină), iar frunzele mucilagii (5 - 6 %), flavone, tanin (S.T. Ilieva, P. Peneva, 1984, S. Radu, 2000, M. Tănaș și colab., 2005 etc.). Principalele componente chimice ale rădăcinilor, frunzelor și florilor, după V. Cucu și colab., 1982 sunt cuprinse în următoarele limite. În rădăcini, amidon (20 - 37%), mucilagii (10 - 35 %), lipide, protide, flavonoide, săruri minerale etc. Prin hidroliza acidă a mucilagilor brute se obține: galactoză (4,8 - 43,2 %), ramnoză (9,75 - 28,7 %), glucoză (17,7 - 29,2 %), acid galacturonic (12,55 %), arabinoză, xiloză etc. În frunze, mucilagii (9 - 16 %), care, prin hidroliză acidă, pun în libertate compuși arătați la rădăcini (în proporții diferite); ulei volatil (cca 0,022 %), cu miros neplăcut, plastochinone, săruri minerale etc. Florile conțin, ca și frunzele, mucilagii (cca 6 %) și ulei volatili (0,024 %), care, în timpul păstrării la temperatura camerei, cristalizează și primește miros de miere. În alte lucrări se menționează în rădăcină 10 - 25 % mucilag, 20 - 30 % amidon, pectine 5 - 10 %, oze reducătoare, proteine, lipide, săruri minerale, 2 % asparagină, betaină (V. Istudor, 1998).

Utilizări. Principiile active sunt reprezentate de mucilagii și produșii de hidroliză. Planta nu conține compuși toxici. Prezența

mucilagiilor conferă produsului acțiunea emolientă, calmantă și antidiareică. Se folosesc în tratamentul inflamațiilor căilor respiratorii (tuse, bronșită, laringită) și în tulburări gastrointestinale (diaree). Frunzele se folosesc intern ca infuzii, iar extern sub formă de decoct, în gargară, cataplasme, spălături etc. Frunzele intră în compoziția **Ceaiului pectoral nr. 2** și **Ceaiului pentru gargară**. Frunzele (*Althaeae folium*) și rădăcinile (*Althaeae radix*) intră în *Species pectorales* (*Farmacopeea Română*). *Althaeae radix* (pulverizat sau extracte) intră în compoziția unor preparate industriale (**Risinetin** etc.) și a speciilor pectorale (**Bronchostad**, **Solubifix** etc.) indicate în afecțiuni inflamatorii ale căilor respiratorii (U. Stănescu și colab., 2004).

S-a dovedit că una din fracțiunile poliholozidice din compoziția mucilagiului de *Althaeae* are puternice proprietăți imunostimulente, fapt ce explică acțiunea decoctului de *Althaea*, utilizat în răceli, gripe, viroze (E. Grigorescu și colab., 2001).

Răspândire. Nalba mare este originară din Europa, Vestul Astei, Nordul Africii și naturalizată în S.U.A. La noi în țară crește în lungul apelor pe soluri nisipoase, pe soluri alcaline (sărâte) și locuri ruderales. Se cultivă în Germania, Franța, Italia, țări balcanice, Rusia. Produsul vegetal este furnizat în principal de țările Vest Europene.

Sistematică. Soluri. Specia cultivată este *Althaea officinalis* L. (fig. 4.13.1., după G. Răcz și colab., 1970 și 4.13.1.a., original). Specia *Althaea officinalis* L. are 2 n = 42 (44) (A. Laza și G. Răcz, 1975).

În flora spontană, sunt și alte specii înrudite cu aceasta: *A. pallida* Wet K, care are flori cu diametrul mai mare; *A. taurinensis* DC, cu frunze adânc palmat lobate și pedicel floral mai lung de 1 cm. Din cadrul genului *Althaea*, este și specia *A. rosea* (nalba de grădină). Însușiri medicinale s-au semnalat în Iugoslavia și la specia *Althaea cannabina* L. (M. Gorunovic și colab., 1982).

Din *A. officinalis* L. se cultivă soiul local (populația "De Teleorman", din anul 1980).

Particularități biologice. *Althaea officinalis* L. este o plantă perenă. Rădăcina este cămoasă, de 10 - 30 cm lungime și până la 2 - 3 cm grosime, cu puține ramificații, groase, cenușe - deschis la suprafață și alb - gălbuie la interior. Tulpina are înălțimea de 1 - 2 m, cilindrică, cu ramificații reduse, lignificată la bază și păroasă. Frunzele sunt pețiolate, limbul cu 3 - 5 lobi, de 4 - 10 cm lungime și lățimea ceva mai redusă, cu peri foarte deși (catifelai). Florile sunt dispuse în raceme la vârful tulpinii; au caliciul dublu păslos pârșos, corola

formată din 5 petale alb - roz, triunghiulare, cu lungimea de 1 - 2 cm, androceul format din numeroase stamine, gineceul cu ovarul compus din 10 - 20 carpele și tot atâtea stigmate. Înflorește din iulie în septembrie. Fructele sunt formate din mai multe mericarpe (câte carpele a avut ovarul), dispuse radial în caliciul persistent. Fiecare mericarp conține o sămânță. Semințele sunt reniforme, de 3 - 4 mm lungime, 1 - 2 mm lățime și 0,5 - 1 mm grosime.




Fig. 4.13.1. *Althaea officinalis* L.

Cerințele față de climă și sol. Față de temperatură nu are cerințe prea mari, crescând spontan și în zone cu altitudine mai mare. Suportă bine și temperaturile mai ridicate. Fiind păroasă, întreaga plantă are rezistență bună la secetă. Nalba mare pretinde umiditate

bună în sol, având cerințe destul de ridicate față de apă. Reușește bine pe soluri umede însă permeabile, cu textură mijlocie spre ușoară și bine aprovizionată cu elemente nutritive. Poate valorifica și solurile ușor sărăturoase, cum sunt cele din Câmpia de Vest a țării noastre.

Zonare. Cele mai favorabile zone de cultură sunt luncele râurilor din județele Tulcea, Ialomița, Dolj și Timiș (R. Bondrescu, 1982).

4.13.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Nalba mare se amplasază în afara asolamentului (ca plantă bienală sau trienală) (M. Alexan și colab., 1991), după cereale păioase sau prășitoare ceva mai timpurii. Pe același teren nu poate reveni mai repede de 6 ani.

Materialul de înmulțire se obține din parcele cu plante tipice, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea. Se aplică 40 - 60 kg/ha P_2O_5 și 40 - 50 kg/ha K_2O (incorporate cu arătura adâncă) și 80 - 100 kg/ha N (primăvara devreme) (R. Bondrescu, 1982; S. Radu, 2000).

Lucrările solului. Arătura se face la circa 30 cm adâncime și se menține curată de buruieni prin lucrări cu discul în agregat cu grapa cu colți. Pregătirea patului germinativ se face cu combinatorul sau cu discul + grapa cu colți, urmând să se execute și tăvălugitul.

Sămânța și semănătul. Nalba mare se înmulțește prin semănat direct în câmp. Sămânța trebuie să aibă puritatea de 85 % (minimum 75 %), iar germinația de 65 % (minimum 50 %). Semănătul se face în teren bine pregătit, în pragul iernii sau primăvara foarte devreme, cu semănători universale (E. Păun, 1995). Densitatea la răsărire trebuie să fie de 15 - 20 plante/ m^2 (E. Scoreico, 1986), distanța între rânduri de 70 cm, adâncimea de semănat de 1 - 2 cm, iar cantitatea de sămânță 7 - 9 kg/ha (pe soluri îmburuienate se adaugă și planta indicatoare circa 100 g sămânță de salată etc.).

Lucrările de îngrijire. Constan în combaterea buruienilor prin prașile (prima după răsăritrea plantei indicatoare) și pliviri ori de câte ori este nevoie, rădăria plantelor când au 7 - 8 cm, lăsând 5 - 6 plante la metrul liniar. Pentru combaterea buruienilor se recomandă Balan (6 l/ha), înainte de semănat, Granoxone (3 l/ha) și Roundup (3 l/ha), după răsăritrea buruienilor și înainte de răsăritrea culturii, iar pe vegetație Furor (2 l/ha) (S. Radu, 2000). Rugina (*Puccinia malvacarum* Bert) se combate prin stropiri cu permanganat de potasiu 1 %; puricii nalbei (*Podagrica malvae* Ill și *Podagrica fascicoritis* L.) se combat prin tratamente repetate (la 6 - 8 zile), la

aparitia dăunătorilor, cu piretroizii de sinteză Decis 2,5 EC (0,05 %), Sumi-alpha 2,5 EC (0,02 %), Fastac 10 EC (0,02 %) sau cu produse organofosforice: Nogos 50 CE 0,1 %, Diazion 60 EC - 0,1 % etc. (E. Scoreico, 1986; M. Alexan și colab., 1991; S. Radu, 2000). Înainte cu o lună de recoltare tratamentele se sistază. Toamna, la sfârșitul vegetației, tulpinile se cosesc.

În loturile semincere se execută purificarea biologică și nu se recoltează frunzele și florile de pe plantele de nalbă mare rămase în lan.

Recoltare. Frunzele se pot recolta din anul întâi de vegetație, urmând să se recolteze și în anul doi sau trei de vegetație cât se menține cultura. Perioada de recoltare a frunzelor este la maturitatea lor, înainte sau în timpul înfloririi, egalat pentru a menține planta în vegetație. Recoltarea frunzelor se face cu mâna, eventual cu foarfeca de vie, luându-se fără pețiol.

Florile, dacă sunt solicitate, se recoltează în perioada înfloririi, luându-se în întregime (cu caliculi).

Rădăcinile se recoltează în anul doi sau trei, toamna după încetarea vegetației, când conținutul de mucilagii este maximum. Se cosesc întâi tulpinile, apoi se scot rădăcinile cu plugul fără cornană și se adună cu furcile.

Loturile semincere se recoltează când circa 50 - 60 % din fructe au culoarea cenușie. Plantele se taie cu seceră, se usucă în snopi, apoi se treieră.

Condiționarea. În cazul frunzelor, după recoltare, se înlătură frunzele atacate de boli (rugină) sau dăunători, precum și cele brunificate apoi se trec la uscat. Uscarea se poate face pe cale naturală (în încăperi uscate, aerisite și amenajate în acest scop) sau artificial, la 40 - 50 °C. Rândamentul la uscare, la frunze, este de cca. 4 : 1.

Florile se usucă, în același condiții arătate la frunze, rândamentul la uscare fiind de 4 - 5 : 1.

La rădăcini, după recoltare se înlătură pământul prin scuturare și spălare (scurt timp, la un curent de apă de oarece mucilagiiile sunt solubile) și să se curețe de părțile lignificate de cele seci sau atacate de dăunători. Produsul solicitat ca atare (cu rădăcină nedescosată) se taie în fragmente de maximum 20 cm, cele groase se despică și se trec la uscat. La produsul descosât, se decortică suberul și o parte din scoarța primară, se secționează în fragmente de maximum 20 cm, cele groase despicându-se longitudinal. Dacă se solicită fragmentarea se face în rondoale de 1 - 2 cm sau cuburi, având aceleași dimensiuni. Uscarea rădăcinilor se face la soare, în încăperi uscate și aerisite, sau artificial

la 40 °C (la temperaturi mai mari produsul se îngălbeneste). Randamentul la uscare pentru rădăcini este de 4 - 5 : 1.

Condițiile tehnice de recepție pentru frunze admit ca impurități: frunze atacate de insecte, brunificate, îngălbenite sau pătate, maximum 8 %; corpuri străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 0,5 %, iar umiditatea maximum 13 %.

Pentru flori, la recepție, se admit ca impurități: flori brunificate maximum 5 % și resturi din plante, maximum 2 %; corpuri străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 0,5 %, iar umiditatea maximum 13 %.

Condițiile tehnice de recepție pentru rădăcini descojite (*Althaeae radix mundatae*) sunt prezentate în tabelul 14.13.1.1.:

Tabelul 14.13.1.1.

Condițiile de recepție pentru rădăcini descojite (*Althaeae radix mundatae*)

	In toto	In cubitis
Impurități:		
- rădăcini lignificate, noduroase (% maximum)	5	2
- rădăcini brunificate sau pătate (% maximum)	5	1
- rădăcini cu porțiuni de coajă (% maximum)	2	nu se admit
- rădăcini în afara limitelor admise (% maximum)	3	2
Corpuri străine:		
- organice (% maximum)	0,5	nu se admit
- minerale (% maximum)	0,5	nu se admit
Umiditate (% maximum)	14	

La rădăcinile nedescojite (*Althaeae radix non mundata*) se admit ca impurități: rădăcini lignificate, maximum 5 %, rădăcini brunificate, maximum 5 %, rădăcini în afara limitelor admise, maximum 3 %; corpuri străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 1 %, iar umiditatea, maximum 14 %.

Producția care se poate realiza este de 8 - 12 q/ha de frunze uscate, 2-3 q/ha de flori uscate și 15-20 q/ha rădăcini uscate.

Producția de sămânță la nalba mare este de 300 - 400 kg/ha.

Observații. *Althaeae radix* se poate confunda cu *Belladonnae radix* (care este forată toxică datorită alcaloizilor tropanici). Se vor lua măsurile de prevenire a amestecării acestor produse în perioada de recoltare, condiționare și depozitare.

4.13.2. NALBA DE GRĂDINĂ

(*Althaea rosea* (L.) Cav. var. *nigra* Hort. *Alicea rosea* L.)

Fr: Rose tremiere, Guimauve (Alcée) rose, Mauve arborée;
E: Hollybock, Marshmallow; G: Pappelrose, Stockrose,
Schwarze Malvenblute;

4.13.2.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Materia primă și compoziția chimică. De la nalba de grădină (Nalba neagră, Trandafirii negri) se folosesc florile fără caliciu (*Malvae arboreae flos sine calicibus*) sau cu caliciu (*Malvae arboreae flos cum calicibus*), în stare uscată.


Florile conțin mucilagii, pigmenți antocianici și alți compuși (M. Crieve, 1995; E. Grigorescu și colab., 2001 etc.). Pigmenții antocianici sunt glicozide ale delphininei, principal fiind mirtilina (altea) izolată în stare pură de Constantinescu și colab., 1958, (E. Coiciu și G. Răcz, 1962; E. Grigorescu și colab., 2001 etc.). Altea, complex anocianic, prin hidroliză formează defindol, malviol și petunidol (V. Istudor, 1998)

Utilizări. Datorită conținutului în mucilagii, florile au acțiune emolientă și se folosesc în bronșite și alte afecțiuni ale aparatului respirator, sub formă de gargară în inflamațiile buco - faringiene. Intră în compoziția ceaiului pectoral. Se folosesc în prepararea oțetului aromatic. Antocianozidele din florile acestei plante sunt lipsite de toxicitate (spre deosebire de alți coloranți vegetali), fiind folosite în industria alimentară ca și coloranți.

Răspândire. Nalba de grădină este originară din Asia Mică, unde crește în flora spontană și de unde se pare că a fost adusă de cruciați (V. Velican, 1965). Specia crește spontan în Grecia și Turcia. Este răspândită în țările balcanice și Asia Mică, în Ungaria, Polonia, Rusia și China. La noi se cunoaște ca plantă ornamentală, luându-se în cultură în scop medicinal și pentru obținerea coloranților, în scop alimentar.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Althaea rosea* (L.) Cav. var. *nigra* Hort. sin *Alicea rosea* L. (fig. 4.13.2. după G. Răcz și colab., 1970 și 4.13.2.a., original). *A. rosea* are $2n = 26, 42, 56$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). Specia se crede că provine din *A. pallida* Wet K (E. Coiciu și G. Răcz, 1962).

Din *A. Rosea* (L.) Cav. var. *nigra* Hort la noi în țară este cultivat soiul local (populația) "De Buzău" din anul 1975.

Fig. 4.13.2. *Althaea rosea* (L.) Cav.

Particularități biologice. *Althaea rosea* (L.) Cav. var. *nigra* Hort este o plantă perenă. Rădăcina este pivotantă, cămoasă, fusiformă. Tulpina are înălțimea de 1 - 3 m, foarte puțin ramificată sau neramificată. Frunzele sunt lung pețiolate, cu limbul 5 - 7 lobat, acoperite cu peri aspri, ca și tulpina. Florile sunt dispuse axilar spre vârful tulpinii, solitar sau până la 4 la un loc. Florile sunt de dimensiuni mari (5 - 10 cm diametru), cu calicil dublu; corola formată din 5 petale, mai late decât lungi, de la roșu purpuriu la negru - purpuriu (varietățile ornamentale sunt de la alb, roz la roșu), cu luciu metalic; androcetul format din numeroase stamine conerescute în jurul stilului; gineceul cu ovar superior, multicarpelar. Înfloarește din iunie în octombrie. Fructele sunt formate din mericarpe monosperme (cu diametru de până la 6 mm) dispuse radial în calicil persistent.

Cerințele față de climă și sol. Nalba de grădină este o plantă care crește în condiții variate de climă. Are rezistență bună la iernare și la temperaturile ridicate din vară. Preferă zone însorite, însă crește și la semiumbra. Nu se amplacează în zone cu vânturi puternice, deoarece planta, având port înalt, este ușor culcată. Planta reușește pe soluri adânci, cu umiditate suficientă însă bine drenate, permeabile, cu textură mijlocie și fertile. Nu merge pe solurile cu exces de umiditate. Dă rezultate bune pe solurile cernoziomice și aluvionale fertile.

Zonare. Se recomandă cultivarea ei în zonele unde întâlnește condiții favorabile, județele Brăila, Buzău, Botoșani (S. Male, 1986).

4.13.2.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Nalba de grădină se amplacează în afara asolamentului, după cerealele de toamnă sau prășitoare, pe același teren putând să se cultive numai după circa 7 ani (M. Alexan și colab., 1991).

Materialul de înmulțire se obține din parcelele cu plante tipice, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea. Anual se aplică 60 - 70 kg/ha P_2O_5 (toamna) și 50 - 60 kg/ha N (primăvara) (S. Male, 1986). În tabelele 4.13.1.1. și 4.13.2.2. (după S. Male, 1991) prezentăm influența fertilizării asupra producției de semințe la *Althaea rosea* var. *nigra*. Rezultate foarte semnificative s-au obținut la $N_{60}K_{40}$, distinct semnificative la P_{60} .

Lucrările solului sunt cele prezentate la nalba mare.

Sămânța și semănatul. Nalba de grădină se înmulțește prin semănat direct în câmp. Sămânța trebuie să aibă puritatea de 95 % (minimum 85 %), iar germinația de 65 % (minimum 50 %). Germinația semințelor este maximă în primul an de la recoltare, în anii

următori aceasta scade considerabil (S. Radu, 2000). Semănatul se face cu semănători universale pentru cereale, toamna târziu (în pragul iernii) sau primăvara devreme (E. Păun, 1995). Densitatea este cuprinsă între 6 - 8 plante/m², distanța între rânduri de 70 - 75 cm, adâncimea de semănat 1,5 - 2 cm, iar cantitatea de sămânță 8 - 10 kg/ha (sămânță din anul recoltării, deoarece cea veche își pierde puterea de germinare) (M. Verzea, 1986).

Tabelul 4.13.2.1.

Influența fertilizării cu N și K asupra producției de semințe la

Althaea rosea var. *nigra*

Doza de N și K (kg/ha s.a.)	Producția (g/ha)	Diferența		Semnificația
		q/ha	%	
N ₀	6,87	-	100	-
N ₁₀₀	7,12	0,25	104	-
N ₂₀₀ K ₅₀	7,97	1,1	116	***
N ₁₀₀ K ₁₀₀	7,41	0,54	107	*
DL 5%		0,41		
DL 1%		0,55		
DL 0,1%		0,73		

Tabelul 4.13.2.2.

Influența dozei de fosfor asupra producției de sămânță la

Althaea rosea var. *nigra*

Doza de P (kg/ha s.a.)	Producția (g/ha)	Diferența		Semnificația
		q/ha	%	
P ₀	7,06	-	100	
P ₅₀	7,41	0,35	105	
P ₁₀₀	7,62	0,56	108	
P ₂₀₀	7,29	0,23	103	
DL 5%		0,39		
DL 1%		0,52		
DL 0,1%		0,68		

Lucrările de îngrijire. Se fac prașile și pliviri pentru a menține terenul curat de buruieni și afânat; la sfârșitul vegetației tulpinile se îndepărtează din lan și se face o ușoară bilonare a rândurilor. Buruienile monocotiledonate se pot combate cu erbicidele Fusilade (3 l/ha) sau Furore (2 l/ha), aplicate când acestea au 4 - 6 frunze (costreul când are 15 - 20 cm) (E. Păun, 1995). Rugina (*Puccinia malvacearum*) se combate din primele zile de la apariție prin stropiri cu Dithane M 45 (0,2 %) (2 - 3 tratamente). Puricii mici (*Podagrica malvae*) și puricii mari (*Podagrica fuscicornis*) se combat la începutul vegetației prin prăfuiri (Lindatox sau Pinetox 10 PP în doze de 20 kg/ha) sau prin stropiri cu produse organofosforice (Nogos 50 CE 0,1 % etc.) sau cu piretroizii de sinteză Decis 2,5 EC 0,05 %, Fastac 10 EC (0,02 %) sau Karate 2,5 EC (0,02 %) la începutul

vegetației (S. Male, 1986; S. Radu, 2000). Din anul doi se recomandă ciupirea vârfului tulpinii, pentru a favoriza dezvoltarea ramurilor laterale care produc flori multe și mari.

În loturile semincere se face purificarea biologică și nu se recoltează florile pentru producția de materie primă.

Recoltarea. Plantele înfloresc în anul al II-lea de vegetație din luna iunie (M. Verzea, 1986). Recoltarea florilor se începe din anul II de cultură. De aceea se recomandă cultura mixtă cu o plantă care produce în anul I (exemplu, găbenelele), mărindu-se rentabilitatea (M. Alexan și colab., 1991). Nalba de grădini înfloreste eşalonat din iunie - iulie în septembrie, iar petalele se scutură la 2 - 3 zile de la înflorire. Florile se recoltează eşalonat (la 2 - 3 zile), pe măsura înfloririi când petalele încep să se închidă la culoare. În acest moment, petalele se desprind ușor din caliciu, putându-se detașa ușor cu mâna. Se recoltează florile cu sau fără caliciu, în funcție de solicitări, pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua. Florile se pun în coșuri fără presare.

Loturile semincere se recoltează când semințele au culoarea brună închis. Se taie plantele cu secera, se leagă în snopi și se treieră după 2 - 3 zile.

Condiționarea. După recoltare produsul se transportă în scurt timp la locul de uscare. Uscarea se poate face pe cale naturală, întâi la soare (5 - 6 ore), apoi uscarea se continuă în încăperi amenajate. Artificial se pot usca la 40 - 50 °C. Randamentul la uscare este de cca. 6 : 1, la florile cu caliciu și de cca. 5 : 1, la cele fără caliciu. După uscare, produsul se ambalează în saci de hârtie sau lăzi căptușite cu hârtie. Păstrarea se face în camere uscate, aerisite și întunecoase (pentru a nu se decolora).

Condițiile tehnice de recepție la florile fără caliciu admit ca impurități: flori brunificate sau decolorate, maximum 1 %, resturi de caliciu, maximum 0,5 %; corpuri străine organice nu se admit, cele minerale, maximum 0,25 %, iar umiditatea maximum 11 %.

La florile cu caliciu, se admit ca impurități: flori brunificate sau decolorate, maximum 1 %, corpuri străine organice nu se admit, cele minerale, maximum 0,25 %, iar umiditatea, maximum 11 %.

Producția care se obține anual este de 7 - 8 q/ha flori uscate fără caliciu sau 10 - 12 q/ha flori uscate cu caliciu.

Producția de semințe la nalba de grădini este de 300 - 500 kg/ha.

4.13.3. NALBA DE CULTURĂ (Nalba de câmp)

(*Malva glabra* Desv., *Malva sylvestris* ssp. *mauritanica* (L.) Thellung)

Fr: Guinauve, Mauve; E: Dwarf mallow, Mallow;
G: Kultur Rasepappel, Wilde Malve

4.13.3.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Numele genului derivă de la grecescul "malakē", care provine din cuvântul "malakos" = moale, referindu-se la componenții mucilaginoși ai nabelor, (cu proprietăți emoliente) și la frunze, care sunt moi la pipăit (I. Morariu, 1958).

Materia primă și compoziția chimică. De la nalba de cultură se folosesc florile (*Malvae glabrae flos*) și frunzele (*Malvae glabrae folium*) în stare uscată.

Florile și frunzele conțin mucilagii între 2,6 - 15 %, iar frunzele pe lângă mucilagii, conțin și materii tanante (D. Albulescu și M. Repta, 1973, W. Franke și M. Lawrent, 1980, E. Grigorescu și colab., 2001), vitamine (A, B₁, B₂ și C) și alte substanțe. Florile conțin, alături de mucilagii, antocianozide. S-a identificat malvina (antocianoglicozid) și alți compuși în florile acestei plante.

Utilizări. Muciliagiile și produșii de hidroliză au acțiune emolientă, slab astringentă și ușurează expectorația. Intră în compoziția **Ceailui pectoral nr. 2** și a **Siroplui expectorant**, iar extern (ca emolient), se întrebuințează în inflamațiile mucoaselor (bucală, oculară, vaginală, rectală). În *Farmacopeea Română* figurează ca monografie florile (*Malvae flos*), care intră în compusul "*Species pectorales*" (Specii pectorale).

Răspândire. Este răspândită pe toate continentele, crescând spontan și la noi în țară. Una din speciile genului *Malva* a fost luată în cultură în scop medicinal.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Malva glabra* Desv. (fig. 4.13.3., după Flora României, vol. VI, 1958 și 4.13.3.a., original), cunoscută și sub denumirea de *Malva sylvestris* L. ssp. *Mauritanica* (L.) Thellung.. *M. glabra* Desv. și *M. sylvestris* L. au 2n = 42 (76) (A. Laza și G. Răcz, 1975).

În țara noastră, din *M. glabra* Desv. se cultivă soiul local (populația) "De Suceava", din anul 1973.




Fig. 4.13.3. *Malva glabra* Desv.

În scop medicinal se folosește și *Malva silvestris* L., ale cărei flori figurează împreună cu cele de *M. glabra* Desv. în *Farmacopeea Română* (*Malvae flos*). Se mai pot menționa speciile *M. verticillata* (2n = 84) și *M. crispa* (2n = 112) (G. Rácz și I. Mathe, 1981).

Particularități biologice. Nalba de cultură este o plantă ierboasă, bienală sau perenă, însă în condițiile țării noastre, se cultivă ca plantă anuală, datorită atacului de rugină (*Puccinia malvacearum*) în anul al doilea (S. Male, 1982, M. Alexan și colab., 1991). Rădăcina este pivotantă, cămoasă, cu ramificații reduse. Tulpina are înălțimea de până la un metru, cilindrică, ramificată, glabră sau păroasă. Frunzele sunt lungi pețiolate (cu pețiol păros), limbul palmat lobat (3 - 7 lobi), cu nervuri evidente pe fața inferioară, lung de până la 11 cm și lat până la 15 cm. Florile sunt solitare, dispuse axilar, au caliciul dublu; corola formată din 5 petale libere (de 2 - 3 cm lungime), roșii - violacee (mai închise ca la specia spontană); androceul format din numeroase stamine cu stigmat conerescute într-un tub; gineceul pluricarpelar, cu stigmat conerescute. Înfloarește din mai până în septembrie. Fructul este disciform (diametrul de 5 - 8 mm), compus din 9 - 11 segmente (nucule) zbârcite, glabre, de culoare galben - cenușie.

Cerințele față de climă și sol. Nalba de cultură are cerințe reduse față de temperatură, ierneză bine, însă este sensibilă la înghețurile târzii. Față de lumină are cerințe destul de ridicate. Tijele inferioare mai umbrite sunt mai atacate de rugină. Nu are pretenții mari față de umiditate. Excesul de umiditate favorizează atacul de rugină. Curenții reci, ceața și vânturile puternice sunt nefavorabile acestei plante. Pretinde soluri profunde, cu textură mijlocie spre ușoară, drenate și fertile. Cele mai bune rezultate se obțin pe cernoziomuri. Nu reușește pe solurile acide, pe cele grele și cu exces de umiditate.

Zonare. Se recomandă cultivarea în: Câmpia Moldovei (Botoșani, Suceava), Câmpia Bărăganului (Buzău, Ilfov, Prahova, Ialomița), Câmpia Burnazului (Teleorman) (E. Păun și colab., 1983).

4.13.3.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. *Malva glabra* Desv. se cultivă ca plantă anuală, după cereale de toamnă sau prășitoare, cu excepția plantelor care au boli și dăunători comuni (genul *Althaea*). Pe același teren poate reveni numai după circa 4 ani.

Materiul de înmulțire se obține din parcelele cu plante tipice, dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea se face cu doze de 50 - 60 kg/ha P_2O_5 și 30 - 40 kg/ha K_2O (toamna) și 60 - 70 kg/ha (primăvara) (S. Male, 1986, V. Dulămea, 2000). Îngrășămintele cu fosfor sporesc numărul de flori, iar dozele mai mari de azot sensibilizează plantele la atacul de rugină (M. Verza, 1988).

Sămânța și semănatul. Nalba de cultură se înmulțește prin semănat direct în câmp. Materialul de semănat trebuie să aibă puritatea de 95 % (minimum 85 %), iar germinația de 65 % (minimum 50 %). Semănatul se face cu semănători universale pentru cereale, primăvara devreme (E. Păun, 1995). Densitatea este de 20 - 30 plante/ m^2 , distanța între rânduri de 50 cm, adâncimea de semănat 1 - 2 cm, iar cantitatea de sămânță 4 - 6 kg/ha (S. Male, 1986; M. Verzea, 1988).

Lucrările de îngrijire. Se fac prașile și pliviri ori de câte ori este nevoie, pentru a menține solul curat de buruieni și afănat. Pentru combaterea buruienilor se poate aplica Balan (6 l/ha) cu o zi înaintea semănatului (incorporat prin discuire), iar pentru monocotiledonate (mohor etc.) se aplică Fusilade (2 l/ha) sau Furore (2 l/ha), când acestea au 4 - 6 frunze (E. Păun, 1995, V. Dulămea, 2000). Rugina - *Puccinia malvacearum* - se previne prin respectarea rotației și igiena culturii, iar pentru combaterea puricilor - *Podagrica malvae*, *Podagrica fuscicornis* - se recomandă 1 - 2 tratamente primăvara, la apariția lor, cu produse organofostorice (Nogos 50 CE 0,1 %, Sinoratox 35 CE 0,1 % etc.) sau cu piretroizii de sinteză Decis 2 - 5 EC (0,025 %) sau Fastac 10 EC (0,02 %) la apariția puricilor (S. Male, 1986; B. Bobârnac, 1983, V. Dulămea, 2000).

În loturile semincere se face purificarea biologică și se înlătură plantele netipice sau bolnave și nu se recoltează frunzele și florile de la seminceri.

Recoltare. De la nalba de cultură se recoltează florile și frunzele. Florile se recoltează cu caliciu (fără codițe), eşalonat, în perioada când sunt complet deschise, la intervale de 2 - 3 zile. Frunzele se recoltează fără pețiol, când ajung la dimensiunea normală (diametrul de peste 10 - 12 cm), înainte sau în timpul înflorii. Dacă nu este atac de rugină, se recomandă să se recolteze după înflorire. Atât florile cât și frunzele se recoltează pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua.

Loturile semincere se recoltează când semințele au ajuns la maturitatea completă. Se taie plantele cu seceră, se leagă în snopi, se lasă se usuce 3 - 4 zile, apoi se treieră.

Condiționarea. După recoltare, produsele se transportă imediat la locul de uscare. Uscarea se face pe cale naturală (4 - 5 zile la soare, apoi în încăperi amenajate în acest scop) sau artificial la 35 - 40 °C. Rândamentul la uscare este de cca. 4 - 5:1 la flori și 5:1 la frunze. Produsul se ambalează în saci de hârtie și se păstrează în camere curate și ferite de lumină.

Condițiile tehnice de recepție pentru flori admisi ca impurități: flori decolorate sau brunificate, maximum 3 %, pedunculii mai lungi de 1 cm, maximum 10 %, fructe, frunze și vârfuri florale, maximum 1 %; corpuri străine organice sau minerale nu se admit, iar umiditatea maximum 11 %.

Pentru frunze, condițiile tehnice de recepție prevăd ca impurități: frunze îngălbenite sau înnegrite, maximum 2,5 %, petioli mai lungi de 2 cm, flori, fructe, maximum 0,5 %, neadmițându-se frunze atacate de rugină; corpuri străine organice nu se admit, corpuri străine minerale, maximum 0,25 %, iar umiditatea, maximum 13 %.

Producția medie care se realizează este de 28 - 50 q/ha flori proaspete, respectiv 7 - 10 q/ha flori uscate și 35 - 45 q/ha frunze proaspete, revenind 7 - 9 q/ha frunze uscate.

Producția de sămânță la nalba de cultură este de 300 - 400 kg/ha.

4.14. FAMILLIA APIACEAE (UMBELLIFERAE)

4.14.1. CORIANDRUL (*Coriandrum sativum* L.)

Fr: Coriandre; E: Coriander; G: Koriander, Garten koriander

4.14.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Coriandrul este cunoscut din cele mai vechi timpuri, fiind utilizat în scop aromatic și medicinal. A fost luat în cultură din antichitate. Egiptenii cultivau coriandrul cu o mie de ani înaintea erei noastre și este pomenit în papirusul Ebers (E. Grigorescu și colab., 2001). În Egiptul antic, semințele de coriandru se foloseau pentru întărirea puterii vinului, precum și în tratarea bolilor de ficat și stomac. A fost cultivat și folosit în diferite preparate de romani și greci. Coriandrul a fost cunoscut și de popoarele din Asia mijlocie, în Europa centrală și de sud (din timpul romanilor), în Anglia, după cucerirea romanilor (sec. I e.n.) (M. Verzea, 1986). În lucrările lui Columella, Varro, Dioscoride etc. se fac referiri cu privire la cultura și utilizarea coriandrului. Numele genului derivă de la cuvântul grecesc „*Koris*”, care înseamnă ploșniță (plantele având miros de ploșniță) (A.S. Potlog, 1940). Din Europa s-a răspândit în America, Australia și Noua Zeelandă, în epoca descoperirilor geografice (sec. 15 - 17) (M. Verzea, 1986).

Materia primă și compoziția chimică. Coriandrul se cultivă pentru fructe (*Coriandri fructus*). Fructele conțin ulei volatil (*Aetherooleum coriandri*), în componența căruia intră mai multe substanțe aromatice, separabile într-o gamă largă de esențe de parfum. Fructele mai conțin ulei gras, proteină, săruri minerale etc. (E. Grigorescu și colab., 2001; I. Telci și colab., 2006 etc.). Conținutul de ulei volatili din fructe variază între limite destul de largi (0,15 - 2,1 %), în funcție de soi, zona și condițiile de cultură, precum și de poziția umbelilor, gradul de maturizare și vechime (este mai mare în fructele de curând maturizate). Soiurile cultivate, au conținutul de ulei volatili de la 1 % (U. Stănescu și colab., 2004) până la 1,8 % (fructele mai mici fiind mai bogate în ulei decât cele mai mari) (E. Grigorescu și colab., 2001).

Dinamica conținutului în ulei volatil în organele plantei de coriandru, în diferite faze de vegetație se prezintă în tabelul 4.14.1.1. (după Lukianov și colab., citat de M. Verzea, 1986).

În fruct, uleiul volatil este dispus în canale secretoare, ceva mai mult în semințe (60 %), decât în pericarp (40 %). În funcție de proveniență (pericarp, sămânță), diferă și compoziția chimică a uleiului volatil. Principalul component al uleiului volatil (60 - 90 %) este linaloolul (coriandrolul). Mai conține geraniol, pinen, cimol, limonen (dipenten), terpinen, felandren, mircen, citral etc. (V. Cucu și colab., 1982 etc.). Din uleiul volatil de coriandru se pot separa esențe cu miros de lăcrimioare (linalool), trandafir (geraniol), violete (metilionină și ionină), lămâie (citralul) etc.

Tabelul 4.14.1.1.
Dinamica conținutului de ulei volatil în organele plantei de coriandru în funcție de faza de vegetație

Organul analizat	Conținutul în ulei volatil (%) în faza de:					
	Rozetă 12. VI	Formarea tulpinilor 29. VI	Înflorire 11. VII	Formarea fructelor, 19. VII	Coacere în lapte, 27. VII	Coacere în ceară 3. VIII
Rădăcini	0,395	0,344	0,262	0,262	0,155	0,134
Frunze	0,259	0,544	0,735	0,515	0,275	0,174
Tulpini	-	0,61	0,357	0,268	0,251	0,202
Fructe	-	-	-	4,901	4,051	2,081
Plante întregi	0,273	0,551	0,589	0,633	1,036	0,722
						0,458

Fructele de coriandru au un conținut de 13 - 20 % ulei gras (V. Istudor, 2001), 12-16 % proteine, cca. 20 % glucide, 4 - 7 % cenușă și 9 - 12 % apă. Conținutul ridicat în aminoacizi esențiali din fructele de coriandru și posibilitatea valorificării superioare a produsului (deșeu) după extragerea uleiului volatil a fost semnalat de H. Popescu și I. Țugui, 1976.

Șrotul de coriandru (rezultat în urma prelucrării) conține albumine (30,9 %), grăsimi (6,1 %), vitamine (A și C) etc.; 1 kg de șrot echivalează cu 0,69 unități furajere și conține 80 g albumină digestibilă (M. Verzea, 1986).

Utilizări. Fructele de coriandru au acțiune carminativă și stomahică. Se utilizează pentru aromatizarea sau corectarea gustului unor medicamente. Fructele de coriandru intră în compoziția următoarelor ceaiuri : **Ceai contra colicilor**, în **Ceaiul gastric nr. 2**, **Ceaiul tonic aperitiv**. Este indicat în anorexii și dispepsii. Coriandrul are și proprietăți bactericide și fungicide. Fructele mestecate micșorează mirosul neplăcut din respirația celor care au consumat

usturoi. Fructele de coriandru se folosesc în industria alimentară, la condimentarea mezelurilor, prepararea lichiorurilor etc. Se recomandă să nu se folosească fructele proaspete. Uleiul volatil din fructele de coriandru constituie o sursă importantă în obținerea linaloolului, utilizat în industria parfumurilor sau la semisinteza altor produși, cum este citralul (V. Cucu și colab., 1982). *Aethroleum coriandri* este utilizat ca aromatizant în industria tutunului, vinurilor și în parfumerie. Substanțele grase (uleiul) din fructe se folosesc în industria săpunurilor.

Turtele rezultate după extragerea uleiului constituie un furaj concentrat valoros, bogat în proteine și glucide, utilizat în hrana bovinelor și suinelor (M. Verzea, 1986).

Tulpinile de coriandru se folosesc drept combustibil.

Coriandrul este și o valoroasă plantă meliferă.

Răspândire. Coriandrul apare spontan și subspontan în sudul Europei și Orientul Apropiat, fiind luat în cultură pe tot globul, ocupând suprafețe mai mari în bazinul mediteranean. La noi în țară, coriandrul este una din cele mai importante plante producătoare de ulei volatil. Este cultivată pentru nevoile interne, fiind solicitată și la export. Principalii furnizori ai produsului vegetal sunt Rusia, Maroc, Turcia, România și Bulgaria.

Sistematică. Soiuri. Formele cultivate aparțin unei singure specii, *Coriandrum sativum* L. (fig. 4.14.1., după Flora României, vol. VI, 1958 și 4.14.1.a., original), care are $2n = 22$ (I.I. Băra, 1980). Este originară din bazinul mediteranean. După diametrul fructelor, specia a fost împărțită în două, varietăți: var. *vulgare* Alef, cu fructul mare (3 - 5 mm diametru) și var. *microcarpum* D.C., cu fructul mic (1,5 - 3 mm diametru) și cu conținut mai ridicat în ulei volatil. Soiurile cultivate în țară noastră aparțin var. *vulgare*.

La noi în țară se cultivă soiurile de coriandru Sandra (din anul 1987) și Omagiu (din anul 2000). Soiul Sandra realizează 10 - 15 q/ha fructe (cu 0,9 - 1,18 % ulei volatil) și 15 - 16 l/ha ulei volatil, iar soiul Omagiu este mai precoce cu 5 zile și superior soiului Sandra, realizând 13 - 19 q/ha fructe (cu 1,18 - 1,24 % ulei volatil), bogat în linalool și o producție de 16 - 22 l/ha ulei volatil (M. Verzea, 2000).

Particularități biologice. Coriandrul este o plantă ierboasă, anuală. Rădăcina este pivotantă, subțire și puțin ramificată. Tulpina este erectă, înaltă de 20 - 90 cm, cilindrică glabră, fin brăzdată, ramificată spre vârf. Frunzele sunt de culoare verde deschis, glabre, lucioase și așezate altern pe tulpină. Cele bazale sunt pețiolate, întregi și numai crenat incizie sau trilobate până la simplu penat - sectate, cu

foile rotunjite - cuneate. Frunzele următoare sunt 1 - 2 penat - sectate, mai mult sau mai puțin ovate, cu număr redus de foliole, cu baza cuneată, inegal - penat - lobate, până la penat - sectate, cu lacinii late, obtuze, mucronate.




Fig. 4.14.1. *Coriandrum sativum* L.
a - porțiunea de frunză bazală;
b - umbelă fructiferă; c - fruct;
d - secțiune prin fruct

Frunzele de la mijloc până la vârful tulpinii sunt sesile, 2 - 3 penat - sectate, cu lacinii dințate, liniare, aproape filiforme și vârful acut, mucronat. Florile sunt mici, grupate în umbеле compuse, lung - pedunculat, cu 3 - 7 radii ($\pm$ egale), lungi de cca. 1,2 - 2 cm, lipsite de involucri, iar involucrel cu 3 foliole, inserate unilateral, înguste și cu vârful ascuțit. Umbелеle sunt cu flori numeroase. Floarea este alcătuită pe tipul 5, având 5 sepalе mici și verzi; 5 petale obovate, albe, roșietice sau violacee, florile de la marginea inflorescenței cu petală externă mai mare (până la 4 mm), florile interioare cu petale mici și simetrice - stamine în număr de 5, iar pistilul este format dintr-un ovar inferior cu 2 loji, în fiecare câte un ovul, prelungit cu două stiluri scurte, terminate cu un stigmat capitat. La baza stilului se găsește o glandă nectariferă disciformă. Polenizarea este alogamă, datorită maturizării anterelor înaintea stigmatului florii. Fructul este diachenă sferică, cu diametrul de 2 - 6 mm, de culoare galben - brună sau brună. Cele două jumătăți sunt unite (la unele soiuri se desfac la maturitate). Pe fiecare mericarp sunt 5 coaste ondulate și 4 coaste carenate mai pronunțate. La vârful rămân resturile calicului și cele două stigmate. În fiecare mericarp se află o sămânță. MMB este de 7 - 10 g. Fructele mature au miros și gust plăcut (aromat), iar cele verzi respingător. Coriandrul înflorește în iunie - iulie și ajunge la maturitate pe la jumătatea lunii august. Perioada de vegetație este de 90 - 120 zile. În prima parte a vegetației, toate organele plantei emană un miros neplăcut, similar cu cel de ploșniță, datorită unei aldehide diciclice.

Cerințele față de climă și sol. Coriandrul este originar din zona mediteraneană, însă s-a adaptat la un areal larg de cultură, reușind și în zone cu temperaturi mai moderate. El se cultivă și în Norvegia, Finlanda, iar soiurile precoce, în anii mai calzi, ajung la maturitate dincolo de cercul polar. (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Temperatura minimă de germinare este de 4 - 6 °C, iar la 7 grade răsare în masă. La 5 - 8 °C răsare după 21 de zile de la semănat. Temperaturile de peste 12 - 14 °C asociate cu seceta, împiedică răsăritul uniformă și o încetinesc. Plantulele tinere suportă bine temperaturi de până la -10 °C. În zonele sudice, unde temperaturile minime din timpul iernii nu scad sub -16 °C, coriandrul se poate cultiva ca plantă de toamnă. În faza de rozetă, plantele cresc și se întăresc mai bine la temperaturi mai scăzute. În timpul înfloririi, cerințele sunt mai mari în timpul răsăririi și în perioada creșterii tulpinii până la formarea florilor. Seceta la răsărire poate compromite recolta, iar în timpul formării florilor conduce la formarea de

inflorescențe puține și sărace. Atât excesul de umiditate în sol și în atmosferă, precum și vânturile uscate și calde, sunt nefavorabile creșterii și dezvoltării coriandrului. Cerințele față de lumină ale coriandrului, ca și la alte plante producătoare de uleiuri, sunt mari. Zilele însoțite determină sporuri de producție și conținut ridicat de ulei volatil, pe când zilele noroase, ploioase, stângnesc polenizarea și măresc sensibilitatea plantelor la boli. Coriandrul este o plantă pretențioasă față de sol. Pretinde soluri fertile, afânate, permeabile, curate de buruieni și bogate în calciu, cu pH de 6,8 - 7,5. Rezultatele cele mai bune se obțin pe cernoziomuri, cu textură mijlocie, bogate în humus și calciu, dar reușește și pe alte tipuri de soluri.

Zonare. La noi în țară, cele mai favorabile condiții de cultură ale coriandrului sunt sudul și sud - estul țării, cu soluri mai ușoare, fertile, cu precipitații de peste 400 mm anual și ferite de vânturi. Se recomandă cultivarea coriandrului în Câmpia Bărăganului, Câmpia Dobrogei, Câmpia Burnazului, Câmpia Timișului, Câmpia Olteniei, Câmpia Crișurilor, Podișul Dobrogei, Câmpia Moldovei (E. Păun și colab., 1983).

4.14.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Coriandrul se cultivă după premergătoare care lasă solul curat de buruieni. Nu se amplacează după premergătoare din fam. *Aptaceae* (anason, fenicul etc.), iar pe același teren poate reveni numai după 4 - 5 ani.

Loturile semincere vor fi amplasate separat de alte culturi de coriandr, asigurându-se spațiu de izolare.

Fertilizarea se face cu 40 - 50 kg/ha P_2O_5 și 30 - 50 kg/ha K_2O (sub arătură) și 50 - 70 kg/ha N, încorporat la pregătirea patului germinativ (M. Verzea, 1986). Dozele se stabilesc în funcție de fertilitatea solului și planta premergătoare. Coriandrul nu suportă îngrășarea directă cu gunoi de grajd (E. Păun, 1995).

Pe cernoziomul de la Fundulea, prezentăm după M. Micea și R. Lupeanu 1986, reacția la fertilizarea cu azot (tabelul 4.14.1.2.) și fosfor (tabelul 4.14.1.3.) a coriandrului. S-au obținut sporuri de producție foarte semnificative la N_{50-90} și P_{30-70} .

În experiențe privind fertilizarea coriandrului, s-a constatat că doze mari de azot favorizează atacul de boli criptogamice (care dăunează calității fructelor).

Lucrările solului. Arătura (25 cm adâncime) se efectuează vara sau toamna, cu plugul în agregat cu grapa. Pregătirea patului germinativ se face la 4 - 5 cm adâncime cu combinatorul.

Tabelul 4.14.1.2.
Influența azotului asupra producției de fructe la *Coriandrum sativum* L.

Doze de azot, kg/ha s.a	Producția, q/ha	d	%	Semnificația
N_0	13,6	Mt.	100	-
N_{50}	15	1,4	110	***
N_{70}	15,3	1,7	112,5	***
N_{90}	15,2	1,6	112	***

DL 5% - 0,86

Tabelul 4.14.1.3.
Influența fosforului asupra producției de fructe la *Coriandrum sativum* L.

Doze de fosfor, kg/ha s.a	Producția, q/ha	d	%	Semnificația
P_0	12,4	Mt.	100	-
P_{30}	13,8	1,4	111	***
P_{50}	15,3	2,9	123	***
P_{70}	15,8	3,5	129	***

DL 5% - 1,14

Sămânța și semănatul. Coriandrul se înmulțește prin semănat direct în câmp. Se folosește sămânță cu puritatea de 98 % (minimum 94 %) și germinația de 80 % (minimum 65 %). Contra bacteriozei sămânța se tratează cu Mancozeb (2 kg/t sămânță), Tiradin 75 (4 kg/t), iar contra *Sclerotiniei* sp. cu Tiramet (2,5 kg/t sămânță) sau Topsin M 70 (5 kg/t) (M. Verzea, 2000). Atacul de viespea semintelor de coriandrul se previne prin tratarea cu insecticide asfixiante (Phosdrin, Delicia, Gastoxin) (B. Bobârnac, 1983).

Semănatul se face cu semănători universale (SUP-21, SUP-29 și SUP-48), primăvara, în urgența întâi, la 25 cm între rânduri (tabelul 4.14.1.4., după M. Micea și colab., 1984), iar pe solurile foarte îmburuienate (cu buruieni perene) la 50 cm, pentru a se putea prăși (M. Verzea, 1986, E. Păun, 1995).

Densitatea la răsărire trebuie să fie de circa 200 plante/m² (E. Păun, 1995). Adâncimea de semănat este de 3 - 4 cm, iar cantitatea de sămânță cca. 16 kg/ha (tabelul 4.14.1.5., după M. Micea și colab., 1984).

După G. Roman și V. Ștefan, 1986 prezentăm influența epocii de semănat (tabelul 4.14.1.6.), a distanței și normei de semănat (tabelul 4.14.1.7.), asupra producției de fructe la coriandrul. Cele mai bune rezultate s-au obținut prin semănatul primăvara în urgența întâia, la 12,5 cm, cu 16 kg/ha sămânță.

Lucrările de îngrijire. Buruienile se combat prin prașile (culturile semănate la 50 cm) și pliviri, iar ca erbicide Eradicane sau Lasso (în doză de 6 l/ha), încorporate la pregătirea patului germinativ, cu Gesagard (2 kg/ha) sau Afalon (5 kg/ha), aplicate după semănat, cu

Fusilade (3 l/ha) dat în perioada de vegetație. Turita (*Galium aparine*) dacă un este combătută, creează probleme deoarece semințele ei un se pot separa prin selectare de coriandru, având aceleași dimensiuni (M. Alexan și colab, 1991).

O atenție specială se acordă loturilor semincere privind combaterea buruienilor și în special celor de carantină, cuscută, costrei, turita (F. Crăciun și colab., 1976).

Tabelul 4.14.1.4.
Influența distanței de semănat asupra producției de fructe la coriandru

Distanța între rânduri (cm)	Producția (q/ha)	Diferența (q/ha)	%	Semnificația
50	15	Mt.	100	-
25	19,1	4,1	127	***
12,5	16,5	1,5	111	**
DL 5%=0,84 DL 1%=1,15 DL 0,1%=1,56				

Tabelul 4.14.1.5.
Influența normei de sămânță asupra producției de fructe la coriandru

Norma de sămânță (kg/ha)	Producția (q/ha)	Diferența (q/ha)	%	Semnificația
8	15,2	-1	93	00
12	16,2	Mt.	100	-
16	18,8	2,6	116	***
20	17,3	1,1	107	**
DL 5%=0,65 DL 1%=0,87 DL 0,1%=1,12				

Tabelul 4.14.1.6.
Influența epocii de semănat asupra producției de fructe (q/ha) la specia *Coriandrum sativum* L., în zona solului brun-roșcat

Epoca de semănat	Media 1981-1983		1981		1982		1983	
	Producția	Diferența	Producția	Diferența	Producția	Diferența	Producția	Diferența
Toamna devreme (mijlocul lunii septembrie)	8	-3,5 ⁰	4,8	-6,1 ⁰	2,2	-8 ⁰	17	3,6 ^x
Toamna târziu (începutul lunii noiembrie)	11,1	-0,4	10,4	-0,5	6,6	-3,6 ⁰	16,4	3 ^x
Primăvara în urgența I	11,5	Mt	10,9	Mt	10,2	Mt	13,4	Mt
Primăvara în urgența II	11,3	-0,2	9,1	-1,8	12	1,8 ^x	12,7	-0,7
Media	10,4	-	8,8	-	7,7	-	14,8	-
DL 5% 1,75 q/ha 2,66 q/ha 1,5 q/ha 1,62 q/ha								

Tabelul 4.14.1.7.
Influența distanței de semănat asupra producției de fructe (q/ha) la specia *Coriandrum sativum* L.

Distanța între rânduri	Norma de semănat	Media 1980-1982		1980		1981		1982	
		Producția	Diferența față de martor	Producția	Diferența față de martor	Producția	Diferența față de martor	Producția	Diferența față de martor
12,5 cm	8 kg/ha 12 kg/ha 16 kg/ha 20 kg/ha	10,5 12,1 13 -	Mt. 1,6 ^x 2,5 ^x	5,2 5,9 7,2 -	Mt. 0,7 2 ^x	13,5 16 16,2 13,4	Mt. 2,5 ^x 2,7 ^x -0,1	12,7 14,5 15,6 17	Mt. 1,8 ^x 2,9 ^x 4,3 ^x
25 cm	8 kg/ha 12 kg/ha 16 kg/ha 20 kg/ha	10,5 10,9 12,4 -	- 0,4 1,9 ^x	4,6 5,1 6,6 -	-0,6 -0,1 1,4 ^x	13,5 13,8 15,3 13,5	- 0,3 1,8 ^x -	13,5 13,8 15,3 16,6	0,8 ^x 1,1 ^x 2,6 ^x 3,9 ^x
50 cm	8 kg/ha 12 kg/ha 16 kg/ha 20 kg/ha	10,2 11,7 12,6 -	-0,3 1,2 ^x 2,1 ^x	6,3 6,7 8,2 -	1,1 ^x 1,5 ^x 3 ^x	11,1 14,5 14 13,9	-2,4 ⁰ 1 ^x 0,5	13,1 13,9 15,7 15	0,4 1,2 ^x 3 ^x 2,3 ^x
Media		11,5	-	6,2	-	14,1	-	14,7	-
DL 5%		0,8 q/ha		0,87 q/ha		0,85 q/ha		0,79 q/ha	

Sclerotinia sp. se combate prin tratamentele la sămânță prezentate, iar pe vegetație cu Ronilan 50 WP (0,5 %) sau Topsin M 70 (0,2 %) (M. Verzea, 2000). Viespea semințelor de coriandru (*Systole coriandri*) se combate prin două tratamente (începutul înfloririi și înflorirea în masă) cu unul din produsele: Decis CE-25 (0,05 %), Fastac 10 EC (0,02 %), Karate 2,5 C (0,02 %) Simorox 35 CE (0,1 %), Lindatox 20 CE (0,75 %), Elocron 50 WP (1,2 %) sau Actelic 50 CE (0,1 %) (M. Verzea, 2000). Pentru asigurarea polenizării se pot folosi două colonii de albine la ha (M. Verzea, 1986).

În loturile semincere se efectuează purificarea biologică, înainte de înflorire, înlăturându-se plantele slab dezvoltate, netipice și bolnave (M. Verzea, 1986). Aceste loturi vor fi supuse procesului de recunoaștere a culturilor.

Recoltarea. Coriandru se maturează egalonat, întâi devin mature fructele din umbелеle centrale, apoi cele din umbелеle laterale. Fructele coapte se scutură foarte ușor. Se recomandă recoltarea dimineața (pe rouă), seara sau chiar noaptea pentru a evita pierderile

prin scuturare. Recoltarea se poate face direct cu combina de cereale când 60 - 70 % din fructe s-au copt.

Se poate recolta și în două etape, tăindu-se plantele cu secerătoare a sau cositoarea, când 50 % din fructe sunt coapte, după care se treieră. Unele date, redată în tabelul 4.14.1.8. (după Smolianov și Ksendsz, citați de M. Verzea, 1986), prin recoltatul în două faze (cosit, apoi treierat), se reduc mult pierderile și se obțin producții bune de ulei volatil.

Tabelul 4.14.1.8.
Producția de fructe, conținutul și producția de ulei volatil
în funcție de epoca și modul de recoltare a coriandrului

Epoca și modul de recoltare	Producția de fructe (q/ha)	Conținutul în ulei volatil (%)	Producția de ulei volatil (kg/ha)
Recoltare în 2 faze (cosit + recoltat):			
-la coacerea a 10-20 % din fructe	14,8	1,15	16,2
-la coacerea a 30-40 % din fructe	15,4	1,1	16,2
-la coacerea a 60-70 % din fructe	15,2	1,08	15,7
Recolat direct din lan	14,7	1,05	15

La treierat, cu combina sau batoza, pentru evitarea spargerii fructelor se înlocuiesc șinele metalice cu șine de lemn, contrabătătorul se îmbracă în tablă, iar turația tobei se reduce la circa 600 ture/minut.

Loturile semincere se recoltează, se condiționează și se depozitează separat.

Condiționarea. După recoltare, produsul destinat consumului se condiționează la selector și se aduce la umiditatea de păstrare (12%).

Condițiile tehnice de recepție prevăd ca produsul să fie format din fructe întregi. Ca impurități se admit maximum 3 % fructe înnegrite și maximum 7 % fructe despartite (jumătăți). Corpuri străine organice: maximum 2 %, iar cele minerale, maximum 1 %. Umiditatea maximă 12 %. Conținutul în ulei volatil, minimum 0,3 %. Spărtura (jumătățile de fruct) rezultată de la selectare, constituie un produs cu utilizare industrială. Ca impurități se admit maximum 3 % mericarpe înnegrite; corpuri străine organice, maximum 2 %, iar minerale, maximum 1 %; umiditatea maximă 12 %; conținutul în ulei volatil, minimum 0,3 %.

Producția medie de fructe de coriandru este cuprinsă între 1200 - 1600 kg/ha.

4.14.2. CHIMIONUL (*Carum carvi* L.)

Fr: Carvi, Cumin des prés; E: Caraway;
G: Kümmel, Weissen Kümmel

4.14.2.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Chimionul (Chimenul), răspândit în flora spontană din Europa și Asia, este luat în cultură din timpuri străvechi, fiind amintit în lucrările scriitorilor antici, Teophrast, Dioscorides etc. Se cultivă pentru fructele sale utilizate în industria alimentară și medicină.

Materia primă și compoziția chimică. De la chimion se folosesc fructele (*Carvi fructus*) care conțin ulei volatil, ulei gras, proteină și glucide. Când se solicită iarbă proaspătă (*Carvi herba*), aceasta se recoltează la 20 cm deasupra nivelului solului.

Conținutul fructelor în ulei volatil variază după proveniență și condițiile de cultură, între 3 - 9 % (V. Istudor, 2001, E. Nemeth, 2005 etc.). În țara noastră, chimionul din flora spontană are 3,5 - 4 % ulei volatil, iar cel din cultură 4,1 - 5,8 % (V. Cucu și colab., 1982). Conținutul maxim în ulei volatil se găsește în fructele verzi (faza de lapte), iar pe măsura maturizării conținutul de ulei volatil scade. S-a constatat că la densitatea optimă a plantelor, conținutul de ulei a fost mai mare (4,1 - 5,2 %) decât la densități mai mari sau mai mici (3,5-4 %) (L. Hornok și Gy. Csaki, 1982). Componentii uleiului volatil variază în funcție de proveniență, climă, sol, modul de recoltare etc., determinând gustul și mirosul specific, respectiv calitatea acestuia. În uleiul volatil de chimion de proveniență românească s-a stabilit că cea mai mare parte este formată din compuși oxigenați, cum sunt cetonile și alcoolii (F. Șuteu și H. Rothbacher, 1973). În general, uleiul de chimion este format, în proporție de 50 - 60 % din carvonă, urmată de limonen (cca. 40 %), cantități mici de hidrocarburi terpenice (pinen, terpinen, mircen etc.), alcoolii (carveol, dihidrocarveol, linalool etc.) aldehide și cetone (aldehidă acetică, furfural, dihidrocarvonă etc.) și altele. Fructele de chimion, alături de uleiul volatil, mai conțin 15 - 18% ulei gras, 20 - 25 % glucide, 18,9 - 25 % proteine și 5 - 8 % cenușă. În *Farmacopeea Română* figurează *Carvi fructus* cu un conținut de cel puțin 3 % (v/g) ulei volatil.

Utilizări. Uleiul volatil de chimion are acțiune carminativă, stimulează secrețiile gastrointestinale, calmează colicile intestinale și fluidifică secrețiile bronșice. Este indicat în anorexii, în dispepsii și ca

aromatizant, în pastele de dinți etc. Uleiul de chimion este utilizat și în industria alimentară, la prepararea diferitelor băuturi alcoolice, în parfumerie, la fabricarea săpunurilor etc. Fructele chimionului se folosesc la prepararea supelor, lichiorurilor, prăjiturilor etc. Uleiul gras are utilizări în tehnică. Turtele care rămân după extragerea uleiului constituie un furaj concentrat, bogat în proteine. Chimionul este și o bună plantă meliferă.

Răspândire. Spontan se întâlnește pretutindeni în Europa și Asia. La noi apare în fânețele umede din regiunile de câmpie, până în cele subalpine, mai frecvent în flora regiunilor de deal și submontane. În cultură se găsește în multe țări europene: Olanda, Belgia, Polonia, Germania, Rusia, Belgia, Olanda etc. și în Egipt, produsul vegetal provenind în principal din aceste țări. În țara noastră se cultivă mai mult în zona de dealuri cu umiditate suficientă.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Carum carvi* L.; sin. *Carum decusatum* Gilib.; *C. aromaticum* Galish.; *Pimpinella carvi* Lessen (fig. 4.14.2., după Flora României, vol VI, 1958 și 4.14.2.a., original). *C. carvi* L. are $2n = 20, 22$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). Pe glob se cultivă diferite proveniențe sau soiuri ameliorate. În Olanda, se lucrează la ameliorarea chimionului din 1911, obținându-se soiuri cu 4 - 6 % ulei volatili.

În țara noastră s-au cultivat diferite populații, iar din anul 1973 sunt cultivate soiurile locale (populațiile) „Mare de Roman” și „De Ghimbav”.

Particularități biologice. Chimionul cultivat este o plantă ierboasă, biennială, în anul I formează o rozetă de frunze, iar în anul II tulpina floriferă. Rădăcina este pivotantă, cămoasă, deschisă la culoare, groasă de 1,5 - 2 cm, adâncă (30 - 40 cm), puțin ramificată. Tulpina se formează numai în anul II, este erectă, înaltă până la 100 cm, fisuloasă, muchiată, ramificată. Frunzele în primul an, dispuse în rozetă, sunt lung - pețiolate, 2 - 3 penat - sectate de 20 - 40 cm. În anul II, frunzele inferioare sunt lung-pețiolate, cu 6 - 12 perechi de segmente de ordinul I, iar cele superioare sunt sesile, bipenate, cu lacinii filiforme, slab mucronate. Florile sunt dispuse în umbеле compuse din 5 - 15 radii inegale, cu umbелеle compuse, la rândul lor, din 10 - 13 flori, situate pe pedicelul inegal, fără involucri și involucri (formate din hipsofile reduse, caduce). Florile sunt alcătuite pe tipul 5; caliculi redus la 5 dințișori mici; corola formată din 5 petale albe, (capitate) roz sau roșietice; 5 stamine în alternanță cu petalele; gineceul bicarpelar prelungit, cu două stivuri capitate. Înflorirea are loc din aprilie până în iulie.



Fig. 4.14.2. *Carum carvi* L.
a - diachenă; b - achenă (secțiune)

Fructul este o diachenă formată din două mericarpe libere, dispuse pe un carpofor bifidat, aproape până la baza. Mericarpele au 3 - 6 mm lungime și până la 2 mm grosime, sunt ușor arcuite, înguste spre capete, de culoare cenușie - brună, cu 5 proeminente (coaste) evidente, de culoare mai deschisă. MMB este de cca. 2,5 g, iar MH de cca. 50 kg. Fructele mature prezintă miros aromat și gust înțepător. Uleiul volatil este acumulat în canale longitudinale dispuse în pereții fructului, câte 6 canale în fiecare mericarp. Cercetări asupra particularităților morfologice ale celulelor epicarpului la *Carum carvi* L. (comparative cu cele de la *Aegopodium podagraria* L.) au fost efectuate la microscopul electronic de E.M. Cappelletti, 1979.

Cerințe față de climă și sol. Chimionul este planta climatului umed și răcoros, ajungând în nord până în Peninsula Scandinavică. Temperatura minimă de germinație este de 5 - 6 °C. Plantulele tinere suportă temperaturi scăzute, iar cele mature iermează bine. În cursul vegetației, temperaturile trebuie să fie moderate. Chimionul este pretențios față de umiditate încă de la răsărire. În primul an, pretinde multă umiditate în tot cursul vegetației, iar în al doilea an, la înflorire. Ploile abundente la înflorire influențează negativ fecundarea. Ploile în exces ca și seceta în exces, însoțite de vânturi uscate, au un efect negativ asupra producției. Cerințele față de lumină în primul an sunt mai reduse (crescând sub planta protectoare), însă în anul II sunt mari, aceasta influențând favorabil producția și conținutul fructelor în ulei volatil. În unele cazuri, lipsa luminii face ca plantele să înflorească abia în anul III. Chimionul are cerințe moderate față de sol. Cele mai bune rezultate se obțin pe solurile adânci, bogate în calciu, bine afânate, cu expoziție sudică și apărate de vânturi. Merge bine pe cernoziomuri și pe solurile formate pe aluviuni. Nu reușește pe solurile grele și acide.

Zonare. La noi se cultivă în zonele climatului umed și răcoros. Zonele favorabile sunt dealurile vestice (jud. Satu Mare, Bihor, Arad), Țara Hațegului, Podișul Transilvaniei, Țara Bârsei și Subcarpații răsăriteni (E. Păun și colab., 1983). În zona sudică și calduroasă (în câmpie), chimionul degeneratează.

4.14.2.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Chimionul, fiind plantă biennială (fructifică în anul al II-lea), pentru folosirea eficientă a terenului se cultivă cu plante care se recoltează în anul întâi (cultură mixtă): macul de grădină, orzoaica, mărul, ovăzul (masă verde), borceagul (masă verde) sau muștarul, în funcție de zona de cultură (M.D. Bobiț, 2000). În zonă cu climat mai

cald (Depresiunea Oravița), s-a dovedit că chimionul semănat la sfârșitul lunii august fructifică în anul următor (R.A. Mosoarcă, 2006). Chimionul se cultivă după cereale de toamnă și de primăvară, bine lucrate. Pe același teren se poate cultiva numai după 5 - 7 ani (M. Alexan și colab., 1991).

Pentru producerea materialului de înmulțire se realizează culturi speciale (loturi semincere), amplasate separat de culturile pentru materie primă.

Fertilizarea. În anul întâi de vegetație se aplică 40 - 50 kg/ha P_2O_5 și 60 - 70 K_2O (sub arătură) și 40 - 50 kg/ha N (primăvara). În anul doi de vegetație se fertilizează cu 40 - 50 kg/ha P_2O_5 (toamna) și 35 - 40 kg/ha N (primăvara). Chimionul reacționează favorabil la doze de 20 - 30 t/ha gunoi de grajd (pentru un ciclu de vegetație) (M.D. Bobiț, 2000).

Lucrările solului. Arătura se face la 25 - 30 cm adâncime, imediat după eliberarea terenului de către planta premergătoare. Patul germinativ se pregătește primăvara devreme, prin nivelarea arăturii, mărunțire, uniformizare și tasare.

Sămânța și semănatul. Chimionul se înmulțește prin semănat direct în câmp. Sămânța trebuie să fie din producția anului precedent, să aibă o puritate de 98 % (minimum 94 %) și germinația de 85 % (minimum 75 %). Prevenirea bolilor criptogamice se face prin tratarea seminței cu Formalină 0,25 % sau cu Tiradin 0,4 %.

Chimionul se poate semăna în cultură pură, însă fiind o plantă biennială (se recoltează în anul al doilea), mai economică este cultivarea cu o plantă protectoare (cultură mixtă), care se recoltează în anul întâi (mac, muștar, mazăre, orz, etc.); obișnuit, se cultivă împreună cu macul. Însămânțarea se face cu semănători universale, în prima urgență, asigurându-se 40 - 50 plante de chimion/m². Distanța între rânduri este de 50 cm și adâncimea de 1,5 - 3,5 cm (în cultura mixtă cu mac, adâncimea este mai mică). Cantitatea de sămânță este de 10 - 12 kg ha (în cultură pură) și 8 kg/ha (în cultură mixtă) (E. Păun, 1995). Dacă se asociază cu mac, acesta se însămânțează în cantitate de 1 - 2 kg/ha, care se adaugă seminței de chimion (A. Mihalea, 1986). În condițiile pedoclimatice din Depresiunea Oravița (în climat cu influențe mediteraneene), chimionul semănat la finele lunii august, a asigurat recolte de până la 1,5 t/ha, cu 5 - 6 % ulei volatil (A.R. Mosoarcă, 2006). După aceeași autoare prezentăm recolta obținută la chimion, în funcție de proveniență, fertilizare și distanța între rânduri (tabelul 4.14.2.1.), rezultate mai bune obținându-se la 50 cm între rânduri.

Tabelul 4.14.2.1.

Sinteza rezultatelor la chimion obținute în Depresiunea Oravița-teritoriul Ciclova, în ciclul experimental 2002-2005

Soiul (factorul A)	Nivelul de fertilizare (factorul B)	Distanța între rânduri (factorul C)		Mediile factorului A			
		50 cm	25 cm	Recolta kg/ha	%	Diferența kg/ha	Semnificația
De Ghimbav	N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	1305	1093	1286	100	-	-
	N ₁₀₀ P ₅₀ K ₅₀	1422	1141				
	N ₁₅₀ P ₅₀ K ₅₀	1493	1266				
De Ciclova	N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	1179	950	1147	89	139	-
	N ₁₀₀ P ₅₀ K ₅₀	1247	1074				
	N ₁₅₀ P ₅₀ K ₅₀	1314	1119				
DL 5 % = 197 kg/ha, DL 1 % = 455 kg/ha, DL 0,1 % = 1449 kg/ha							
Mediile factorului C				Mediile factorului B			
Specificare	50 cm	25 cm		Specificare	N ₅₀	N ₁₀₀	N ₁₅₀
Recolta kg/ha	1326	1107		Recolta kg/ha	1131	1221	1278
%	100	83		%	100	108	112
Diferența kg/ha	-	-219		Diferența kg/ha	-	90	141
Semnificația	-	000		Semnificația	-	xx	xxx
DL 5 % = 27 kg/ha, DL 1 % = 39 kg/ha, DL 0,1 % = 44 kg/ha				DL 5 % = 54 kg/ha, DL 1 % = 75kg/ha, DL 0,1 % = 105 kg/ha			

Lucrările de îngrijire. În primul an se fac prașile și pliviri, rădăcina chimionului la 8 - 10 cm pe rând și recoltarea (cu grijă) a plantei însoțitoare (asociață). Resturile vegetale de la planta asociată se strâng, se îndepărtează din lan, apoi se prășește. În anul întâi se pot aplica erbicidele Gesagard (Casatrin) (4 kg/ha) sau Afalon (2 l/ha), după semănat. În anul doi, se fac, de asemenea, prașile și pliviri. În ambii ani se pot folosi erbicidele antigraminice Fusilade (3 l/ha) sau Furore (2 l/ha) aplicate când buruienile au 4 - 6 frunze (E. Păun, 1995). Acarienii se combat prin stropiri cu Fosfation 1 l/ha, iar împotriva făinării se aplică sulf muabiil 0,4 %.

În loturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. Maturizarea fructelor de chimion se face eşalonat, iar fructele coapte se scutură foarte ușor. Recoltarea se poate face direct cu combina sau întâi se taie plantele apoi (după uscare) se treieră. Cu combina se recoltează când 60 - 75 % din umbеле sunt brune. Se adaptează combina (700 - 750 ture/minut la toabă, sitele potrivite etc.) pentru a nu se produce pierderi. În cazul seceratului cu mașini de tăiat se intră în lan când 30 - 35 % din umbеле sunt brune, apoi plantele se strâng în snopi mici (cu diametru de 15 - 20 cm) care se așează în picioare pentru a se usca. După uscare se treieră cu combina. Recoltarea se face în zilele noroase sau numai dimineața, seara sau noaptea, pentru a evita scuturarea.

Când se solicită iarbă proaspătă de chimion, recoltarea se face prin cosire la 20 cm de la sol când fructele au ajuns în faza de pârgă. Referitor la înălțimea de tăiere, când se solicită herba, cercetările efectuate la SCPMA Fundulea în perioada 1983 - 1984, de M. Mircea (redate în tabelul 4.14.2.2., după A. Mihalea, 1986), evidențiază faptul că este mai rentabilă recoltarea chimionului la o înălțime mai mare (40 cm), când producția de herba este ceva mai scăzută, însă crește producția de ulei.

Influența înălțimii de tăiere a plantelor de coriandru asupra producției de herba și ulei volatili
Tabelul 4.14.2.2.

Faza fenologică	Înălțimea de tăiere de la sol (cm)	Producția de material vegetal (herba), (g/ha)	Producția de ulei volatili, (kg/ha)
Lapte - ceară	40	150	39,6
Lapte - ceară	10	170	27

Loturile semincere se recoltează, se condiționează și se depozitează separat.

Condiționarea. După recoltare, semințele se usucă în magazinele aerisite în strat de 20 - 25 cm și lăpătate zilnic de 1 - 2 ori. Apoi semințele se selectează pentru realizarea indicilor de calitate.

Condițiile tehnice de recepție a fructelor de chimion prevăd un conținut de impurități de maximum 1 % - resturi de codițe și alte părți de plantă, maximum 2 % - fructe seci, rupte, înnegrite. Conținutul în ulei volatil, minimum 3 %. Corpuri străine organice, maximum 1,5 %, iar cele minerale, maximum 0,5 %. Umiditatea maximum 12 %.

Pentru iarba de chimion, condițiile tehnice de recepție prevăd ca impurități: maximum 5 % tulpini mai lungi de 10 cm sub ultima ramificație; corpuri străine organice, maximum 0,1 %, iar cele minerale, maximum 0,1 %, umiditatea normală a produsului proaspăt recoltat, fără urme de apă, conținutul de ulei volatil minimum 0,4 %.

Producția medie realizată de chimion este de 800 - 1200 kg/ha fructe.

4.14.3. FENICULUL (*Foeniculum vulgare* Mill.)

Fr: Fenouil; E: Common fennel, Fennel;

G: Gemeiner Fenchel, Fenchel.

4.14.3.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Feniculul (Molura, Anason dulce, Anason mare, Chimen dulce) a fost luat în cultură din antichitate de către popoarele din bazinul mediteranean. Planta este amintită în scrierile lui Hipocrate, Theophrast și Dioscorides (care face referiri la utilizările ei ca și condiment). Se cultivă pentru fructele sale ce au întrebuințări în medicină și industria alimentară. Denumirea plantei vine de la cuvântul lui latinesc „*foeniculum*”, diminutivul cuvântului „*foenum*” = fân, aspect pe care-l iau frunzele prin veștejire și uscare (I. Todor, 1958).

Materia primă și compoziția chimică. Se utilizează fructele de fenicul (*Foeniculi fructus*) care conțin ulei volatil, ulei gras, proteine și glucide. Într-o parte aeriană a plantei (*Foeniculi herba*) se poate folosi pentru extragerea uleiului volatil.

Conținutul în ulei volatil al fructelor diferă în funcție de varietate și proveniență fiind cuprins între 2 - 6 % (U. Stănescu și colab., 2004) până la 8,5 % (V. Istudor, 2001). La varietatea amară

(v. *vulgare*), plantele provenite din centrul și estul Europei au 3,44 - 7,2 % ulei volatil, unele provenite din India, ajung la 8,5 %, iar cele de proveniență românească 4,3 - 5,41 % ulei volatil. Fructele provenite de la varietatea dulce (v. dulce) sunt mai sărace în ulei volatil, cele provenite din Franța, Italia, Iugoslavia, conțin 1,7 - 3,8 %, iar cele din Egipt, 2,45 - 3,5 % ulei volatil (V. Cucu și colab., 1982, K. Javidnia și colab., 2004 etc.). În anii mai secetoși și călduroși, conținutul în ulei volatil este mai mare. Conținutul în ulei volatil este mai mic în anul I, deoarece coacerea se face pe timp mai răcoros și în condiții de lumină mai redusă (fructifică mai târziu) decât în anii următori. Componentul principal al uleiului volatil de fenicul este anetolul (trans - anetolul), care reprezintă între 50 - 75 % (la varietatea amară) și 78 - 90 % (la varietatea dulce) din total. Anetolul (metileterul unui alcool aromatic) imprimă un gust dulceag. Pe lângă anetol, în uleiul volatil de fenicul, se mai găsesc și alți derivați fenilpropanici (feniculina, cetona anisică, acid anisic etc.), hidrocarburi ciclice (limonen, dipenten, camfen), fenchona etc. Diferența între varietatea amară și dulce este dată de conținutul diferit în diverși compuși ai uleiului volatil, în special fenchona care, la varietatea amară, este de 10 - 30 % (imprimând gustul amărui uleiului volatil), iar la varietatea dulce, este sub 10 % (uneori sub 1 % sau absent). Varietatea amară are un conținut ridicat de α -pinen (1,8 - 4,7 %) și relativ scăzut de limonen (1,5 - 2,5 %), pe când la varietatea dulce α -pinenul se găsește în cantitate mai mică (0,4 - 0,8 %) și limonenul, în cantitate mai mare (4,2 - 5,4 %). (V. Cucu și colab., 1982). Alături de uleiul volatil, fructele de fenicul conțin 9 - 19,7 % lipide, 14 - 22 % proteine, 4 - 5 % glucide simple, 13 - 15 % celuloză brută, 5 - 6 % pentozani, 1,3 - 3 % pectine, 5,84 - 7,4 % cenușă și 10 - 16 % apă.

În *Farmacopeea Română* figurează ca monografii: *Foeniculi fructus* cu cel puțin 3,5 % (v/g) ulei volatil și *Aetheroleum foeniculi* (ulei de fenicul, ulei de anason dulce).

Utilizări. Uleiul volatil de fenicul are acțiune antispastică, carminativă, stimulează secreția lactată, fluidifică secrețiile bronșice, are proprietăți sedative etc. Utilizările fructelor și ale uleiului de fenicul sunt similare cu ale celor de anason. Se folosește ca antispasmodic, carminativ, expectorant în bronșite, în compoziția **ceaiului anticolitic, contra colicilor nr. 2, ceai pectoral nr. 2**, pulbere laxativ - purgativă etc. Singur sau în asociație cu chimionul se recomandă mamelor care alăptează. Fructele au utilizări în industria alimentară, iar uleiul la fabricarea bomboanelor, băuturilor și preparatelor igienice - cosmetice. Dacă se depășesc dozele terapeutice,

survin aceleași efecte ca în cazul fructelor de anason. Fructele de fenicul sunt contraindicate în ulcerul gastric și duodenal, în enterocolite cronice și acute.

Răspândire. Feniculul este originar (se găsește în flora spontană) din zona mediteraneană, nordul Africii și vestul Asiei (E. Păun, 1995) și este răspândit în cultură în numeroase țări. Varietatea amară (v. *vulgare*) se cultivă în nordul și sudul Europei, Asia și America. Varietatea dulce se cultivă mai mult în sudul Europei. Principali furnizori ai produsului vegetal sunt China, Egipt, Bulgaria, România și Ungaria. În țara noastră, se cultivă în zona de câmpie din Banat, Muntenia, Dobrogea și Moldova.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Foeniculum vulgare* Mill. sin. *Foeniculum officinale* All., *Foeniculum capillaceum* Gilib., *Anethum foeniculum* (fig. 4.14.3, după Flora României, vol VI, 1958 și 4.14.3.a., original). *Foeniculum vulgare* Mill are $2n = 22$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). Specia *Foeniculum vulgare* Mill. prezintă două subspecii, năi multe varietăți și numeroase forme cultivate ssp. *vulgare* Brit (sin. ssp. *silvestre*), apare spontan în zona mediteraneană. Formele cultivate în scop medicinal, alimentar și în parfumerie aparțin ssp., *capillaceum* (Gilib) Holmbae, var., *vulgare* (Miller) Thellung și var. *dulce* (Miller) Thellung (E. Coicui și G. Răcz 1962, V. Cucu și colab., 1982). Var. *vulgare* (fenicul amar) are fructe mici de culoare mai închisă, iar var. *dulce* (fenicul dulce) are fructe mai lungi, de culoare verde - galbui. Materialul existent în cultură este foarte heterogen, iar lucrările de ameliorare sunt dificile. În cultură sunt numeroase forme de fenicul: românesc, rusesc, bavarez, saxon, francez, mai bogate în anetol fiind, în general, feniculul saxon și bavarez.

La noi în țară, se cultivă soiul local (populația „Românesc” (din anul 1973) și soiul Hestia (din anul 2001).

Particularități biologice. Feniculul este plantă ierboasă, biennială sau perenă. În cultură poate să fructifice și în primul an, dacă se seamănă primăvara devreme. Culturile de fenicul se mențin circa 5 ani, obținându-se producții mari și constante. În zone mai nordice decât țara noastră, (cu ierni lungi și aspre, feniculul nu poate ierna și se cultivă ca plantă anuală (de primăvară), la care producțiile sunt mai mici (E. Coicui și G. Răcz 1962). În condițiile din țara noastră, feniculul iernează bine, putându-se cultiva și ca plantă semănată toamna.



Fig. 4.14.3. *Foeniculum vulgare* Mill.:
a - umbelă fructiferă;
b - diachenă; c - achenă (secțiune)

Rădăcina este pivotantă, cărnoasă, lungă de 20 - 30 cm, groasă până la 2 cm și cu puține ramificații laterale. Tulpina este erectă, înaltă de 1 - 2 m, cilindrică, fistuloasă, cu suprafața fin striată, brumată, glabră și ramificată. Frunzele sunt 3 - 4 penat - sectate, cu segmente foarte înguste, filiforme și mucronate la vârf (asemănătoare cu cele de măr). Cele inferioare au 25 - 30 cm lungime și sunt pețiolate, iar cele superioare au mai puține segmente și sunt sesile, toate cu vagina bine dezvoltată (lungă de 3 - 6 cm) în formă de glugă. Florile sunt grupate câte 12 - 20 în umbelule, iar umbelulele se grupează câte 8 - 16 în umbel, fără involucri sau involucl. Florile sunt alcătuite pe tipul 5, ca și la celelalte umbelifere. Caliciul este redus; corola formată din 5 petale mici, galben - aurii, lat ovate, îndoit spre interior, de 1,5 mm lungime; 5 stamine cu anterele ceva mai lungi decât petalele, iar gineceul, inferior. Fructul este o diachenă ovoidal - cilindrică, lungă de 4 - 10 mm, lată de 1,5 - 4 mm, cenușiu - brun verzui, cu cele două mericarpe separate, pe fiecare mericarp cu 5 proeminente (coaste) longitudinale deschise la culoare și foarte evidente, cele două marginale mai dezvoltate; miros aromat și gust dulceag. Înfloreste în iulie - august sau chiar septembrie.

Cerintele față de climă și sol. Fiind de origine sudică, feniculul este pretențios față de căldură. Suportă iernile din zonele sudice ale Europei, cultura ca plantă perenă fiind posibilă până la limita țării noastre. Pentru fenicul, sunt periculoase oscilațiile de temperatură din timpul iernii și primăverii. În iernile cu oscilații de temperatură și fără zăpadă, pot pieri peste 50 % din plante. Temperatura minimă de germinație a semințelor este de 6 - 8 °C. La aceste temperaturi, durata germinației este de 14 - 16 zile, iar la 15 °C, semințele germinează în 5 zile. Cerințele față de apă sunt ceva mai reduse, deoarece are sistem radicalar viguros, iar suprafața foliară și transpirația sunt mai mici. Seceta prelungită însoțită de vânturi calde și uscate, ca și ploile dese în timpul înfloririi și fructificării, afectează puternic producția. Feniculul pretinde un regim de umiditate echilibrat, pentru a se obține producții ridicate. Cerințele față de lumină sunt foarte ridicate la fenicul. Plantele umbrite se alungesc, ramifică slab și dau producții mici. Feniculul are perioada de vegetație lungă, ajungând în anul I la 170 zile, iar în anii următori la cca. 150 zile. Feniculul pretinde soluri nisipo - lutoase, fertile, bogate în humus și calciu. Dă rezultate bune pe cernoziomuri și soluri de luncă, cu o bună umiditate, cu apă freatică la 2 - 2,5 m. Solurile grele, reci, acide, cu apă stagnantă nu sunt potrivite pentru fenicul.

Zonare. Zonele foarte favorabile includ Câmpia Dobrogei, Câmpia Olteniei, Câmpia Timișului și Câmpia Crișurilor. Zonele favorabile sunt Câmpia Bărăganului, Câmpia Burnazului, Câmpia Moldovei (Jud. Botoșani), Câmpia Covurluiului (estul jud. Galați) (A. Mihalea, 1982, M. Alexan și colab., 1991).

4.14.3.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Feniculul se amplacează după cereale păioase și prășitoare bine întreținute. Cultura se menține în mod obișnuit cinci ani. S-a constatat că prin scuturarea semințelor cultura se îndesește, urmând ca plantele răsărite să fie ferite în timpul prașilei (M. Alexan și colab., 1991). Pe același teren poate reveni numai după 4 - 6 ani.

Loturile semincere se amplacează izolat în spațiu, la circa 10 km de alte culturi de fenicul pentru a preveni atacul cercosporiozei feniculului produs de ciuperca *Cercospora depressa* Bern et Br. Wasil (E. Păun, 1986).

Fertilizarea. Anual se aplică circa 50 kg/ha P_2O_5 (toamna) și 60 - 70 kg/ha N (primăvara devreme). Dozele se stabilesc în funcție de fertilitatea solului și planta premergătoare.

Lucrările solului. Arătura se execută la 25 - 30 cm adâncime, imediat după eliberarea terenului de către planta premergătoare și se nivelează, pentru a se zvânta terenul primăvara uniform și devreme. Patul germinativ se pregătește cu combinatorul, urmându-se o bună afânare și mărunțire a terenului.

Sămânța și semănatul. Feniculul se înmulțește prin semănat direct în câmp. Sămânța trebuie să aibă puritatea de 97 % (minimum 95 %), iar germinația de 80 % (minimum 60 %). Se seamănă în pragul iernii (dacă nu este posibil se seamănă primăvara timpuriu), situație în care plantele fructifică în anul întâi. Experiențele privind epoca de semănat a feniculului în diferite zone de cultură la noi în țară (comunicate de E. Mateescu și colab.) sunt prezentate în tabelul 4.14.3.1. (după E. Păun, 1986). Se constată superioritatea semănatului în pragul iernii, urmat de varianta semănat primăvara timpuriu. În toate zonele de cultură, întârzierea semănatului primăvara duce la scăderea producției de fructe (datorită precipitațiilor reduse din lunile martie - aprilie).

Semănatul se face cu semănători universale, asigurând 35 - 40 plante/m² la răsărire (E. Păun, 1986). Distanța dintre rânduri este de 62,5 cm, adâncimea de semănat de 2 - 3 cm, iar cantitatea de sămânță, 8 - 10 kg/ha.

Tabelul 4.14.3.1.
Influența epocii de semănat asupra producției de fructe la
feniculul cultivat în diferite zone pedoclimatice

Epoca de semănat	Producția de fructe					
	Moara Domnescă		Lovrin		Valea lui Traian	
	q/ha	%	q/ha	%	q/ha	%
În pragul iernii	23,01	114	14,64	117	16,54	102
Primăvara în epoca I (MI)	20,26	100	11,77	100	16,23	100
Primăvara în epoca a II-a (la 10 zile de MI)	20,45	101	11,31	96	14,62	90
Primăvara în epoca a III-a (la 20 de zile de MI)	21,11	104	11,70	99	13,77	85

Lucrările de îngrijire. În anul întâi, după răsărirea plantelor, se fac prașile și pliviri pentru combaterea buruienilor și afânarea solului, se răresc plantele (dacă este cazul), lăsându-se 2 - 3 plante, la 30 - 35 cm pe rând, iar toamna se face o bilonare pe rând. Din anul al doilea, prin scuturarea semințelor, plantele se îndesesc. Buruienile se combat prin prașile mecanice între rânduri înainte de pornirea în vegetație se pot aplica erbicidele: Gesagard (4 kg/ha), iar pe vegetație Fusiliade (3 l/ha) sau Furore (2 l/ha) (E. Păun, 1995).

Boile cele mai frecvente la fenicul (veștețirea plantelor, mana, pătarea brună a frunzelor etc.) se previn prin folosirea semințelor sănătoase și respectarea măsurilor de igienă culturală, iar dăunători (omida de stepă etc.) se combat prin tratamente pe sol cu insecticide organice sau piretroizi de sinteză (V. Plugarn, 2000).

În loturile semincere se efectuează purificare biologică, înlăturându-se plantele atipice și bolnave.

Recoltarea. Dacă se însămânțează toamna, sau primăvara devreme, se obțin recolte încă din primul an, din anul al II-lea până în anul al V-lea obținându-se recolte mari și constante.

Maturizarea feniculului are loc egalizat și există pericolul scuturării. Recoltarea direct cu combina se face când majoritatea fructelor au culoarea galben - brun.

Datele privind epoca de recoltare a feniculului (în anul I și II de vegetație) (obținute de E. Mateescu și colab.) sunt prezentate în tabelul 4.14.3.2. (după E. Păun, 1986). Se constată că producția de fructe la fenicul este mai mare dacă recoltarea se face când 50 % din umbelile sunt coapte, iar la întârzierea recoltării, când 75 % din umbelile sunt coapte, producția scade cu 17 - 18 %, în funcție de zona de cultură.

La recoltarea în două faze, plantele se taie când fructele au culoarea galbenă, iar după uscare se treieră.

Pentru obținerea uleiului volatil din herba, recoltarea (tăierea și tocarea) plantelor se face, cu combinele pentru recoltat porumbul

siloaz, când fructele din umbela centrală și în parte cele din umbelile de gradul I sunt galben - brune, în faza de "lapte - ceară" (E. Păun, 1995).

Tabelul 4.14.3.2.
Influența epocii de recoltare asupra producției de fructe la
fenicul (suma recoltelor din anul I+II)

Epoca de recoltare (pentru anul I și II)	Moara Domnescă		Lovrin		Valea lui Traian	
	q/ha	%	q/ha	%	q/ha	%
Când fructele din umbela centrală sunt coapte	14,17	96	22,05	101	15,85	85
Când 50 % din umbelile au fructe coapte (MI)	14,74	100	21,2	100	18,52	100
Când 75 % din umbelile au fructe coapte	12,19	83	17,77	84	15,12	82

Loturile semincere se recoltează, se condiționează și se depozitează separat de sămânța utilizată ca materie primă.

Condiționarea. Fructele se usucă la umiditatea de păstrare (12 %).

Condițiile tehnice de recepție pentru fructe admit un conținut de impurități de maximum 1 % resturi de codițe și alte părți din plantă; maximum 0,5 % fructe zdrobite, înegrite, seci. Corpuri străine organice, maximum 1,5 %, iar cele minerale, maximum 0,5 %. Umiditatea maximă 12 %. Conținutul în ulei volatil, minimum 3 %.

Producția. În primul an de cultură, se obține o producție de 5 - 8 q/ha fructe. Începând din anul al II-lea, până în anul al V-lea, producțiile sunt relativ constante, fiind cuprinse între 10 - 18 q/ha fructe anual.

Producția de ulei din distilarea întregii mase vegetale tocate este de 30 - 50 l/ha (E. Păun, 1985), în funcție de starea culturii și condițiile climatice.

4.14.4. ANASONUL (*Pimpinella anisum* L.)

Fr: Anis; E: Anise; G: Anis

4.14.4.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Anasonul (anisonul), este utilizat și luat în cultura din antichitate de popoarele est - mediteraneene. Este cunoscut în medicina antică în India și China, în evul mediu de arabi. În Europa de vest a fost adus de romani (sub denumirea de "anes"), în Spania (sec. XII-lea), Anglia (sec. XVII-lea), iar în Rusia se cultivă din anul 1830

(M. Verzea, 1988). Țările fostei Uniuni Sovietice au fost furnizorul principal de anason și ulei de anason pe piață, până la primul război mondial.

Materia primă și compoziția chimică. Anasonul se cultivă pentru fructe (*Anisi fructus*; *Anisi vulgaris fructus*) care conțin ulei volatil, ulei gras și substanțe proteice.

Conținutul de ulei volatil în fructe variază în limite largi (1,5 - 6 %), în funcție de proveniență (S.L.M. Khim și colab., 1999; E. Grigorescu și colab., 2001; U. Stănescu și colab., 2004 etc.). Mai bogate sunt fructele de plantele cultivate în țările mai calde, Siria (5 - 6 %), Italia, Spania (3 - 3,5 %), Bulgaria (2,9 - 6 %) etc., decât cele din zonele mai reci, cum ar fi Canada (1,05 - 1,1 %) etc. (V. Cucu și colab., 1982). Conținutul de ulei este influențat de asemenea și de condițiile de cultură. Principalul component al uleiului volatil din fructele de anason este anetolul (trans - anetolul), izolat din secolul al XIX-lea, care se găsește în proporție de 80 - 90 %, sau chiar mai mult (V. Cucu și colab., 1982). Uleiul volatil din anason se consideră că are o compoziție chimică relativ simplă. El mai conține estragol, aldehidă anisică, cantități mici de cis - anetol, alcool anisic, vanilina, hidrochinonă, crezol etc. E. Coiciu și G. Răcz, 1962, arată că unii compuși (anisaldehydă, acidul anisic) sunt probabil produși secundari, care apar în timpul prelucrării sau păstrării fructelor.

Fructele mai conțin 10 - 20 % ulei gras (mai mult în fructele uscate), 16 - 20 % compuși azotați, 5 % amidon, 18 - 20 % celuloză brută, 3 % glucide simple, 6 - 10 % substanțe minerale și 11 - 13 % apă. Păstrate timp mai îndelungat, fructele devin toxice (A. Radu și E. Andronescu, 1984). În *Farmacopeea Română* figurează *Anisi vulgaris fructus*, cu un conținut de cel puțin 2 % (V/g) ulei volatil și *Aetheroleum anisi* (ulei de anason).

Utilizări. Uleiul volatil din fructele de anason are acțiune expectorantă, carminativă, galactagogă, stimulează peristaltismul intestinal, intensifică secreția salivară, gastrică, intestinală și pancreatică. În doze terapeutice, are efect stimulent asupra centrilor respirației și circulației. În doze mari, produce stări de excitație puternică, manifestate prin insomnii, excitații motorii și psihice, tulburări de vorbire, depresione asupra sistemului nervos central. Chiar și în doze mici, utilizarea îndelungată produce iritarea mucoaselor digestive. Se utilizează ca expectorant, carminativ, în corectarea gustului unor medicamente etc. Extractele sau uleiul volatil de anason se folosește în medicamente: antitusive (**Calmotusin**), carminative și laxativ (**Carbocif, Gastrosedol**), carminative pediatrice

(**Bonnisan**). Fructele intră în formula „Species pectorales” (*Farmacopeea Română*). Este contraindicat în gastrite hiperacide, ulcer gastric și duodenal, enterocolite cronice și acute. Fructele și uleiul volatil sunt folosite și în industria alimentară, la prepararea unor băuturi etc. Uleiul gras se poate obține ușor prin presare și se utilizează la fabricarea lacurilor și vopselelor, în industria săpunurilor etc. Turtele rămase sunt folosite în hrana animalelor. Anasonul este o buna plantă meliferă, obținându-se în anii favorabili până la 80 - 100 kg miere la hectar.

Răspândire. Anasonul este originar din estul zonei mediteraneene, unde a fost găsit spontan pe o insulă în Marea Egee (E. Păun, 1995). Se cultivă pe glob în zone cu clima mai caldă, regiunea mediteraneană (Spania, Italia, Egipt), țărilor din SE Europei, Turcia, sudul Rusiei, India, Mexic, Chile etc. Produsul vegetal este asigurat pe plan mondial de Turcia, Egipt, Spania etc. La noi în țară se cultivă pe suprafețe restrânse în sud, sud - vest și sud - estul țării.

Sistematică. Soluri. Specia cultivată este *Pimpinella anisum* L., sin. *Anisum vulgare* Gaertn (fig. 4.14.4. după Flora României, vol VI, 1958 și 4.14.4.a., original). *P. anisum* L., are $2n = 18,2$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). Specia crește spontan numai pe o insulă din Arhipelagul Mării Egee, însă poate să apară și spontan în alte zone (E. Coiciu și G. Răcz, 1962), iar cultivat este răspândit în multe țări pe glob.

La noi în țară se cultivă soiul local „De Crângu” (din anul 1975).

Particularități biologice. Anasonul este o plantă ierboasă, anuală. Rădăcina este pivotantă, subțire, albă, relativ slab dezvoltată. Tulpina are 40 - 75 cm înălțime este erectă, glabră, striată, cilindrică, ramificată în partea superioară. Frunzele sunt diferențiate după etaj. Cele inferioare (2 - 3) dispuse altern, sunt întregi, lung pețiolate, ovate cu marginea dințată. Frunzele tulpinale inferioare sunt pețiolate 3 (5) lobate și cu marginea dințată. Frunzele tulpinale superioare sunt sesile 2 - 3 penat sectate cu foliole linear-lanceolate, iar cele din vârful tulpinii simplu triprenat-sectate, trilobate sau întregi. Florile sunt dispuse în 7 - 15 umbel compuse fără involucri, cu câte 5 - 15 flori. Florile sunt pe tipul 5, fără caliciu. Corola este formată din 5 petale albe, lungi de cca 1,5 mm, ciliate pe margini, în vârf cu un lobușor îndoit spre interior. Androeul este format din 5 stamine, iar gineceul dintr-un ovar inferior, bicarpelar, prelungit cu două stigmat capitate.




Fig. 4.14.4. *Pimpinella anisum* L.
a - fruct

Fructul este diachenă mărunță cu lungimea de 3 - 5 mm și lățime de 2 - 3 mm, compus din două mericarpe greu separabile, de formă ovoidală, acoperite de peri scurți. Culoarea fructului este cenușiu - verzuie sau galben - cenușie. Pe fiecare mericarp sunt 5 coaste de culoare mai deschisă. Fructele au miros aromat și gust dulceag. MMB este de cca 3 - 3,5 g, iar MH cca. 36 kg. Anasonul înflorește în lunile iunie-iulie. Înflorirea durează 25 - 30 de zile.

Perioada de vegetație este de 120 - 140 de zile.

Cerințele față de climă și sol. Anasonul preferă o climă caldă și potrivit de umedă. Temperatura minimă de germinație este de 3 °C, iar la 6 - 8 °C răsare în masă (în 16 - 20 de zile). La temperaturi mai scăzute se reduce creșterea, cultura este înăbușită de buruieni și se mărește sensibilitatea față de boli. Pe perioada înfloririi nu sunt favorabile temperaturile prea ridicate. Cerințele față de umiditate sunt destul de mari, reușind în zone cu 400 - 600 mm precipitații anual, bine repartizate în cursul vegetației. E sensibil la secetă în cursul germinației și creșterii plantelor. Excesul de ploi însă, în perioada înfloririi, favorizează atacul de boli, îngreunează polenizarea, iar în perioada maturizării duce la înnegrirea fructelor. Seceta prelungită în perioada înfloririi - fructificării este la fel de dăunătoare. Având sistemul radicular relativ redus, anasonul este pretențios față de sol. Se dezvoltă bine pe soluri bogate în humus și calciu, cu textura nisipo-lutoasă sau luto - nisipoasă, afânate. Solurile grele, reci și cu umiditate în exces, sunt contraindicate. Cele mai bune rezultate se obțin pe cernoziomurile cu pânza freatică la mai mică adâncime și afânate.

Zonare. În țara noastră, anasonul este zonat în Câmpia Bărăganului, Câmpia Burnazului, Câmpia Olteniei și Câmpia Timișului. (E. Păun și colab., 1983).

4.14.4.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Anasonul se cultivă după plante care lasă solul curat de buruieni, cereale de toamnă și prășitoare bine întreținute. Se interzice cultivarea după coriandru, iar pe același teren poate să revină numai după 6 ani (M. Alexan și colab., 1991).

Loturile semincere se amplasează separat, izolate în spațiu, de alte culturi de anason.

Fertilizarea se face cu 60 - 80 kg/ha P_2O_5 și 60 - 70 kg/ha K_2O (toamna sub arătură) și 70 - 90 kg/ha N (primăvara) (D. Drila, 1998).

Lucrările solului. Sunt similare cu ale coriandrului.

Sămânța și semănatul. Anasonul se înmulțește prin semănat direct în câmp. Sămânța trebuie să aibă puritatea de 95 % (minimum 90 %), iar germinația de 80 % (minimum 65 %). Semănatul se face primăvara timpuriu (când solul are 3 - 4 °C) cu semănători universale, asigurând 120 - 140 plante/m² (S. Male, 1986). Se poate semăna la distanță între rânduri de 50 cm (pe soluri îmburuienate, pentru a se putea prași) sau 25 cm (pe terenurile curate de buruieni), la adâncimea de 2 - 3 cm (E. Păun, 1995). În condițiile din vestul țării, producția cea mai mare s-a realizat la 50 cm între rânduri, față de 12,5 cm. La 50 cm între rânduri solul s-a întreținut mai bine, prin prașile mecanice, iar gradul de ramificare a plantelor a fost mai ridicat (tab. 4.14.4.1., media pe anii 1994 - 1996) (după D. Drila, 1998).

Tab. 4.14.4.1.

Perioada de seminat (B)	Proveniențe	Distanța între rânduri (C)				Producția (kg/ha)	%	Dif.	Semnif.		
		12,5 cm	25 cm	50 cm	75 cm						
Decada a III-a (martie)	De Crângu	739	288	862							
	De Olanda	738	801	891							
	De Austria	646	715	792			100	-	-		
Decada I-a (aprilie)	De Crângu	620	656	723							
	De Olanda	635	670	759							
	De Austria	652	591	652				-115	000		
Decada II-a (aprilie)	De Crângu	510	559	603							
	De Olanda	532	581	644			553	71	-222		
	De Austria	472	513	544							
		DL 5 % = 51				1 % = 64				0,1 % = 82	
		Mediile factorului C				Mediile factorului A					
Producția (kg/ha)	616	653	722			Specific	Crângu	Olanda	Austria		
	100	106	117			Prod (kg/ha)	673	695	622		
%						%	100	103	92		
Diferența (kg/ha)	-	37	105			Dif (kg/ha)	-	22	-51		
Significația		x	xxx			Semnif	-	-	O		
		DL 5 % = 25; 1 % = 39; 0,1 % = 50				DL 5 % = 47; 1 % = 71; 0,1 % = 124					

Rezultatele obținute la SCPMA Fundulea de S. Male, 1984, privind influența distanței de semănat (tabelul 4.14.4.2.) și a normei de semănat (tabelul 4.14.4.3.) asupra producției de fructe la anason, arată că s-au obținut rezultate mai bune la semănatul în rânduri apropiate (12,5 și 25 cm) și la 12 kg de sămânță la ha.

Quantitatea de sămânță este de 12 kg/ha (amestecată cu 2 - 3 părți material inert - nisip fin sau cenușă). Germinația semințelor și răsărirea sunt favorizate prin expunerea semințelor la soare (2 - 3 zile) sau prin „fermentația” lor (semințele îmbibate în apă se țin 3 zile în

grămezi, apoi se întind pentru uscare la umbră și se lopătează) (M. Alexan și colab., 1991).

Influenta distanței de semănat asupra producției de fructe la *Pimpinella anisum* L.

Distancia entre rânduri, cm	Producția (q/ha)	Diferența (q/ha)	%	Semnificație
12,5	7,47	0,69	110	**
25	7,39	0,61	109	**
50	0,78	-	100	-

Influenta normei de semănat asupra producției de fructe la *Pimpinella anisum* L.

Norma de semănat kg/ha	Producția (q/ha)	Diferența (q/ha)	%	Semnificație
10	6,97	-	100	-
12	7,44	0,53	108	-
14	7,22	0,3	104	-

Lucrările de îngrijire. Buruienile se combat prin prașile și pliviri, iar chimic cu erbicidul Afalon (2 - 3 kg/ha), aplicat imediat după semănat. Buruienile monocotiledonate (costrei etc.) se combat cu Fusilade (2 l/ha) sau Furore (2 l/ha), aplicate când acestea au 4 - 6 frunze (E. Păun, 1995). Mana, rugina și cercosporioza se combat cu Dithane M-45 (0,25 %), Altocombi 420 (0,5 - 1 l/ha); Ridomil MZ (0,25 %), iar culturile atacate de făinare se tratează cu Afugan CE (0,1 %) sau Rubigan 12 CE (0,04 %) (V. Dulămea, 2000, G. David și colab., 2003 etc.).

Cu 2 - 3 stupi la ha se asigură polenizarea și se obține, totodată, o producție bună de miere.

În loturile semincere se efectuează purificarea biologică, înălăturându-se plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. Maturizarea fructelor de anason are loc eşalonat; la coacere aceasta se scutură ușor. Recoltarea direct cu combina se face când 50 - 60 % din fructele umbelilor centrale devin brune și puținile încep să se îngălbenească. La combină trebuie să se facă reglările necesare: reducerea turației bătătorului la circa 700 ture/min, reducerea numărului de șine la tobă, reducerea intensității vântului, schimbarea sitelor etc.

Loturile semincere se recoltează la maturitatea deplină a fructelor (M. Verzea, 1988), iar condiționarea și depozitarea se va face separat de alte loturi de semințe de anason.

Condiționarea. Dacă este necesară, uscarea artificială a semințelor se face la 30 - 40 °C. Fructele se pot usca și în aer liber sau în încăperi curate.

Condițiile tehnice de recepție admit ca impurități maximum 0,5% resturi de codițe și alte părți de plantă, maximum 1,5 % fructe seci, sfărâmate, brune. Corpuri străine organice, maximum 4 %, iar cele minerale, maximum 1 %. Umiditatea maximum 12 %. Nu se admit impurificări cu semințe de coriandru și mai ales cu cele de cucută (care sunt toxice).

Producția medie de fructe la anason este de 600 - 800 kg/ha, putându-se obține și 1000 kg/ha.

4.14.5. ANGELICA

(*Angelica archangelica* L.)

Fr: Angélique; E: Garden angelica, Angelica;

G: Engelwurz, Erzengelewurz.

4.14.5.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Angelica (Anghelică, Angelină), specie eurasiatică de origine nordică și de altitudini de 500 - 1500 m, se cultivă în zone înalte, umede și răcoroase, ca plantă medicinală și ca plantă aromată pentru industria alimentară.

Specia reprezentând o raritate floristică în țara noastră, este ocrotită de lege, nefiind admisă recoltarea din flora spontană. Se cultivă în condiții apropiate celor din flora spontană, la altitudini mai joase (500 - 600 m).

Materia primă și compoziția chimică. Angelica se cultivă pentru rizomi (groși de 3 - 5 cm și lungi de 6 - 8 cm) și rădăcini (lungi de 20 - 30 cm și groase de 0,5 - 1 cm), care constituie materia primă (*Angelicae radix*), recoltată în mod obișnuit în culturi la sfârșitul primului an de vegetare.

Rizomul și rădăcinile conțin ulei volatil cu miros caracteristic, în cantitate de 0,1 - 0,37 % în produsul proaspăt și 0,28 - 1 % în produsul uscat (E: Coiciu, 1967, V. Cucu și colab., 1982, M. Grievu, 1995) sau între 0,36 - 1,9 % (U. Stănescu și colab., 2004), în funcție de proveniență, zonă și mod de cultură. Mai bogate în ulei volatile sunt rădăcinile subțiri (0,93 - 1,08 %), umate de cele adventive (0,33 - 0,61 %), cele groase (0,32 - 0,53 %) și de rizomi (0,16 - 0,24 %).

Rădăcinile de un an conțin mai mult ulei volatil decât cele de doi ani. Rizomul are conținutul maxim în ulei volatil înainte de înflorire. În uleiul volatil predomină, în unele proveniențe, α -felandrenul (15 - 20 %) și β -felandrenul (20 - 25 %), iar în altele α -pinenul (27 %) și β -pinenul (57,08 %). Alături de aceste terpeni, uleiul volatil mai conține: limonen, caren, mirecen, cimol etc. Mirosul caracteristic al uleiului volatil este dat de lactona acidului 15-hidroxi-pentadecenoic și probabil de omologi (V. Cucu și colab., 1982). Rădăcinile mai conțin produși cumarinici (ostol, ostenol, umbeliferonă, angelicină, archangelicină etc.), acizi organici (cafeic, angelic, oxalic, citric etc.), acizi grași (linoleic, palmitic etc.), glucide (zaharoză, fructoză, glucoză), tanin, flavone și vitamine (B₁). Fructele sunt mai bogate în ulei volatil decât rădăcinile, conținutul fiind de 0,31 - 0,53 % în fructe proaspete și 0,32 - 2 % în cele uscate (V. Cucu și colab., 1982, I. S. Muntean și colab., 1991, D. Lăzurca, 1996). Compoziția chimică și constantele fizice ale uleiului din fructe sunt similare cu cele ale uleiului din rădăcini (având însă ceva mai multe terpeni). Se folosesc la aromatizări și în scop medicinal.

După D. Lăzurca, 1996 prezentăm dinamica acumulării uleiului volatil la angelica în părțile subterane, în anul întâi de vegetație (tabelul 4.14.5.1.) și anul 2 de vegetație (tabelul 4.14.5.2.), iar în tabelul 4.14.5.3. conținutul de ulei volatil în diferite organe ale plantei în momentul înfloririi umbelii principale (18.06.1992).

Uleiul volatil are o acțiune locală iritantă, mai ales sub influența razelor solare. La persoane sensibile, după un singur contact cu planta se pot produce dermatite, acțiune atribuită (în primul rând) compuşilor din grupa furocumarinelor (E. Coiciu, 1967).

Utilizări. Uleiul volatil de angelică, în doze mici, este un excitant cerebral, iar în doze mari, este depresiv cerebral și are acțiune paralizantă. Acțiunea locală a acestui ulei volatil este iritantă. Din ulei, alcool și camfor, se prepară o soluție care calmează durerile reumatice. *Angelicae radix*, prin complexul componentelor, are acțiune tonic - amară, stomachică și antibiolică. Produsul vegetal intră în compoziția unor medicamente gastro - intestinale (**Iberogast**, **Casitol**, **Stovalid**, **Carvomin**). În scop medicinal, se pot utiliza și părțile aeriene ale plantei și fructele. Este citată între plantele cu uleiuri volatile utilizate contra cancerului (E. Coiciu, 1967). Toate organele plantei au utilizări în industria alimentară, mai ales la prepararea unor lichioruri etc. (D. Lăzurca, 1996).

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Angelica archangelica* L. (*Angelica officinalis* Munch, *Archangelica officinalis* Hoffm.). Numele genului derivă de la cuvântul grecesc *angelos* = înger, presupunând că a fost indicată oamenilor de un înger (I. Tudor, 1958). *A. archangelica* L. are $2n = 22$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). Specia *Angelica archangelica* L. este redată în fig. 4.14.5 (după Flora României, vol. VI, 1958) și 4.14.5.a. (original).

În țările din Europa de Apus, în Ucraina și Germania (unde cultura se practică din 1583, după Heeger, 1956, citat de E. Coiciu și G. Răcz, 1962, există diverse proveniențe locale și biotipuri valoroase cultivate.

În țara noastră, din specia *Angelica archangelica* L. se cultivă soiul local (populația) „De Cristian” (din anul 1977).

Particularități biologice. *Angelica* este plantă ierboasă bienală sau perenă, în primul an formând rizomul, rădăcinile și frunze bazale, iar din anul al doilea, apare tulpina floriferă. Planta prezintă în sol un rizom napiform, lung de cca 10 cm și gros de cca 5 cm, la plantele mai în vârstă este multiplicat în vârf cu resturile părților aeriene din anul precedent. Rizomul este de culoare brună sau brun-cenușie și cu strițiuni circulare, în interior cu un suc alb - gălbui. Rădăcinile adventive, formate din rizom sunt lungi de 10 - 30 cm și groase de 0,5 - 1 cm. Tulpina apare începând din anul al doilea, este foarte viguroasă, erectă, înaltă de 100 - 150 cm (uneori mai mare), groasă până la 8 cm, ramificată, cilindrică, fistuloasă, fin striată. Frunzele sunt mari, cele inferioare până la 90 cm lungime, cele superioare de cca. 10 cm. Frunzele sunt de 2 - 3 ori penat-sectate, cu foliolele ovate, inegal serate, lungi de 5 - 8 cm, dinții terminați în mucroni scurți, iar foliola terminală trilobată sau diferit sectată. Caracteristic la această specie este vagina mare, umflată, mai evidentă la frunzele de la partea superioară a tulpinii, la care lamina este situată direct pe vagină. La frunzele inferioare, petiolul este lung, cilindric, fistulos. Florile sunt dispuse în umbel mari, globuloase cu diametru de 10 - 20 cm, compuse din 10 - 20 de radii muchiate, terminate în umbelule globuloase lipsite de involucre, însă cu involuclul din numeroase foliole. Florile sunt pe tipul 5; calicul redus; corola formată din 5 petale lat-eliptice, lungi de cca 1 mm. alb - verzui sau gălbui; androceul format din 5 stamine cu filamentul mai lung decât petalele; ovarul este interior.

Tabelul 4.14.5.1.
Dinamica acumulării uleiului volatil în părțile subterane (rizomi cu rădăcini) uscate ale plantelor de *Angelica archangelica* L. în anul I de vegetație

Data recoltării	ml ulei volatil în 100 g rizomi cu rădăcini uscate			Semnificația
	ml ulei volatil	d	%	
10.06.91	0.430	-	100	-
20.07.91	0.565	0.135	131	x
17.08.91	0.608	0.178	141	x
14.09.91	0.803	0.373	186	xx
11.10.91	0.978	0.548	227	xx
DL 5 % = 0,113 DL 1 % = 0,189 DL 0,1 % = 0,474				

Tabelul 4.14.5.2.
Dinamica acumulării uleiului volatil în părțile subterane (rizomi cu rădăcini) uscate ale plantelor de *Angelica archangelica* L. în anul II de vegetație

Data recoltării	ml ulei volatil în 100 g rizomi cu rădăcini uscate			Semnificația
	ml ulei volatil	d	%	
23.03.92 (ml)	0.88	-	100	-
24.04.92	0.54	-0,34	61	000
22.05.92	0.34	-0,54	38	000
18.06.92	0.21	-0,67	23	000
21.07.92	0.08	-0,80	9	000
DL 5 % = 0,65 DL 1 % = 0,102 DL 0,1 % = 0,254				

Tabelul 4.14.5.3.
 Variația conținutului de ulei volatil, la momentul înfloririi umbelulei principale în diferite organe ale plantei de *Angelica archangelica* L.

Organul utilizat	ml ulei în 100 g produs	
	proaspăt	uscat
Rădăcină secundare	0.258	0.592
Rădăcina principală	0.205	0.498
Rizom	0.093	0.228
Tulpină	0.012	0.025
Ramificații	0.083	0.142
Petiole	0.035	0.078
Frunze	0.045	0.105
Umbela principală cu flori	0.315	0.725
Umbelule cu flori din umbela principală	0.325	0.812
Umbelule secundare cu boboci floralii	0.215	0.504
Umbelule cu boboci floralii din umbelule secundare	0.225	0.526

Răspândire. *Angelica* este o plantă originară din nordul Europei (A.S. Potlog, 1942). În flora spontană, apare în zona forestieră, montană și subalpină (altitudine 500 - 1500 m), în zone umede, în lungul pâraielor, în turbării, la marginea pădurilor. Pentru ocrotirea acestei specii din flora spontană, s-a luat în cultura și în țara noastră. Se cultivă în Europa, mai mult în Germania, Polonia, Franța, Belgia, Olanda, Rusia, care asigură cea mai mare parte a produsului vegetal.




Fig. 4.14.5. *Angelica archangelica* L.:
a - fruct; b - semifruct (secțiune transversală)

Fructele sunt diachene elipsoidale, ușor umflate și rotunjite la capete, lungi de 6 - 8 mm, late de 4 - 5 mm, costate dorsal și cu coaste laterale aripate, cu mericarpe turtite dorsoventral, care se desfac ușor. Planta înflorește în lunile iulie - august.

Cerințe față de climă și sol. *Angelica* este o plantă nordică și de altitudine de peste 1000 m. La noi crește în zone umede și răcoroase din etajul montan și subalpin. Este o plantă cu cerințe mai reduse la temperatură, însă pretențioasă la regimul hidric. Pretinde zone lipsite de vânturi și însorite. *Angelica* reușește bine în cultura în condițiile din depresiunea Bârsei (A. Laza și H. Heltnann, 1968). Rădăcini mari și de calitate bună se obțin pe soluri aluviale, chiar cu început de turbificare, dar profunde, bogate în humus, umede, însă fără exces de umiditate.

Zonare. Este cultivată în zone înalte (500 - 600 m altitudine), pe locuri adăpostite, însorite și în apropierea apelor curgătoare. Este zonată în cultură în județele Brașov și Suceava (A. Mihalcea, 1986).

4.14.5.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. *Angelica* se cultivă ca plantă anuală, pentru producția de rădăcini. În rotație se amplacează după plante care eliberează terenul devreme, prășitoare fertilizate cu gunoi de grajd, după leguminoase sau cereale (E. Păun, 1995). Pe același teren poate reveni numai după 5 - 6 ani (M. Alexan și colab., 1991).

Loturile semincere se amplacează separat de alte culturi de *angelică*, urmând să se mențină cultura și în al doilea an, pentru obținerea de semințe.

Fertilizarea. Se aplică 20 t/ha gunoi de grajd descompus și câte 30 - 40 kg/ha substanță activă azot, fosfor și potasiu (A. Mihalcea, 1986). Dozele de NPK se stabilesc în funcție de fertilitatea solului și planta premergătoare.

Lucrările solului. Arătura se face cu plugul în agregat cu grapa, după eliberarea terenului de către planta premergătoare. Patul germinativ se pregătește în prezua sămânțului, urmându-se să se realizeze un teren nivelat și bine mărunțit.

Sămânța și sămânțul. Sămânța trebuie să fie proaspătă, mare, cu puritatea de 95 % (minimum 90 %) și germinația de 50 % (minimum 40 %). Semințele pierd repede facultatea germinativă, de aceea se însămânțează imediat după recoltare (tabelele 4.14.5.4., după D. Lazurca, 1996).

Angelica se înmulțește prin sămânță, culturile putându-se realiza prin semănat direct în câmp sau prin răsad, după cum rezultă din datele prezentate în tabelul 4.14.5.5. (după Laza și Heltnann, citat de A. Mihalcea, 1986).

Tabelul 4.14.5.4.

Influența duratei de păstrare asupra germinăției semințelor de *Angelica archangelica* L.

Variantă	Nr. semințe germinate din 100	d	%	Semnificația
Imediat după recoltare (mt)	72,9	-	100	-
La 6 luni de la recoltare	62,8	-10,1	86	000
La 12 luni de la recoltare	36	-36,9	49	000
La 18 luni de la recoltare	12,4	-60,5	17	000

DL 5 % = 6,165, DL 1 % = 9,764, DL 0,1 % = 17,576

Semănatul direct în câmp se face toamna, la sfârșitul lunii august sau începutul lui septembrie (în zone subumede, în octombrie), cu semănători universale, asigurând densitatea de 5 - 6 plante/m².

În condițiile de la Cluj-Napoca, rezultate mai bune s-au obținut în cazul când semănatul s-a făcut în octombrie, urmat de cel în august și martie (tabelul 4.14.5.6., după L.S. Muntean și colab. 1993).

Distanța dintre rânduri este de 60 cm, adâncimea de semănat de 2 - 3 cm, iar cantitatea de sămânță de 10 - 12 kg/ha (semințe recoltate în același an) (A. Mihalea, 1986, D. Lăzurca, 1996).

Tabelul 4.14.5.5.

Influența modului de înmulțire asupra producției de rădăcini la *angelica*

Variante privind modul de înmulțire	Producția de rădăcini uscate		
	q/ha	d	%
Semănat direct în august	17,3	10,4	250,7
Semănat în strat rece în august, transplantat în octombrie	19,4	12,5	281,1
Semănat în pat semicald, transplantat în mai	6,9	-	100

DL 5 % = 2,3 q/ha DL 1 % = 4,1 q/ha DL 0,1 % = 7,5 q/ha

Tabelul 4.14.5.6.

Producția de rădăcini uscate la *Angelica archangelica* L., în funcție de perioada de semănat la Cluj-Napoca

Variantă	Producția de rădăcini uscate		Diferența (q/ha)	Semnif.
	q/ha	%		
Semănat în august	15,09	99,1	-0,14	-
Semănat în octombrie	19,69	129,3	4,46	x
Semănat în martie	10,89	71,5	-4,34	0
Media (Mt)	15,23	100	-	-

DL 5 % = 3,8 1 % = 6,29 0,1 % = 11,78

Notă: Toate variantele s-au semănat la 70 cm între rânduri și 15 cm între plante pe rând (9,5 plante/m²)

Înmulțirea prin răsad. Producerea răsadului se face în straturi reci semănat în august (circa 200 m² pentru un ha) sau în seră, în ghivece nutritive. Plantarea în câmp se face în octombrie (răsadul produs în straturi reci - semănat în august), sau primăvara (aprilie, răsadul produs în seră sau în răsadniță), la distanța de 60 cm în rânduri

și 30 cm pe rând (A. Mihalea, 1986, D. Lăzurca, 1996), la 70/15 cm (L.S. Muntean și colab., 1993) sau 50/20 cm (D. Vârban și colab., 2005).

Rezultatele cercetărilor privind perioada de semănat (plantat) și spațiul de nutriție la *Angelica archangelica* L. în condițiile pedoclimatice de la Cluj-Napoca se prezintă în tabelul 4.14.5.7. (după L.S. Muntean și colab. 1991 și 1993). Se constată că cele mai ridicate producții de rădăcini s-au înregistrat la variantele semănate la 1 octombrie, urmate de variantele semănate și plantate primăvara (1 aprilie). Au avut producții mai scăzute variantele semănate în 15 august, datorită perioadelor de secetă intervenite după semănat în condițiile climatului de la Cluj-Napoca. Cele mai ridicate producții s-au înregistrat la variantele cu 9,5 pl/m² (95,2 mii pl/ha), urmate de cele cu 5,7 pl/m² și 4,1 pl/m². Conținutul de ulei volatil s-a situat între 0,38 - 0,54 ml/100 g în anul 1997, între 0,4 - 0,6 ml/100 g în anul 1988 și între 0,36 - 0,54/100 ml în anul 1989. Rădăcinile cu diametrul sub 1 cm au conținutul de ulei mai mare (0,52 - 0,86 ml/100 g), față de rădăcinile cu diametrul peste 1 cm diametru (0,38 - 0,46 ml/100 g) (L.S. Muntean și colab., 1991).

Tabelul 4.14.5.7.

Producția medie de rădăcini uscate la *Angelica archangelica* L. în condițiile de la Cluj-Napoca, în funcție de perioada de semănat (plantat) și spațiul de nutriție

Var.	Semănat Plantat	Data	Distanța (cm)		Mii pl/ha	Producția medie pe 3 ani			
			Între rânduri	Pe rând		q/ha	%	Dif. Semnif.	
1.	Semănat	15 august	70	15	95,2	7,6	68,2	-3,6	
2.	- II -	- II -	70	25	57,2	6,8	60,7	-4,4	
3.	- II -	- II -	70	35	40,8	6,5	58,3	-4,7	
4.	Semănat	1 octombrie	70	15	95,2	19,1	171,4	7,9	
5.	- II -	- II -	70	25	57,2	17,8	158,9	6,6	
6.	- II -	- II -	70	35	40,8	16,9	150,7	5,7	
7.	Semănat	1 aprilie	70	15	95,2	13,7	122,8	2,5	
8.	- II -	- II -	70	25	57,2	10,9	87,2	-0,3	
9.	- II -	- II -	70	35	40,8	9,9	88,8	-1,3	
10.	Plantat	1 aprilie	70	15	95,2	10,4	93,1	-0,8	
11.	- II -	- II -	70	25	57,2	7,4	66,1	-3,8	
12.	- II -	- II -	70	35	40,8	7,1	63,8	-4,1	
Mt	x					11,2	100	-	

DL 5 % = 5,9 ; DL 1 % = 8,04 ; DL 0,1 % = 10,8

DL 5 % = 5,9 ; DL 1 % = 8,04 ; DL 0,1 % = 10,8

Lucrările de îngrijire. Se fac prașile și pliviri pentru a menține solul curat de buruieni și afânat, iar culturile semănate se rădesc când plantele au 1 - 2 perechi de frunze adevărate la 20 - 25 cm între ele pe rând. Pentru combaterea buruienilor se pot folosi

erbicidele Aftalon (2 kg/ha), preemergent, iar pe vegetație erbicidele antigraninice Furore (2 l/ha) sau Fusilade (2 l/ha) (V. Nițu, 2000).

În loturile semincere în primul și în al doilea an de cultură se menține terenul curat de buruieni prin prașile și pliviri de câte ori este nevoie. În anul al doilea de cultură se face purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice sau bolnave.

Recoltarea. În condiții normale de vegetație, planta nu dezvoltă tulpini florifere în primul an de vegetație. Astfel se obțin rizomi groși, cărnoși, cu multe rădăcini lungi de 20 - 30 cm, groase de 2 - 7 mm și de calitate superioară. Recoltarea se face toamna, la sfârșitul primului an de vegetație (octombrie - noiembrie). Înainte de recoltare se cosesc rozetele de frunze și se scot din teren. Dislocarea rădăcinilor se face cu cazmaua, plugul fără corrană sau cu dislocatorul pentru sfeclă.

Loturile semincere se recoltează în anul al doilea de vegetație, în două etape (pentru a evita scuturarea): întâi se recoltează umbela principală, prin scuturarea în coșuri mici sau în vase din material plastic; urmând ca după câteva zile, la începutul maturității celorlalte umbelae să se taie cu secera întreaga inflorescență, care după finalizarea maturizării se treieră staționar cu batoza sau combina (A. Mihalcea, 1986).

Condiționarea. După ce se scot rădăcinile se face decoletatul și fasonatul, înlăturând toate părțile aeriene ale plantei și vârfurile rădăcinilor mai subțiri decât 2 mm. În cazuri rare intervine și necesitatea spălării produsului, deoarece solurile în care se cultivă angelica fiind mai nisipoase, se detașează ușor prin curățire.

Uscarea produsului se poate face pe cale naturală la soare, iar pe timp nefavorabil, în poduri bine aerisite sau încăperi încălzite. La uscarea artificială, temperatura nu trebuie să depășească 35 - 40 °C. Randalmentul la uscare este de cca. 4 - 5 : 1.

Condițiile de recepție prevăd ca produsul să fie format din rizomi și rădăcini, iar impuritățile: maximum 2 % rizomi cu resturi de tulpini și frunze, maximum 1 % sfărâmături mici. Corpuri străine organice, maximum 1 %, iar cele minerale, maximum 1 %. Umiditatea maximă 14 %.

Producția la angelica este de 1500 - 2500 kg/ha rizomi și rădăcini în stare uscată.

Producția de fructe la angelica este de 1000 - 1400 kg/ha.

4.14.6. SPECII DE ANMI

(*Anmni visnaga* (L.) Lam. și *Anmni majus* L.)

Fr: Khella; E: Toothpick annmi; G: Khella

Fr: Ammi élève; E: Queen Anne's lace; G: Grober annmei

4.14.6.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Anmni visnaga (L.) Lam. (numită în limba spaniolă "visnaga", iar în egipteană "khella", "kela") și *Anmni majus* L. au fost cunoscute încă din antichitate și utilizate ca remediu mai ales în Egipt. Au fost introduse ulterior în cultură și în alte țări din Europa, Asia, Africa și America, între care și țara noastră (F. Crăciun și colab., 1976, V. Cucu și colab., 1982 etc.).

Materia primă și compoziția chimică. De la ambele specii se folosesc fructele: "*Anmni visnagae fructus*" ("*Visnagae fructus*"), respectiv "*Anmni majus fructus*".

Anmni visnagae fructus conține ca și principali componente farmacologic activi furanocromone (compuși cu răspândire foarte limitată în regnul vegetal), dintre care mai importantă este kela (chelina, visanina) (0,3 - 2,3 % p.u.) însoțită de visangină (visnagidină) (0,1 - 0,72 %), cheloglucozidă (chelimină) (0,3 %), lipsită de acțiune spasmolitică, care prin hidroliză acidă se scindează în chelol și glucoză, aniol, chelinol, visaminol și produși de hidroliză și descompunere (visnaginonă, chelinonă, asacetină). Un alt grup de compuși activi, îl constituie derivații cumarinici (cumarinele) (0,23 - 2 %) cu structura de bază a visnaganului (visnadina, samidina, dihidrosamidina) numite și dihidroseseline (V. Cucu și colab. 1982, V. Grigorescu și colab. 2001 etc.). Între alți compuși: glucidele, protide, lipide (18 - 20 %) (ac.oleic, linoleic, palmitic etc.), substanțe minerale, etc. F. Crăciun și colab. 1976, arată că studiile fitochimice efectuate în țara noastră, arată că nu sunt diferențe cantitative în ceea ce privește natura furanocromonelor din fructe față de țara de origine (în fructele de proveniență românească s-au identificat kela, visangina și keloglucozidul).

Anmni majus fructus conține furanocumarine circa 1 % (până la 1,57 - 2,33 %), care sunt derivați de psoralen (având la bază structura psoralenului), între care: xantotoxina (amoidina) (0,08 - 1,5 %), cea mai activă farmacologic, bergaptenul (majudina) (0,04 - 0,3 %), imperatorina (amidina) (0,71 - 0,8 %), marmesina (circa 0,08 %). Între

alți compuși amintim: protide, lipide, tanoizi, oleo-rezine, mucilagii, săruri minerale etc. (V. Cucu și colab., 1982, V. Grigorescu și colab. 2001 etc.).


Utilizări. Furanocromonele (din *Ammi visnaga fructus*) au acțiune spasmolitică asupra fibrelor musculaturii netede (intestinale, uterine, uretrale, bronhiale etc.), precum și pe musculatura netedă vasculară și pe vasele coronariene. Kelina (fiind toxică se folosește sub forma derivaților săi de semisinteză), are utilizare în tratamentul anginei pectorale de origine coronariană, în infarctul miocardic, astmul bronșic, în obstetrică, în litiaza urinară și biliară etc. Visnagina este mai bine tolerată și mai puțin toxică decât kelinea, iar acțiunea coronarodilatatoare a visnadinei este mai intensă decât a kelinei.

Furanocumarinele (furocumarinele) (din *Ammi majus fructus*), în special xantoxina și majudina, au proprietăți fotosensibilizatoare ale pielii (în procesele de depigmentare a pielii). Deoarece rezultatele cu produsele pe baza acestor principii active sunt nesigure (putând provoca diverse tulburări), utilizarea lor este redusă sau se folosesc sub o strictă supraveghere medicală.

Răspândire. Aceste specii din genul *Ammi* cresc spontan în bazinul mediteraneean și Orientul Apropiat. Unii autori menționează că sunt origine din Egipt (F. Crăciun și colab. 1976). În alte lucrări se arată că *A. visnaga* este spontană în regiunea dintre Insulele Canare și Golful Persic, de latitudine mediteraneană, iar *A. majus* își are originea în zona mediteraneană, îndeosebi în Spania și Sicilia, însă este întâlnită și în țările din Nordul Africii (E. Grigorescu și colab., 2001). *E. visnaga* a fost utilizată din antichitate în Egipt, este cultivată îndeosebi în Egipt, Maroc, Japonia, SUA (E. Grigorescu și colab. 2001) și introdusă în cultură și în alte țări: Germania, Rusia, Cehia, Slovacia, Polonia, România, Mexic, Chile, Argentina, India (V. Cucu și colab., 1982). În țara noastră aceste specii sunt recomandate în cultură în zona de câmpie din sudul și vestul țării (F. Crăciun și colab. 1976).

Sistematică. Soluri. Speciile cultivate sunt: *Ammi visnaga* (L) Lam. și *Ammi majus* L. (fig. 4.14.6. și 4.14.6.a.). În cultură sunt diferite proveniențe din ambele specii.

Particularități biologice. Specii ierboase, erbacee, bianuale, cultivate ca anuale. Rădăcina este pivotantă. Tulpina crește până la 1 m înălțime, ramificată. Frunzele au teacă evidentă, brună, iar limbul de trei ori penat sectat, cu segmente filiforme. Florile sunt dispuse în umbel compuse, compacte, semisferice, cu până la 100 de umbel, involuclu dezvoltat, flori pe tipul 5, albe, cu sepal și petale libere.

Fig. 4.14.6. Specii de *Ammi*

Fructe diachene, formate din două mericarpe oval alungite, glabre și netede. La *A. visnaga* cele două mericarpe sunt deobicei separate, plate, de 1,8 - 2 mm lungime, 0,8 - 1,2 lățime și 0,6 - 1 mm grosime, cu cinci coaste puțin evidente, culoarea brună - cenușie miros, slab aromatic și gust neplăcut (slab amar). La *A. majus* fructele sunt așezănătoare ca dimensiuni (deosebite microscopic sau fizico - chimic), sunt lipsite de miros, iar gustul este dezagreabil, ușor amar. Înfloresc în iunie - august.

Cerințe față de climă și sol. Ambele specii fiind de origine sudică, au cerințe termice ridicate și pretend lumină directă în cursul perioadei de vegetație (mai pretențioasă este *A. visnaga* decât *A. majus*). Pretind, de asemenea, umiditate suficientă și răspund favorabil la irigare până la înflorire, ulterior cerințele față de apă sunt mai reduse. Reușesc pe soluri fertile, cu textură mijlocie, bogate în humus, de tipul cernoziomurilor.

Zonare. Ambele specii sunt zonate în Câmpia Bărăganului, Câmpia Burnazului, sudul Câmpiei Olteniei și Câmpia de Vest (jud. Timiș) (F. Crăciun și colab., 1976).

4.14.6.1. Tehnologia de cultivare

Rotația. Speciile de *Ammi* se cultivă după cereale sau prașitoare anuale timpurii, bine întreținute (curate de buruieni). Pe același teren pot reveni după 3 - 4 ani.

Pentru producerea materialului de înmulțire, se aleg parcelele cu plante tipice și sănătoase.

Fertilizarea. Se aplică îngrășăminte chimice, în doze de P_{45-50} și K_{25-30} (toamna, sub arătură), iar N_{30-40} (primăvara). Gunoiul de grajd nu se aplică direct, ci plantei premergătoare (circa 25 t/ha).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 25 - 28 cm adâncime, în agregat cu grapa stelată. Patul germinativ se pregătește înaintea semănării cu combinatorul, în condiții optime.

Sămânța și semănatul. Se folosește sămânță cu valoare biologică și culturală ridicată. Semănatul se poate face primăvara devreme (până în 15 martie), în sudul țării și toamna târziu (noiembrie), cu mașini universale (SUP-21), la 50 cm între rânduri, 1,5 cm adâncime, folosind circa 8 kg sămânță la ha, în amestec cu material inert (cenușă sau nisip de trei ori volumul seminței) (F. Crăciun și colab. 1976).

Lucrările de îngrijire. Plantele răsar în luna aprilie și formează o rozetă de frunze (după 15 zile), apoi tulpinile florale (după 50 de zile), după circa 70 de zile plantele sunt în plină dezvoltare și după încă o lună ajung la maturitate. În cursul vegetației se efectuează 2 - 3 prașile mecanice între rânduri și pliviri pe rond. Răritul se face când plantele au 6 - 8 cm, lăsându-se 15 - 25 cm între plante pe rând.

În culturile semincere se face purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. Recoltarea se face cu combina sau manual (cu secera), când circa 60 % din umbеле au ajuns la maturitate.

Culturile semincere se recoltează manual, cu secera, se treieră și se păstrează separat.

Condiționarea. După recoltare, în primele 2 - 3 zile, produsul se lopsăcăză sau se vântură în curent puternic de aer. Pentru păstrare trebuie să aibă umiditatea de maximum 12 %.

Condițiile tehnice de recepție prevăd ca produsul să aibă max. 2 % impurități (alte părți din plantă), corpuri străine organice și minerale - max. 1 % (pentru fiecare), iar umiditatea - max. 12 %.

Producția. După cum arată F. Crăciun și colab. 1976, în condițiile țării noastre, producția de fructe selectate la ha este de circa 1000 kg.

4.15. FAMILLIA PRIMULACEAE

4.15.1. CIUBOTICA CUCULUI (*Primula officinalis* (L.) Hill.)

Fr: Primevère; E: Primrose; G: Schlüsselblume

4.15.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Ciuboica cucului se recoltează din flora spontană a țării noastre, însă fiind o specie pe cale de dispariție, ca urmare a recoltării neraționale, se impune cultivarea acesteia în zonele de creștere naturală a plantei (F. Crăciun și colab. 1977, E. Păun, 1995).

Materia primă și compoziția chimică. De la această plantă se utilizează rizomul cu rădăcini (*Primulae rhizoma cum radicibus*), precum și florile (*Primulae flos*) și frunzele (*Primulae folium*). Rădăcinile de ciuboica cucului conțin 5 - 10 % saponine triterpenice (primulina, acidul primulic A și alte saponine), heterozide (primverozida, primulaverozida), ulei volatili (0,1 - 0,25 %), substanțe amidonase, enzime etc. Florile de ciuboica cucului conțin saponine și flavone etc. Frunzele plantei conțin acid ascorbic (vitamina C) (până la 5 %), β -caroten etc. (F. Crăciun și colab., 1977, E. Grigorescu și colab., 2001, M. Tănăs și colab., 2005 etc.).

Utilizări. Principiile active (saponinele etc.) conferă produsului (rizomului și rădăcinilor, dar și florilor) acțiune expectorantă, fluidifiant al secrețiilor bronșice, antimicrobiană, antinevrotică. Rizomii și rădăcinile intră în compoziția **Ceaiului antibronșic nr. 2**. Florile se folosesc în **Ceaiul pectoral nr. 2**. Extractul fluid și tinctura intră în diferite prescripții magistrale. Frunzele sunt utilizate ca vitaminizante (având conținut ridicat în vitamina C).

Răspândirea. Ciuboica cucului crește spontan în Europa centrală și în Asia, în zona de deal și de munte (din zona forestieră până în cea a pajistilor alpine, până la circa 2000 m altitudine). În țara noastră se întâlnește în poieni și pășuni din zona de deal și de munte.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Primula officinalis* (L.) Hill (sin. *Primula veris* L.) (fig. 4.15.1. după Flora României, vol. VII, 1960 și 4.15.1.a., original), care are mai multe subspecii, respectiv varietăți.

Din flora spontană alături de *Primula officinalis* (L.) Hill. se recoltează și *Primula elatior* (L.) Grufb, numită și țâța vacii; ambele furnizând produsul oficial (*Primulae rhizoma cum radicebus*), menționat în *Farmacopeea Română*.

În culturi se pot folosi diferite populații locale din *Primula officinalis* (L.) Hill., productive și cu conținut ridicat în principii active.

Particularități biologice. Ciuboșica cucului este planta ierboasă, perenă. Partea subterană este formată din rizom cilindric de până la 10 cm lungime și de 0,5 cm grosime, cu numeroase rădăcini, de până la 15 cm lungime, subțiri, albe - gălbui (la *P. officinalis*) și brune - roșcat (la *P. elatior*). Tulpina aeriană este cilindrică înaltă de 15 - 30 cm, erectă, păroasă (catifelată), fără frunze, terminată cu inflorescență. Frunzele dispuse în rozeta bazală, sunt ovate cu marginea crenată sau undulată, lungi de până la 15 cm și late de 5 cm, cu nervuri proeminente pe fața inferioară, de culoare verde pe fața superioară și verde cenușiu pe cea inferioară datorită perilor (la *P. elatior* perii se găsesc adesea numai pe nervuri), iar petiolul este lung și aripat. Florile sunt dispuse în umbel, câte 6 - 18 la un loc, sunt pe tipul 5, caliciul persistent, corola gamopetală, galben - auriu (*P. officinalis*), respectiv galben - sulfuriu (*P. elatior*). Fructul este o capsulă elipsoidală, lungă de 6 - 10 mm, cu caliciul persistent. Înfloreste în aprilie - mai (*P. elatior* este mai precoce - începe înfloritul de la sfârșitul lunii martie).

Organe subterane de la ciuboșica cucului se pot confunda cu rădăcinile de *Cynanchum vinecetoxicum* (L.) Pers. (iarba fiarelor), toxică, sau *Eupatorium cannabinum* L. (cânepa codrului) etc. Acestea se pot deosebi, punând pe secțiunea rădăcinii o picătură de acid sulfuric concentrat care la speciile de *Primula* dă o culoare roz, iar la celelalte specii menționate se formează o colorație brun - închis - violet.

Cerințe față de climă și sol. Ciuboșica cucului se dezvoltă bine în terenuri însozite, suportă temperaturile scăzute din timpul iernii și este o plantă iubitoare de umiditate atât în sol cât și în atmosferă. Față de sol nu are cerințe deosebite, valorificând și solurile pietroase sau cele nisipoase. În cultură se poate amplasa pe soluri aluvionare, ușoare, nisipo - lutoase. Rezultate bune se obțin pe soluri profunde și fertile.

Zonare. Se recomandă amplasarea culturii în zonele de răspândire naturală, în condițiile pedoclimatice arătate (pe soluri




Fig. 4.15.1. *Primula officinalis* (L.) Hill.

uşoare şi mijlocii, aluvionare, fertile şi cu condiţii de umiditate suficientă).

4.15.2. Tehnologia de cultivare

Rotaţia. Ciuboïica cucului se plasează în afara asolamentului, cultura durând trei ani. Se cultivă după plante care lasă terenul curat de buruieni (fără specii perene). Dă rezultate bune după cereale sau plante tehnice, bine întreţinute şi fertilizate. Pe acelaşi teren poate reveni numai după 5 - 6 ani.

Fertilizare. La înfiinţarea culturii, se aplică îngrăşăminte chimice în doză de P_{30-40} şi K_{30-40} (toamna, sub arătură) şi N_{50-70} (primăvara, la pregătirea termenului pentru plantare). În anii doi şi trei de cultură, se aplică anual aceleaşi doze de îngrăşăminte, ca la înfiinţarea culturii.

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 28 - 30 cm adâncime. Până la plantare, terenul se menţine curat de buruieni, prin discuire sau lucrări cu cultivatorul.

Înmulţirea. Ciuboïica cucului se poate înmulţi atât pe cale generativă, prin seminţe (deoarece seminţul direct în câmp este riscant, datorită pericolului de îmburuienare, se produce răsăd), sau pe cale vegetativă (prin rizomi cu rădăcini) (F. Crăciun şi colab., 1977, E. Păun, 1995).

Înmulţirea prin răsăd. Sămânţa pentru producerea răsădului trebuie să aibă puritate de 96 % şi germinaţia la 70 %. Răsădul pentru un ha se produce în răsădniţe calde (pe circa 60 - 80 m²) sau staturi reci (120 - 150 m²), folosind 0,3 - 0,4 kg sămânţă. În răsădniţe calde seminţul se face în februarie, iar în staturi reci sub iarnă, la adâncimea de 0,2 - 0,5 cm, pe un sol în prealabil tasat. După 45 - 50 zile de vegetaţie, când răsădul are 4 - 5 frunze adevărate este bun pentru plantat. Plantarea răsădului se face primăvara, la sfârşitul lunii martie până în prima decadă a lunii aprilie, la 50 cm între rânduri şi 20 cm între plante pe rând.

Înmulţirea pe cale vegetativă. Pentru plantare se folosesc rizomi cu rădăcini, recoltaţi primăvara şi fasonaţi, să aibă fiecare segment 3 - 4 fire de rădăcini şi 2 - 3 muguri. Plantarea se face la sfârşitul lunii martie-începutul lunii aprilie, la 50 cm între rânduri, 20 - 25 cm pe rând şi 5 - 7 cm adâncime. La ha se folosesc circa 500 - 600 kg rizomi fasonaţi.

Lucrările de îngrijire. În toţi anii de vegetaţie, se aplică îngrăşăminte în dozele amintite şi se menţine terenul curat de buruieni, prin praşile şi pliviri ori de câte ori este nevoie. În primul an

se fac obişnuit trei praşile (prima după plantare) şi un plivit, iar în anii doi şi trei praşile mecanice între rânduri şi una manuală pe rând.

Recoltare. Florile se recoltează în anii doi şi trei de cultură, în momentul când sunt deschise, pe timp frumos (aprilie - mai), cu tot calicul, prin ciupire cu mâna sau cu un pieptene special, apoi se aşează în coşuri (fără să se îndese).

Rizomii cu rădăcini se recoltează în anul al treilea de cultură, toamna, pe timp frumos, cu sapa sau cazmana (pe suprafeţe mici), cu plugul fără cormană, sau cu maşini de recolat cartofi (pe suprafeţe mari).

Condiţionarea. Florile se separă de impurităţi (pedunculi etc.), apoi se usucă în strat subţire la umbră, în locuri bine aerate şi uscate, sau pe cale artificială la 35 - 40 °C. Randamentul la uscare este de 6 - 7:1.

Rizomii cu rădăcini, după recoltare, se scutură de pământ şi se curăţă de părţile aeriene, se spală rapid într-un curent de apă (pentru a nu pierde principii active - a nu dizolva saponinele), apoi se zvântă şi se usucă, pe cale naturală, la soare (pe timp nefavorabil în încăperi bine aerate) sau artificial la 40 - 50 °C. Randamentul la uscare este de 3 - 4:1.

Condiţii tehnice de recepţie. Pentru flori se prevede să aibă culoarea galbenă - aurie (după uscare) şi se admit flori decolorate - max. 3 %, resturi de pedunculi - max 1 %, corpuri străine organice - max. 1 %, cele minerale - max. 0,25 %, iar umiditatea - max. 12 %.

Pentru rizomi şi rădăcini se admit: rizomi cu resturi de tulpini - max. 4 %, rizomi sau rădăcini înnegrite - max. 3 %, corpuri străine organice - max. 1 % şi minerale - max. 4 %, iar umiditatea - max. 13 %.

Producţia. După F. Crăciun şi colab. 1977, la un hectar de ciuboïica cucului se obţin: 350 - 600 kg flori în stare deshidratată, iar producţia de rădăcini cu rizomi, în stare deshidratată, este de 700 - 900 kg.

Observaţie. Din flora spontană, florile se recoltează în aprilie - mai numai de la *P. officinalis* (cu tot calicul). Rizomii şi rădăcinile se recoltează de la ambele specii (*P. officinalis* şi *P. elatior*) primăvara, odată cu florile (se pot recolta de la apariţia rozetei bazale, până la formarea fructelor, care pot contribui la menţinerea bazinelor, deoarece partea subterană îşi menţine conţinutul în principii active în momentul fructificării). Modul de recoltare, condiţionare şi condiţiile tehnice de recepţie a produsului (rizomi şi rădăcini sau flori) sunt similare cu cele prezentate la forma cultivată.

4.16. Familia BORAGINACEAE

4.16.1. TĂTĂNEASA (*Symphytum officinale* L.)

Fr: Grande consoude; E: Comfrey;
G: Schwarwurz, Grosse Wallwurz

4.16.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Materia primă și compoziția chimică. Tătăneasa se cultivă pentru partea subterană (rizomi și rădăcini - *Symphyti radix*; *Consolidae majoris radix*). Se pot folosi ca materie primă și vârfurile tulpinale, cu ramuri și frunze (*Symphyti herba*).

Rizomul și rădăcina au un conținut de 0,6 - 0,8 % alantoină, consolidină, mucilagii, tanin (4 - 6 %), triterpene, steroli, saponozide, amidon, asparagină și alți aminoacizi (E. Păun, 1995, P.R. Cheeke, 1998, V. Istudor, 2005). Herba conține simfito - cinoglosină, consolidină, ulei volatil, mucilagii, colină etc. (E. Crăciun și colab., 1977).

Principiile active în organele subterane, la soiul de tătăneasă introdus în cultură (Corina) sunt de: 3,86 % mucilagii și 0,56 % polifenoli totali (Al. Volcov și colab., 2005).

Utilizări. Principiile active de tătăneasă au efect hemostatic, fiind utilizate în trecut în tratamentul plăgilor, în afecțiuni stomacale etc. Extractele din această plantă și-au dovedit acțiunea cicatrizantă. Alantoina extrasă din tătăneasă și din alte plante are acțiune antiinflamatoare. În țara noastră, produsul vegetal de tătăneasă intră în componența **Ceaiului de tătăneasă**. Extractele din *Symphyti radix* intră în produsele **Galor G.** (comprimate - administrate în gastrite) și **Tarbedol** (granule, administrate în dispepsii, colecistopatii funcționale, pancreatopatii cronice). Produsul vegetal și extractele din acesta se folosesc în diferite forme farmaceutice. Produsele **Kyttasalbe**, **Kitta-Plasma** etc. sunt foarte cunoscute în Europa Occidentală. Extractele de *Symphyti radix* (care conțin alantoină) și alantoina (în stare pură) intră în componența unor produse cosmetice (cu efect regenerativ dermic) (U. Stănescu și colab., 2004).

Symphyti herba se utilizează și ca sursă pentru extragerea carotenoidelor (M. Tămaș, 2005).

Răspândire. *S. officinalis* L. este originară din Europa, de unde s-a extins și în alte zone de pe glob. Produsul vegetal este furnizat în special de Bulgaria, Polonia, România, Ungaria, urmate de Anglia și SUA.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Symphytum officinale* L. (fig. 4.16.1., după Flora României, vol VI, 1958 și 4.16.1.a., original). Din specia *S. officinale* L. se cultivă populații locale. În anul 2003 s-a introdus în cultură soiul Corina, cu perioadă de vegetație de 209 - 228 zile, rezistent la ger și secetă. În tabelul 4.16.1.1. (după Al. Volcov și colab., 2005) se prezintă producția și calitatea soiului Corina, comparativ cu populația locală.

Tabelul 4.16.1.1.
Producția și calitatea soiului Corina (*Symphytum officinale* L.),
comparativ cu populația locală.

Soiul (populația)	Producția (organe subterane)		Mucilagii crude		Polifenoli totali	
	kg/ha	% față de populația locală	Conținut în %	% față de populația locală	Conținut în %	% față de populația locală
Soiul Corina	15773	118,8	3,86	109	0,5583	107,11
Populația locală	13277	100	3,54	100	0,5212	100

Particularități biologice. Tătăneasa (*Symphytum officinale* L.) este o plantă ierboasă, perenă, cu un rizom scurt de pe care pornesc rădăcini, tulpină de până la 1,2 m, erectă, păroasă, frunze dispuse altern, păroase, florile grupate în cime, cu 5 - 10 flori cu corola tubulară (1,5 cm lungime), roșie - violacee; fructele nucule de 4 - 5 mm grupate câte 4 în caliciu persistent.

Cerințe față de climă și sol. Valorifică soluri grele, improprii altor culturi, cu apă stagnantă. Crește pe un areal larg, din zona de câmpie până în zona premontană. Este frecventă la marginea apelor, însă apare și ca buruiiană în culturi.

Zonare. Se recomandă cultivarea plantei în arealul de răspândire naturală, în zona de câmpie și de silvostepă a țării.

4.16.1.2. Tehnologia de cultivare

rotația. Tătăneasa se cultivă după plante care lasă terenul curat de buruieni, în afara asolamentului, pe același teren putând reveni după 4 - 6 ani.

Fig. 4.16.1. *Symphytum officinale* L.

Fertilizarea. La înființarea culturii se încorporează 25 - 30 t/ha gunoi de grajd (sub arătură adâncă). În funcție de fertilitatea solului se aplică anual doze de 40 - 60 kg/ha P_2O_5 și 30 - 40 kg/ha K_2O (toamna) și 60 - 70 kg/ha N (primăvara).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 28 - 30 cm adâncime și se menține curată de buruieni până la plantare, prin lucrări cu discul în agregat cu grapa cu colți.

Plantarea. Cultura de tătâneasă se realizează prin plantarea de butași. Se folosesc butași din rădăcini cu trei ochi, plantați toamna în rigole, la 70 cm între rânduri și 30 cm pe rând (cca. 5 pl/m²) (A. Volcov, 2003).

Lucrările de îngrijire. Constatu în prașile și pliviri ori de câte ori este nevoie, pentru a menține solul curat de buruieni și afănat.

Recoltarea. Organele subterane se recoltează în anul al treilea de vegetație, la începutul lunii septembrie, cu plugul cu o cormănă, sau cu dislocatorul. Dacă se solicită, herba se recoltează la înflorire

Condiționarea. Rizomii și rădăcinile se curăță de impurități și se spală (dacă este cazul), iar porțiunile groase se despică, apoi se usucă pe cale naturală sau artificial la 40 - 50 °C.

Herba se usucă la 35 - 40 °C.

Randamentul la uscare este de 3 - 5:1 (la organele subterane) și de 7 - 8:1 (la partea aeriană).

Producția de organe subterane în stare proaspătă la tătâneasă este de 10 - 15 t/ha.

4.17. Familia SOLANACEAE

4.17.1. MĂTRĂGUNA (*Atropa belladonna* L.)

Fr: Belladone; E: Banewort, Belladonna, Deadly nighthade;
G: Tollkirsche

4.17.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Mătrăguna este cunoscută din antichitate, fiind amintită de Theophrast (sec. III î.e.n.), care o numește "*mandragona*", denumire populară astăzi la italieni (V. Velican, 1965). Numele genului a fost inspirat din mitologia grecilor, după numele zeiței destinului - Atropos - una din cele 3 Parce, care tăia firul vieții (E. Ghișa, 1960) A = negație și *tropēin* = întoarcere, semnifică puterea otrăvitoare. Este folosită în medicina oficială de prin secolul al XVII-lea. Studiul și izolarea atropinei s-a făcut în anul 1831 (H.P. Dörfler și G. Roselt, 1984). Este o plantă toxică pentru majoritatea animalelor. Iepurii se hrănesc cu frunze de *Atropa belladonna* L. și nu fac intoxicații (V. Istudor, 2005).

Materia primă și compoziția chimică. Planta se cultivă pentru frunze (*Belladonnae folium*) și rădăcini (*Belladonnae radix*). Uneori se recoltează întreaga parte aeriană a plantei (*Belladonnae herba*).

Materia primă conține în principal alcaloizi tropanici, în partea aeriană în proporție de 0,13 - 0,75 % la unele biotipuri ameliorate depășind 1 % (în frunze proaspete cca 0,071 %), iar în rădăcină între 0,37 - 1,04 % (V. Cucu și colab., 1982, M. Tămaș și colab., 2005, etc.). Compoziția chimică în diferite organe este influențată și de condițiile ecologice (altitudine etc.) (M. Jacob și colab., 1975, G. Rothe și colab., 2003 etc.). M. Constantin, 1965, arată că forma de mătrăgună cu antocian (var. *nigra*) are un procent mai mic de alcaloizi decât forma fără antocian (var. *lutea*). În partea aeriană proaspătă, hiosciamina reprezintă 78 - 98 % din alcaloizii totali. Prin uscarea frunzelor, o parte din hiosciamină se transformă în atropină. Se mai găsește scopolamină (1,7 - 21,4 % din alcaloizii totali), atropamină (apokatropină), beladonină. Alături de alcaloizii tropanici, în herba se întâlnesc unele baze ușor volatile (piridină), aminoacizi liberi (acizii

cisteic, aspartic, glutamic, leucină, arginină, lizină, prolină, tirozină etc.), flavone, cumarine, săruri minerale etc. În rădăcină, hioscuamina reprezintă cca. 90 % din alcaloizi, urmată de scopolamină, beladonină, apokatropină, urme de atropină, aceleași baze volatile ca și în frunze, cumarine etc. Conținutul în alcaloizi al florilor este de 0,4 - 0,77 %, în fructe 0,6 - 0,76 %, iar în semințe 0,83 - 0,86 % (raportat la materialul uscat). Prin întreruperea înflorii și fructificării crește conținutul de alcaloizi în frunze (Z. Kisgyörgy și colab., 1971). Întreaga plantă este otrăvitoare, fapt de care trebuie ținut seama, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor. Pentru om, 10 - 20 fructe pot fi mortale (A. Radu și E. Andronescu, 1984). După *Farmacopeea Română*, rădăcinile (*Belladonnae radix*) trebuie să conțină minimum 0,45 % alcaloizi totali (exprimați în hiosciamină), iar frunzele (*Belladonnae folium*) trebuie să aibă un conținut de cel puțin 0,3 % alcaloizi totali (exprimați în hiosciamină).

Utilizări. Alcaloizii din această plantă au acțiune antispastică, excitantă asupra sistemului nervos central, accelerează ritmul cardiac, provoacă midriază (dilată pupila), dilată bronhiile, diminuează secrețiile și peristaltismul intestinal. Se recomandă în spasme ale musculaturii netede, enterocolite spastice, hipersecreții digestive și bronșice etc. Se folosește în scop terapeutic pulberea de frunze, extractele, tinctura și alcaloizii izolați. Intră în constituția numeroaselor produse farmaceutice românești: **Bergonal**, **Distonocalm**, **Foladon**, **Fobenal** etc. Pulberea de frunze se folosește în compoziția țigărilor antiastmatice. Atropina este componentă a produselor sulfat de atropină, **Lizadon** etc. În *Farmacopeea Română* figurează: *Extractum belladonnae siccum* (Extract uscat de beladonă) cu 1,5 % alcaloizi totali exprimați în hiosciamină; *Tinctura belladonnae* (Tinctură de beladonă) cu 0,03 % alcaloizi totali exprimați în hiosciamină; *Sirupus belladonnae* (Sirop de beladonă) care conține 5 g % tinctură de beladonă.

Răspândire. Mătrăguna este o plantă de origine eurasiatică. Crește spontan în zona pădurilor submontane și montane din Europa, Asia occidentală și de nord. La noi în țară crește mai ales în zona fagului, la marginea pădurilor, în lămușuri și tăieturi. Se cultivă în scop medicinal în multe țări europene: Franța, Belgia, Olanda, Marea Britanie, Rusia, Polonia, Ungaria, Bulgaria etc. Este cultivată de asemenea și în țara noastră pentru asigurarea necesarului de materie primă vegetală.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Atropa belladonna* L. (mătrăgună, cireașa lupului, doamna codrului) (fig. 4.17.1., după

G. Răcz și colab., 1970 și 4.17.1.a., original). *A. belladonna* L. are $2n = 50,72$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). În cadrul speciei se întâlnesc varietatea comună cu flori violet (*Atropa belladonna* L. var. *belladonna*) și varietatea cu flori și fructe galbene (*A. belladonna* L. var. *lutea* Doll., *A. belladonna* L. var. *flava* Pater, *A. acuminata* Royle). Dacă crește împreună, se întâlnesc forme intermediare (v. *intermedia*) între aceste două varietăți (V. Cucu și colab., 1982). În scop medicinal se mai folosesc și speciile: *A. caucasica* Kreyer (din Caucaz), *A. komarovii* Blin et Shalyt (din Turkmenia), *A. acuminata* Royle et Lindley (din India) (E. Coiciu și G. Răcz, 1962), *A. belladonna* L. se poate confunda cu unele specii din flora spontană, printre care: *Scopolia carniolica* Jacq (Mutitica), *Phytolacca* sp. (Cărnăz). După F. Crăciun și colab., 1977, acestea se pot deosebi prin însușirile prezentate în tabelul 4.17.1.1.




Fig. 4.17.1. *Atropa belladonna* L.:
a - rădăcina; b - părțile aeriene

Tabelul 4.17.1.1.

Deosebiri între speciile *Atropa belladonna* L.,
Scopolia carniolica Jacq. și *Phytolacca* sp.

Organul plantei	<i>Atropa belladonna</i> L.	<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.	<i>Phytolacca</i> sp.
Rizomul	Brun-deschis, neted	Brun-închis cu noduri și strânguturi	Pe suprafața rizomului cu pete albe-cinase lunguțice
Frunzele	La partea superioară câte două în un nod, din care una mai mare	Alterne pe totă tulpina	Dispuse numai alern
Florile	Mari și solitare; înfloresc în iulie-august; corola este brun-roșcată sau violacee la exterior și brun-gălbui cu vine violetice la interior	Înfloresc în martie-aprilie; corola este galben-verzatic	Mici, dispuse în ciorchine
Fructul	Cămos de tip bacă	Uscat de tip pixidă cu câpâcel	Bace violacee și în formă de strângure

Din specia *Atropa belladonna* L., la noi în țară se cultivă soiul local (populația) "De Vrancea", din anul 1975.

Particularități biologice. Mătrăguna este o plantă perenă. În sol se formează o rădăcină pivotantă în primul an, iar în următorii un rizom gros, brun deschis, de pe care pornesc rădăcinile. La suprafața solului, în primul an, se formează o singură tulpină, iar în anii următori, prin multiplicarea rizomului, apar mai multe tulpini (tuță viguroasă), erecte, ramificate, înalte, de 1 - 1,5 (2) m și groase până la 2 cm, cu muchii slab pronunțate. Frunzele bazale sunt alterne, cele superioare sunt dispuse câte două, din care una este mai mare. Frunzele sunt pețiolate, cu marginea limbului întreagă, de formă ovală până la eliptică, cu lungimea limbului de 8 - 12 (25) cm, iar lățimea de 4 - 8 (12) cm. Florile sunt solitare, la subsuara frunzelor, sunt mutante, prinse de un peduncul de 1 - 2 cm. Calicilul este de forma unei pâinii, divizate până la jumătate în 5 lacinii ovate, pubescente. Corola are 2,5 - 3,5 cm lungime, este tubuloasă, răsfântă, cu 5 lobi lat - ovați, de culoare brun - violetă până la brun roșiatică, spre interior brun - gălbui cu nervuri violetice. Androeul este format din 5 stamine concrescute cu corola.GINECEUL are stilul de culoare violetă, iar stigmaul verde. Înfloresc din iunie în august. Fructul este o bacă, de mărimea unei cireșe (diametrul 1,2 - 1,5 cm), verde la început, apoi la maturitate trece spre negru, cu calicilul persistent (de forma unei stele). Semințele sunt reniforme, de cca. 2 mm diametru, reticulate la suprafață. MMB este de cca. 1g.

Cerințele față de climă și sol. Mătrăguna este destul de pretențioasă față de temperatură, deși crește spontan în zona fagului. Răsăritrea are loc la cca. 5 °C. Temperaturi sub -3 °C sunt dăunătoare,

atât plantelor provenite din sămânță, cât și celor din anul doi sau trei de vegetație. În cursul vegetației sunt favorabile temperaturi de 25 - 30 °C, pentru creșterea plantelor și sinteza alcaloizilor. În timpul iernii, dacă plantele sunt acoperite de zăpadă, suportă temperaturi de până la -20 °C sau de scurtă durată până la -30 °C. În lipsa zăpezii, gerurile sub -10 °C nu sunt suportate de mătrăgună. Constanta termică este de peste 2000 °C. Lumina influențează favorabil sinteza alcaloizilor, însă în condiții de semiumbră, plantele cresc mai viguroase. Mătrăguna are cerințe ridicate și față de umiditate (E. Păun, 1995). Nu suportă însă locurile joase și prea umede. Ploile și roua în preajma recoltatului duc la diminuarea conținutului în alcaloizi, prin spălarea alcaloizilor, secretați la suprafața frunzei (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Preferă soluri fertile, structurate și afânate, cu conținut ridicat în humus și drenate cu apa freatică sub 2 m. Formarea alcaloizilor este favorizată la pH de 5,5 - 6. Solurile prea acide, grele și reci, precum și cele cu exces de umiditate sunt nefavorabile mătrăgunei.

Zonarea. Cultura mătrăgunei este zonată în județele Brașov, Mureș, Caraș - Severin, Vâlcea, Prahova, Neamț, Suceava, Vrancea etc. (F. Crăciun și colab., 1977). Se recomandă amplasarea culturilor în zonele submontane și depresii, în locuri adăpostite și însoțite (V. Mircioiu, 1982, A. Mihalea, 1986).

4.17.1.2. Tehnologia de cultivare

rotația. Mătrăguna este o plantă perenă, însă în culturile de producție se ține 2 ani, după care apar boli ce afectează rădăcina și duc la răirea plantațiilor și scăderea capacității de producție (A. Mihalea, 1986, E. Păun, 1995). Mătrăguna se amplasează după plante care eliberează terenul devreme. În zona ei de cultură o bună premărgătoare este orzoaica de primăvară (V. Mircioiu și colab., 1981), însă reușește bine și după borceag sau leguminoase pentru boabe. Pe același teren poate reveni numai după 5 - 6 ani.

Pentru producerea de semințe se alege parcelele cu plante tipice, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea se face cu 20 - 30 t/ha gunoi de grajd sau 120 - 160 kg/ha N, 60 - 80 kg/ha P₂O₅ și 80 - 90 kg/ha K₂O, aplicate 2/3 în anul I și 1/3 în anul doi de vegetație (V. Mircioiu, 1982, M.D. Bobiț, 2000).

După V. Mircioiu și colab. 1981, prezentăm influența fosforului și potasiului (tabelul 4.17.1.2.) și a azotului (tabelul 4.17.1.3.) asupra producției de herba la *Atropa belladonna* L. (media

anilor 1978 - 1980). Semnificative sunt sporurile la dozele de P₁₀₀ K₉₀ și la toate dozele de azot (între N₄₀- N₂₅₀)

Lucrările solului. Arătura se execută la 28 - 30 cm adâncime, după eliberarea terenului de către plantele premergătoare, când umiditatea solului permite efectuarea unei lucrări de calitate. Patul germinativ se pregătește cu combinatul sau cu discul în agregat cu grapa cu colți, urmat de o tăvălugire.

Sămânța și semănătul. Mătrăguna se poate înmulți prin semănat direct în câmp, prin răsad sau prin butași. Sămânța trebuie să aibă puritatea de 95 % (minimum 85 %), iar germinația de 80 % (minimum 70 %).

Semănatul direct în câmp se face toamna, cu semănători universale, asigurându-se densitatea de 25 - 30 plante/m², la 60 cm între rânduri și 1,5 - 2 cm adâncime, folosind 4 - 6 kg/ha sămânță (cu salată ca plantă indicatoare, circa 1,5 kg semințe) (V. Mircioiu, 1981; A. Mihalea, 1986).

Tabelul 4.17.1.2.
Influența fosforului și a potasiului asupra producției de herba proaspătă la *Atropa belladonna* L.

Agrofondul	Cultura din anul I			Cultura din anul II		
	q/ha	dif q/ha	%	Semnif.	q/ha	dif (q/ha) %
Neîngrășat	127,5	-	100		100,2	-
P ₂₀	126,8	-0,7	99		103,5	3,3
P ₄₀ K ₁₅	124,1	-3,4	97		108,3	8,1
P ₆₀ K ₁₅	122,4	-5,4	96		116,4	16,2
P ₈₀ K ₁₀	133,8	8,3	106		121,8	21,6
P ₁₀₀ K ₁₀	145,1	31,3	114	***	151,4	51,3
			DL 5% 12,2			22,3
			DL 1% 16,9			30,9
			DL 0,1% 23,3			42,7

Tabelul 4.17.1.3.
Influența azotului asupra producției de herba proaspătă la *Atropa belladonna* L., anul II

Variantă	Producția q/ha	Dif. q/ha	%	Semnif.
N ₀	67,4	-	100	
N ₁₀	96,5	29,1	143	***
N ₂₀	112,6	45,2	167	***
N ₃₀	125,7	58,3	186	***
N ₄₀	141,3	73,9	209	***
N ₅₀	158,1	90,7	234	***
		DL 5% 10,1		
		DL 1% 13,3		
		DL 0,1% 17,2		

Rezultatele obtinute la Măgurele - Braşov privind epoca de semănat la această plantă (media anilor 1978 - 1980), redată în tabelul 4.17.1.4., (după V. Mircioiu şi colab., 1981), evidenţiază superioritatea semănăturii măţăgunei la sfârşitul toamnei (20 octombrie - 10 noiembrie), faţă de cel de primăvară (marie - aprilie).

Se poate înmulţi şi prin răsad, produs în straturi reci (pentru un hectar, circa 200 m², cu 1 - 1,5 kg sămânţă), sau prin butaşi de rădăcină (de 18 - 20 cm) scoşi toamna şi înrădăcinaţi, urmând ca plantarea lor se facă toamna sau primăvara devreme, la 60 cm între rânduri şi 20 - 30 cm pe rând (F. Crăciun şi colab., 1977, A. Mihailea, 1986).

Tabelul 4.17.1.4.

Influența epocii de semănat asupra producției de herba la <i>Athropa belladonna</i> L.						
Varianta de semănat		Producția	Diferența	%	Semnificația	
		q/ha	q/ha			
Epoca de toamnă	1 octombrie	81,8	42,9	210,3	***	
	10 octombrie	93,9	55	241,3	***	
	20 octombrie	105,9	67	272,2	***	
	30 octombrie	114,7	74,8	294,8	***	
Epoca de primăvară	10 noiembrie	98,6	59,7	253,4	***	
	10 martie	38,9	-0,5	100		
	20 martie	38,4	0,5	98,7		
	30 martie	36,6	-2,3	94		
10 aprilie		31,9	-7	82	00	
DL 5%			5,2			
DL 1%			6,9			
DL 0,1%			9,1			

Lucrările de îngrijire. Deoarece această plantă germinază greu, după o lungă perioadă de timp, primăvara, înainte de răsărire cu 2 - 3 zile, se face o erbicidare totală cu Gramoxone sau Reglone 3 - 5 l/ha apoi se execută praşile şi pliviri (E. Păun, 1995).

Puricii măţăgunei se combat prin stropiri cu: Sumi-alpha 2,5 EC (0,02 %), Talstar 10 EC (0,05 %), Nogos 50 CE (0,1 %); Diazinon 60 CE (0,1 %); Sinoratox 35 CE (0,3 %), iar gândacul din Colorado se combate cu: Decis 2,5 CE (0,05 %); Sumi-alpha 2,5 EC (0,02 %); Marchal 25 EC (0,1 %); Nogos 50 CE (0,1 %) etc. (A. Mihailea, 1986, M.D. Bobiţ, 2000). Împotriva larvelor cărbuşului de mai şi a viermilor - sârmă se tratează cu Lindatox 3 (40 kg/ha) (A. Mihailea, 1986).

În loturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturând plantele netipice sau bolnave.

Recoltarea. De la măţăgună se recoltează obişnuit frunzele şi rădăcinile. Dacă se poate prelucra, se preconizează recoltarea întregii

părţi aeriene nелignificate (*Belladonnae herba*), obţinându-se o producţie de materie primă cu 40 % mai mare (F. Crăciun şi colab., 1977). În primul an de vegetaţie, se obţine doar o producţie de frunze (la începutul înfloritului) şi una de herba (în momentul fructificării, după 30 - 35 zile) (A. Mihailea, 1986).

În anul al doilea de vegetaţie se obţin 2 - 3 recolte de frunze, prima începând din faza de înflorire. Se preconizează şi recoltarea alternativă (succesivă) de folia şi herba, ducând la sporirea rentabilităţii plantaţiei de măţăgună cu 70 % (A. Mihailea şi E. Păun, 1963). Întâi se recoltează frunzele (când au ajuns la completa dezvoltare), apoi herba (la înflorire), iar după refăcerea plantelor se recoltează o producţie de frunze, urmată de una de herba, obţinându-se astfel patru recolte de masă vegetală. Pe baza studiilor întreprinse la Măgurele - Braşov (E. Coiciu şi colab., 1960) s-au obţinut sporuri substanţiale de recoltă şi de principii active la recoltări alternative comparativ cu recoltarea numai a frunzelor (tabelul 4.17.1.5., după A. Mihailea, 1986).

Tabelul 4.17.1.5.

Rezultatele comparative privind producţia de materie primă vegetală şi de alcaloizi în cazurile recoltării numai de frunze şi recoltării alternative de frunze şi herba					
Recolta	Data recoltării	Recolta uscată, kg/ha		Alcaloizi, kg/ha	
		recoltări alternative	recoltă de frunze	recoltări alternative	recoltă de frunze
Recolta I (frunze)	8.VI	472	472	3,77	3,77
Recolta II (herba)	14.VII	950	137	4,27	1,11
Recolta II (frunze)	10.IX	215	215	1,55	1,55
Recolta III (herba)	19.X	620	186	2,11	0,9
Total	-	2 257	1 100	11,7	7,33

Frunzele se recoltează manual, cu peţiol (care este mai bogat în alcaloizi), punându-se în coşuri, fără să se îndese. Recoltarea lor se face pe timp frumos, fără rouă, apoi se transportă în scurt timp la uscat.

Rădăcinile se recoltează în toamna anului al doilea de vegetaţie, la desfiinţarea culturii. Scoaterea rădăcinilor se face cu plugul fără cornană sau cu dislocatorul de sfecă.

În loturile semincere nu se recoltează frunzele în anul recoltării seminţelor, pentru a nu slăbi plantele (F. Crăciun şi colab., 1977). Recoltarea baceilor din lotul semincer se face la maturitatea acestora, când au culoarea neagră lucioasă (A. Mihailea, 1986). Fructele de măţăgună se strâng manual pe măsura coacerii în coşuri sau găleţi de material plastic, se usucă pe rame, apoi se eliberează seminţele prin

sfărmare și vânturare. După recoltare semințele se pot obține și printr-o prealabilă macerare a bachelor în apă când se distinge pulpa fructelor și se eliberează semințele.

Condiționarea. După recoltare, rădăcinile se separă de pământ prin scuturare, se curăță de părțile aeriene, apoi se spală în apă foarte repede (alcaloizii fiind solubili), se zvântă, se rețin cele corespunzătoare (rădăcinile cărnoase și mustoase), cele îmbătrânite, seci și lignificate (cu conținut redus de alcaloizi) se înlătură. Se făsonează în bucăți de cca. 10 cm lungime, iar cele groase se despică în lung, pentru a se ușura uscarea.

Uscarea frunzelor se poate face pe cale naturală, la umbră, în încăperi uscate și aerisite, așezându-se în străt subțire și întorcându-se des, sau pe cale artificială (întâi la cca. 40 °C, apoi la 50 - 60 °C).

Rădăcinile se usucă artificial la 50 - 60 °C. Toamna când se recoltează ele, nu sunt condiții pentru uscarea naturală.

Randamentul la uscarea pentru frunze este de 6 - 7:1, iar pentru rădăcini de 4 - 5:1.

După uscarea, produsul (frunze, rădăcini) se ambalează în saci și se păstrează în încăperi uscate și curate până la livrare.

Condițiile tehnice de recepție pentru frunze prevăd un conținut de alcaloizi totali, exprimat în hiosciamină, de minimum 0,3 %; ca impurități, frunze înegrite, maximum 5 %, alte părți de plantă, maximum 3 %; corpuri străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 0,5 %, iar umiditatea de maximum 13 %.

Pentru herba uscată se admit ca impurități (frunze și ramuri brunificate) maximum 5 %; corpuri străine organice, maximum 1 %, cele minerale, maximum 2 %, iar umiditatea, maximum 13 %.

La herba proaspătă, impuritățile (frunze și ramuri îngălbenite): maximum 5 %, corpuri străine organice, maximum 0,25 %, cele minerale, maximum 0,5 %, iar umiditatea normală a produsului proaspăt la recoltare (fără urne de apă).

Pentru rădăcini, conținutul în alcaloizi totali, exprimați în hiosciamină, trebuie să fie de minimum 0,45 %; ca impurități, rădăcini lignificate, cioturoase, seci, maximum 3 %, rădăcini brunificate la exterior, maximum 5 %; corpuri străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 1 %; iar umiditatea maximum 13 %.

Observație Planta fiind toxică, în timpul recoltării și prelucrării trebuie luate măsuri de protecția muncii: spălarea pe mâini după lucru, neadmitându-se atingerea mâncării sau țigărilor cu mâinile nespălate.

Dacă se lucrează cu produs uscat, se indică mască sau tifon la gură și nas. Încăperile unde se depozitează și se păstrează materia primă se închid, pentru a preveni intoxicările accidentale.

În cazul intoxicărilor, la început apare roșeața feței, accelerarea respirației, urticarie, eczemă cutanată, excitații, halucinații, furie, sete, constipație, mărirea pupilei. În cazuri extreme intervine și uscarea gâtului, răgușeala, stare de agitație, delir și chiar moartea (A. Radu și E. Andronescu, 1984). Se recomandă să se intervină cu spălături stomacale, tratament cu cărbune activ, purgative cu sulfat de sodiu, și să se aplice cărpe umede pe piept. Se va chema medicul care va administra tonice respiratorii și cardiace.

Producția de frunze uscate este 6 - 7 q/ha, iar cea de rădăcini uscate de 10 - 15 q/ha.

În loturile semincere, se obțin între 500 - 600 kg/ha semințe de mătăgună.

4.17.2. LAURUL PĂROS (*Datura innoxia* Mill.)

Fr: Pomme épineuse; E: Torn apple; G: Stechapfel;

4.17.2.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Laurul păros (*D. innoxia* Mill.) este originar din regiunile tropicale ale Mexicului (M. Verzea, 2000), fiind cunoscut din antichitate în America Centrală. A fost numit și laur indian, fiind utilizat de triburile indiene din America Centrală. Există și specia *D. metel* L., numită tot „laur indian” (originar din India), cu aceeași proprietăți (calmante, narcotice, antispasmodice). Numele genului derivă din cuvântul arab „Tatula” care se pronunță „datora” și care înseamnă plante cu fructe spinoase (E. Ghișe, 1960). Deosebirile anatomo - morfologice și chimice între cele două specii au fost făcute de Danert (1954), Verzar - Petri și Sarcany (1960, 1961) (cit. de M. Verzea, 1986). În Europa a fost adusă din Mexic fiind cultivată în Rusia, Polonia (1961), Ungaria (1960), Bulgaria (1961) etc. În țara noastră *D. innoxia* Mill (laur păros) se cultivă din anul 1962 (în experiențe la ICPT Fundulea, iar culturi de *D. metel* L. s-au inițiat de prin anul 1933 (M. Verzea, 1986).

Materia primă și compoziția chimică. De la laurul păros (Laur indian, Laur) se folosește ca materie primă vegetală partea

acriană a plantei (*Datura innoxia herba*), în stare proaspătă sau uscată.

Întreaga plantă conține alcaloizi tropanici, în limitele 0,01 - 0,3 % (M. Verzea, 2000), în care predomină scopolamina, fiind folosită ca sursă pentru extragerea acestui alcaloid. Conținutul total de alcaloizi tropanici este diferit în organele plantei: în herba uscată este de 0,23 - 0,36 %; în frunze, de 0,16 - 0,57 %; în tulpini, 0,11 - 0,28 %; în organele florii, 0,45 - 0,57 %; în fructe, 0,23 - 0,56 %; în semințe, 0,38 - 0,62 %; iar în rădăcini 0,15 - 0,53 % (V. Cucu și colab., 1982, J. King, 2002). În tulpină, conținutul procentual în alcaloizi crește de la bază spre vârf (G. Răcz și C. Csedő, 1965). Din alcaloizii totali, în herba, scopolamina reprezintă 52 - 80 %, urmată de hiosciamină (10 - 18 %), apoi de meteloidină, noratropină, norscopolanină, cuschigrină etc. C. Rizescu și colab., 1973, stabilesc că în herba, din totalul alcaloizilor, 70 % este scopolamină, urmată de hiosciamină etc. V. Coșariu și M. Verzea, 1981, au găsit că scopolamina reprezintă 55 % din totalul alcaloizilor din frunze. După V. Istudor 2005, din totalul alcaloizilor, herba conține scopolamină (75 %), urmată de hiosciamină (14 - 20 %) etc.

La cerere, se recoltează fructele (*Datura innoxia fructus*), cu semințe imature (predate în stare uscată). La această plantă, s-a stabilit că atât sub aspectul producției și calității materiei prime vegetale, cât și sub aspect economic, cea mai potrivită soluție este recoltarea herbei, care poate fi ușor mecanizată.

Utilizări. Scopolamina este un puternic calmant al excitațiilor psihomotorii. Derivații scopolaminei se utilizează ca medicamente spasmolitice în ulcer, colică nefritică și biliară, boala Parkinson, rău de mare și de altitudine, în oftalmologie (acțiune midriatică) etc. Sub formă de N-brom-butil-scopolamină, intră în produsele românești **Scobutil și Scobutil compus**.

Răspândire. Laurul păros este originar din America, arealul inițial fiind nordul Americii de Sud până în Mexic. S-a răspândit apoi și în alte zone pe glob (din zona mediteraneană până în India), fiind cultivat astăzi în diferite țări europene.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Datura innoxia* Mill. (fig 4.17.2. și 4.17.2.a.). Diploizii acestei specii au $2n = 24$ (M. Verzea și colab., 1984). În cadrul genului *Datura*, se cunosc mai multe specii cu diferite varietăți (E. Coiciu și G. Răcz, 1962, L. Debourcien, 1977, T. Adzet și colab., 1979, A. Hammer și colab., 1983).




Fig. 4.17.2. *Datura innoxia* Mill.
a - floare; b - fruct

În scop farmaceutic se folosesc, de asemenea, *Datura stramonium* L. (Laur), cultivat pentru frunze (*Stramonii folium*) și la noi în țară, în trecut și *Datura metel* L. (Laur indian), cultivat în zone calde (îndeosebi în India). *Datura stramonium* L. cuprinde diferite varietăți, cu plante glabre sau foarte puțin păroase, fructul așezat drept pe tulpină, flori albe sau violet deschis, fructele cu sau fără ghimpi. *Datura metel* L. are fructul așezat oblic pe tulpină, cuprinzând varietăți cu flori simple sau pline, albe sau roșii violet. *D. stramonium* L. are $2n = 24,48$ (A. Laza și G. Răcz, 1975).

La noi în țară, din specia *Datura innoxia* Mill. se cultivă soiurile Laura (din anul 1982) și Silva (din anul 1993).

Particularități biologice. Laurul păros este plantă anuală. Rădăcina este pivotantă, bine dezvoltată. Tulpina are 100 - 150 cm înălțime, 3 - 4 cm diametru și este ramificată la circa 30 cm de la sol. Este roșcată în partea inferioară și păroasă. Frunzele sunt simple, pețiolate, cordiforme, cu baza asimetrică și marginea întregă slab ondulată. Au lungimea de circa 16 cm și lățimea de circa 13 cm. Florile sunt mari, dispuse solitar. Caliciul este gamosepal, verde - cenușiu și păros. Corola gamopetală de 12 - 17 cm lungime (2/3 este în caliciu), cu 10 lacinii, dina care 5 mai lungi și ascuțite (petalele) și 5 mai scurte (la locul de unire a petalelor). Înflorește din luna iulie în octombrie. Fructul este o capsulă care atârnă în jos. Este sferic - ovată, de 4 - 5 cm lungime, cu un inel calicial la bază de 1 - 1,5 cm și acoperită cu ghimpi de 5 - 7 mm lungime. Semințele sunt reniforme, de 4 - 5 mm lungime și de 3 - 4 mm lățime, de culoare brună - deschisă. Laurul păros este cultivat ca plantă anuală și se recoltează la 110 - 130 zile de vegetație, când începe formarea fructificațiilor, iar conținutul în scopolamină este cel mai ridicat.

Cerințe față de climă și sol. *Datura innoxia* Mill. este originară din zone cu climă caldă și are cerințe ridicate față de temperatură și lumină, factori determinanți în creșterea și dezvoltarea plantei, precum și în sinteza și acumularea alcaloizilor tropanici (M. Verzea, 2000). Pentru răsărire necesită temperatură de 12 °C, iar în cursul vegetației pretinde o temperatură medie de 18 - 22 °C. Plantulele suferă la -2 °C, iar plantele mature sub -4 °C (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Este o plantă heliofilă, lumina intensă și de lungă durată favorizează atât producția de masă verde, cât și sinteza și acumularea scopolaminei. Pretinde un regim de umiditate favorabil, crescând producția de masă verde în condiții de sol mai umed. Excesul de precipitații reduc conținutul în alcaloizi, iar secetele prelungite reduc mult capacitatea de producție a plantelor. În zonele sudice s-au

obținut rezultate bune prin irigare. Laurul păros dă cele mai bune rezultate pe soluri fertile, bogate în humus, profunde, drenate și afânate, cum sunt cernoziomurile și aluviunile. Nu merge pe soluri cu apă stagnantă, reci, grele și care formează crustă.

Zonarea. Zone foarte favorabile sunt considerate Câmpia Bărăganului, Câmpia Burnazului, Câmpia Olteniei și zonele limită Dunării, iar ca zone favorabile sunt Câmpia Timișului și Câmpia Crișului (M. Verzea, 2000). Pe lângă aceste zone, E. Păun și colab., 1983, recomandă cultivarea și în județele Neamț și Bacău.

4.17.2.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Laurul păros se cultivă după cereale de toamnă sau prășitoare (excepție plantele din familia *Solanaceae*), iar pe același teren poate reveni numai după 5 ani.

Loturile semincere se amplasează separat de alte culturi de laur păros, urmând să se efectuează purificarea biologică, recunoașterea culturilor și recoltarea în condiții speciale, pentru obținerea semințelor.

Fertilizarea se face cu 50 - 60 kg/ha P_2O_5 și 40 - 60 kg/ha K_2O (încorporat cu arătura) și 90 - 120 kg/ha N (încorporat primăvara la pregătirea patului germinativ) (M. Verzea, 1986).

După M. Verzea și colab., 1980, prezentăm influența fertilizării cu P și K (tabelul 4.17.2.1.) și cu azot (tabelul 4.17.2.2.), asupra producției de herba uscată la *D. innoxia* Mill. (media anilor 1976 - 1978). Combinația fosforului și potasiului a sporit producția cu 12 - 25 % (față de neîngrășat). Îngrășămintele cu azot au avut o influență mai mare asupra producției de herba la această plantă.

Lucrările solului. Arătura se execută la 25 - 28 cm adâncime și se menține curată de buruieni, prin lucrări cu discul urmat de grapă. Patul germinativ se pregătește cu combinatorul.

Tabelul 4.17.2.1.
Influența fertilizării cu P și K asupra producției de herba uscată la *Datura innoxia* Mill.

Doze de P și K	Producția q/ha	Diferența	%	Semnificația
Neîngrășat (Mt)	33,6	-	100	
$P_{40}K_{40}$	35,4	+1,8	105	
$P_{60}K_{40}$	37,3	+3,7	111	
$P_{60}K_{60}$	39,9	+6,3	118	**
DL 5%	4 q/ha			
DL 1%	5,5 q/ha			
DL 0,1%	7,2 q/ha			

Tabelul 4.17.2.2.
Influența îngrășămintelor cu azot asupra producției de
herba uscată la *Datura innoxia* Mill.

Doze de azot	Producția q/ha	Diferența	%	Semnificația
N ₀ (M)	32,6	-	100	
N ₃₀	34,6	+2	106	
N ₆₀	36,4	+3,8	112	**
N ₉₀	38,2	+5,6	117	***
N ₃₀	39,4	+6,8	121	***
N ₉₀	38	+5,4	116	***
DL 5%	2,5 q/ha			
DL 1%	3,2 q/ha			
DL 0,1%	4 q/ha			

Sămânța și semănatul. Laurul păros se înmulțește prin semănat direct în câmp. Se folosește sămânță cu puritatea de 95 % (minimum 90 %), iar germinația de 80 % (minimum 65 %) Semănatul se face în primăvara, când solul are 7 - 8 °C pentru a asigura o răsărire mai rapidă (E. Păun, 1995). Unele recomandări arătau că semănatul în pragul iernii sau primăvara timpuriu, asigură apa pentru răsărire (F. Crăciun și colab., 1977), care are loc primăvara (când în sol sunt 10 - 12 °C), însă în acest caz intervine pericolul îmburuienării și răsăririi neuniforme a plantelor.

În tabelul 4.17.2.3. (după M. Verzea, 1986) se prezintă influența epocii de semănat asupra producției de herba și alcaloizi la laurul păros în condițiile de la SCPMA Fundulea. Se constată posibilitatea semănatului acestei plante pe luna aprilie și mai târziu (în condiții de irigare) după altă cultură.

Tabelul 4.17.2.3.
Influența epocii de semănat asupra producției de materie primă vegetală
și alcaloizi totali la laurul păros

Data semănatului	Nr. zile până la răsărire	Producția de herba uscată		Conținutul în alcaloizi g/100g	Producția de alcaloizi	
		q/ha	%		kg/ha	%
1 aprilie	33	42,8	100	0,294	12,5	100
20-25 aprilie	24	43,6	101	0,298	12,9	103
10-20 mai	16	24	56	0,324	7,7	61
10-20 iunie	16	13,4	31	-	-	-

Densitatea optimă este de 30 - 40 plante la m² (M. Verzea, 2000). Se seamănă cu semănătorii universale la 50 - 60 cm între rânduri, adâncimea de 4 - 5 cm, folosind 10 - 12 kg sămânță la ha.

Lucrările de îngrijire. Buruienile se combat prin prașile și pliviri. Se pot aplica erbicidele Treflan (3 l/ha) înainte de semănat

(încorporat imediat la 6 - 8 cm cu grapa cu discuri), în combinație cu Afalon (2 kg/ha) sau Prometrex (4 kg/ha) aplicate la maximum 1 - 2 zile după semănat (în 400 - 600 l/ha apă). Înainte de răsărire a culturii, dacă apar buruieni, se pot combate cu erbicide totale Reglone (2 l/ha), Roundup (3 l/ha) sau Basta (3 l/ha). Pe vegetație se pot aplica Basagran (2 l/ha) sau Furore (2 l/ha). (M. Verzea, 2000).

Pentru combaterea pătării frunzelor și capsulelor se fac tratamente cu Dithane M 45 (0,2 %) și Benlate (0,1 %) etc.

În loturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. Fenofaza recoltării laurului păros este atunci când plantele au flori pe etajul al III-lea și capsule imature pe etajele I și II, fază în care se obțin producții mari de herba și cu conținut ridicat în alcaloizi (tabelul 4.17.2.4) (M. Verzea, 1986).

La fructele la care începe brunificarea și uscarea, scade mult conținutul în alcaloizi (în capsule și semințe).

Recoltarea herbei se face prin tăierea plantelor la 10 - 12 cm de la suprafața solului, mecanic (combina de recoltat furaje) sau manual (cu secera), pe timp frumos, dimineața, după ce s-a ridicat roua (între orele 8 - 9 din zi).

Loturile semincere se recoltează la sfârșitul perioadei de vegetație a laurului păros (octombrie) (M. Verzea, 1986). Recoltarea capsulelor pentru extragerea semințelor (ca material de înmulțire) se face cu combina de cereale, direct din lan (după o eventuală stropire cu desicantul Reglone, în doză de 10 l/ha).

Tabelul 4.17.2.4.
Variația producției de herba uscată, a conținutului și producției de alcaloizi totali, în
funcție de faza de vegetație, la laurul păros (SCPMA - Fundulea)

Faza de vegetație	Producția de herba uscată		Alcaloizi totali exprimați în scopolinină			
	q/ha	%	g/100 g	%	kg/ha	- %
Flori deschise pe etajul I (M)	35,2	100	0,281	100	9,9	100
Flori deschise pe etajul II, capsule imature pe etajul I	41,5	118	0,242	86	10	101
Flori deschise pe etajul III, capsule imature pe etajele I, II	45,7	129	0,302	107	13,8	139
Flori deschise pe etajul IV, capsule imature pe etajele I, II, III	44,7	127	0,26	92	11,6	117
Flori deschise pe etajul V, capsule cu sămânță matură pe etajele I, II, III, capsule imature pe etajele III, IV	59,7	169	0,231	82	14,3	144

Condiționarea. După recoltare, produsul trebuie dus în cel mai scurt timp la uscător (nu se păstrează în grămezi mai multe ore) pentru a menține conținutul în alcaloizi. Uscarea se face pe cale artificială, la 50 - 60 °C, urmărindu-se uscarea cât mai rapidă. Produsul tocat (la 2 - 3 cm) la recoltare se usucă mult mai repede și uniform. Nu se recomandă uscarea pe cale naturală (F. Crăciun și colab., 1977), însă în caz de nevoie, se poate face în poduri bine aerisite, în straturi subțiri (cca. 1 kg/m²), întorcându-se de câte ori este necesar. După uscare, produsul se ambalează în saltele etichetate, păstrându-se în încăperi uscate și curate până la livrare. Randamentul la uscare, în funcție de faza de vegetație la recoltare, este de 6 : 1 până la 9 : 1.

S-au obținut rezultate bune și prin conservarea materiei prime proaspete prin congelare și prin însilozare, în condiții de anaerobioză (silozuri betonate), prelungind astfel fluxul tehnologic de prelucrare la întreprinderile de medicamente și în perioada toamnă - primăvară (M. Verzea și colab., 1980).

Condițiile tehnice de recepție prevăd pentru produsul uscat, ca impurități, frunze brunificate sau înnegrite, maximum 2 %, frunze mai mici de 7 cm, maximum 3 %; corpuri străine organice, maximum 1 % și minerale, maximum 1 %; umiditatea maximum 13 %, iar principii active - alcaloizi totali, minimum 0,2 %.

Nu se admite să se usuce și să se ambaleze produsul în aceeași încăpere cu pălăgina.

Condițiile de recepție pentru produsul proaspăt prevăd ca impurități, frunze brunificate sau îngălbenite, maximum 2 %, frunze mai mici de 7 cm, maximum 3 %, părți lignificate, maximum 5 %; corpuri străine organice, maximum 1 %, cele minerale, maximum 0,25 %, principii active, alcaloizi totali, minimum 0,03 %, iar umiditatea normală a produsului proaspăt la recoltare (fără urme de apă).

Producția ce se realizează la ha este de 15 - 20 tone de produs proaspăt, respectiv 2,5 - 3,5 tone produs uscat, în funcție de soi și condițiile de cultură.

În tabelul 4.17.2.5., (după M. Verzea și O. Coșocariu, 1983), prezentăm rezultatele de producție la soiul Laura și la soiul local (populația de Bărăgan (media pe anii 1975 - 1981). La ambele soiuri, producția de herba a fost mai ridicată la recolta I, față de recolta II-a (în medie cu 61 - 66 %), iar conținutul în alcaloizi totali (exprimați în scopolamină) a fost mai mare la recolta a II-a (cu 52 - 53 %) față de recolta I, datorită temperaturii din iulie - august, condiție favorabilă

biosintezei și acumulării alcaloizilor la *D. innoxia* Mill. (M. Verzea și O. Coșocariu, 1983).

Tabelul 4.17.2.5.
Producția de herba și alcaloizi totali (exprimați în scopolamină) la *D. innoxia* Mill.

Media pe șapte ani (1978-1981)	Soiul Laura		Populația de Bărăgan	
	q/ha	%	q/ha	%
Herba proaspătă (suma a două recolte)	269	119	226	100
Herba uscată (suma a două recolte)	39,4	127	31,1	100
Conținut mediu în alcaloizi totali exprimați în scopolamină (g/100 g)	0,307	102	0,302	100
Producția de alcaloizi	12,1	129	9,4	100

În loturile semincere, se realizează producții de 800 - 1500 kg/ha de laur păros.

Observație. Laurul păros este o plantă toxică, necesitând aceeași măsuri de protecția muncii ca și la mătrăgună, în perioada lucrărilor de îngrijire, recoltare și condiționare.

4.17.3. MĂSELARIȚA (*Hyoscyamus niger* L.)

Fr: Jusquiame noire; E: Belene, Henbane, Black henbane;

G: Schwartz Bilsenkraut; Bilsenkraut

4.17.3.1. Importantă. Biologic. Ecologie

Măselarița este cunoscută și utilizată în scopuri medicale din antichitate, fiind menționată în lucrările lui Dioscoride (M. Verzea, 1986). Numele genului vine de la grecescul "*hyoskyamos*" (compus din *hys* = porc și *kyamos* = bob), prin care Dioscorides numea măselarița (planta fiind otrăvitoare pentru porci) (E. Ghișa, 1960).

Materia primă și compoziția chimică. La măselariță (Măslăriță, Măselar), materia primă o constituie frunzele (*Hyoscyami folium*) sau partea aeriană a plantei (*Hyoscyami herba*).

Frunzele uscate conțin alcaloizi tropanici în proporție de 0,05 - 0,17 %, (V. Istudor, 2005, S. Häkkinen și colab., 2005), petiolul și nervurile frunzelor fiind mai bogate în alcaloizi decât limbul. Conținutul în alcaloizi al semințelor este de circa 0,3 % (U. Stănescu și colab., 2004). Principali alcaloizi sunt: hiosciamină și scopolamină, apoi atropină, apotropină, tropină, scopină etc. Frunzele mai conțin aminoacizi, flavone, vitamina C, săruri minerale etc. Rădăcinile au

conținutul mai mare în alcaloizi decât frunzele, fiind cuprins între 0,08 - 0,24 % (raport la rădăcina uscată).

Utilizări. Acțiunea farmacodinamică și utilizările terapeutice sunt similare cu cele prezentate la *Atropa belladonna* L. Acțiunea este mai slabă, fiind mai săracă în alcaloizi decât *A. belladonna* L. Se utilizează și în tratamentul stărilor de excitație motorie sau maniacală, în boala Parkinson etc. Frunzele intră în compoziția țigărilor antisnatic (M. Tâmbaș și colab., 2005). În *Farmacopeea Română* figurează: *Hyoxyami folium* (frunză de mășelariță, frunză de hioscian), cu un conținut de cel puțin 0,04 % alcaloizi totali, exprimați în hioscianină, și *Extractum Hyoscyami siccum* (extract uscat de hioscian), cu 0,3 g % alcaloizi totali din hioscian, exprimați în hioscianină.

Răspândirea. Mășelarița este de origine eurasiatică. Este răspândită în aproape toată Europa, nordul Africii, Asia centrală și occidentală, fiind introdusă și în America de Nord, Asia orientală și Australia (V. Cucu și colab., 1982). Se cultivă în diferite țări din Europa centrală și orientală (Ungaria, Bulgaria, fosta Iugoslavie, Rusia), în SUA și Canada (V. Stănescu și colab., 2004).

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Hyoxyamus niger* L. (fig. 4.17.3., după Flora României, vol. VII, 1960 și 4.17.3.a., original). Această specie are $2n = 34$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). În cadrul speciei se întâlnesc: var. *pallidus* (W. et K) Rechb. cu flori gălbui, fără vînșoare violacee; var. *agrestis* (Kit) Beck (var. *annuus* Sims), anuală, fără frunze de rozetă. Tulpina neramificată, de cel mult 30 cm înălțime. În cultură se preferă formele bienale care formează în primul an o rozetă bogată de frunze. La noi în țară din specia *Hyoxyamus niger* L. se cultivă soiul local (populația "De Timiș" (din anul 1976).

Particularități biologice. Mășelarița este plantă ierboasă cu forme anuale sau bienale. Rădăcina este bine dezvoltată, pivotantă, cu ramificații foarte puține. Tulpina este simplă sau ramificată în partea superioară, înaltă de 30 - 80 cm, pubescentă și cu partea bazală lignificată după înflorire. La formele bienale, tulpina se formează numai în anul al doilea de vegetație. Frunzele sunt alterne, ovale, cu marginea sinuată, păroase. Cele bazale sunt pețiolate, cele superioare sesile. Frunzele au lungimea de 5 - 20 cm, iar lățimea până la 10 cm. La formele bienale, în primul an se dezvoltă o rozetă de frunze mari, de circa 30 cm.



Fig. 4.17.3. *Hyoxyamus niger* L.
a - capsulă deschisă; b - capsulă în secțiune longitudinală

Forile sunt scurt pedunculat sau sesile, dispuse solitar la vârful ramificațiilor. Sunt de formă campanulată cu bractee similare frunzelor superioare; caliciul format din 5 sepal concrescute, pătos și persistent, de 1 - 2 cm lungime; corola gamopetală, cu 5 lobi, lungă până la 3 cm, de culoare galben - murdar, cu vinișoare violete; androceul format din 5 stamine inserate în tubul corolei (două sunt mai scurte); gineceul cu ovar bicarpelar, stilul de până la 2 cm lungime, iar stigmatul capitat, bilobat. Înfloarește în lunile iunie - august. Fructul este capsulă (pixidă) biloculară, acoperită de caliculi persistent, cu numeroase semințe. Semințele sunt aproape sferice sau reniforme, cu diametrul de 0,8 - 1 mm, de culoare brunie și suprafața reticulată. MMB este de 0,3 - 0,6 g.

Cerințele față de climă și sol. Măselarița este destul de pretențioasă față de temperatură și lumină. E. Coiciu și G. Răcz, 1962, arată că factorul limitativ pentru alegerea zonelor potrivite pentru măselariță este temperatura. Aceeași autori apreciază că răsărirea are loc și la 8 - 12 °C (cu minimum 3 - 8 °C), însă la temperaturi mai ridicate (cca. 20 °C), plantele răsăr rapid și creșterea este viguroasă. Temperaturile scăzute și solurile sărace reduc creșterea, grăbesc îmbătrânirea plantelor, frunzele rămân mici și grăbesc fructificarea. Formele biennale au rezistență slabă la iernare, neputându-se cultiva în zonele cu ierni mai aspre. Pretinde soluri fertile, bogate în azot, ușoare, bine drenate. Cele mai potrivite sunt cernoziomurile, cu apa freatică sub 1,5 m și cu un pH apropiat de neutru.

Zonarea. Cele mai potrivite zone de cultură sunt Câmpia de Vest și Câmpia Bărăganului (M. Mircea, 1986).

4.17.3.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. În țara noastră, măselarița este cultivată ca plantă anuală, însă în alte țări (Rusia, Ungaria) se cultivă și ca plantă biennială (aparținând var. *pallidus* (W et K) Rehb. (M. Verzea, 1986). Măselarița se cultivă după leguminoase sau prășitoare bine fertilizate, cu excepția plantelor din fam. *Solanaceae*. Pe același teren poate reveni numai după 4 - 5 ani.

Pentru producerea materialului de înmulțire se organizează loturi semincere, separat de culturile pentru producția de materie primă vegetală.

Fertilizarea se face cu gunoi de grajd (25 - 30 t/ha) sau cu îngrășăminte chimice în doze de 45 - 50 kg/ha P_2O_5 și 25 - 30 kg/ha K_2O (toamna) și 30 - 40 kg/ha N (primăvara) (M. Mircea, 1986).

Lucrările solului. Arătura se execută la 25 - 28 cm adâncime, după eliberarea terenului de către planta premergătoare. Primăvara se pregătește patul germinativ cu combinatorul sau cultivatorul în agregat cu grapa.

Sămânța și semănatul. Măselarița se înmulțește prin semănat direct în câmp. Sămânța trebuie să aibă puritatea de 95 % (minimum 90 %), iar germinația de 80 % (minimum 70 %). Semănatul se face primăvara timpuriu, după ce se poate ieși la câmp (tabelul 4.17.3.1., după M. Mircea, 1987). La răsărire trebuie să se realizeze densitatea de circa 145 plante/m² (M. Mircea, 1986). Semănatul se face cu semănători universale (SUP-21, SUP-29) adaptate pentru semințe mici, în rânduri la distanța de 50 cm și adâncimea de circa 1 cm. Se folosesc 6 - 8 kg sămânță la ha, amestecată cu sămânță de plantă indicatoare (circa 100 g sămânță de salată etc.) pentru a putea efectua lucrări de îngrijire (prașile) înainte de răsărirea măselariței.

În loturile semincere, se recomandă semănatul la 50 cm între rânduri, cu 6 kg/ha sămânță. După M. Mircea, 1986 prezentăm influența distanței de semănat (tabelul 4.17.3.2.) și a cantității se sămânță la ha (tabelul 4.17.3.3.) asupra producției de semințe la *H. niger* L. La 6 kg/ha sămânță și 50 cm între rânduri s-a realizat numărul maxim de ramificații (1,8), iar la 25 cm între rânduri, cu 10 kg/ha sămânță, scade numărul de ramificații (la 0,2) și se reduce producția de semințe.

Lucrările de îngrijire. Pentru combaterea buruienilor se fac prașile și pliviri ori de câte ori este nevoie. Se recomandă o erbicidare totală cu Gramoxone, în doză de 2,5 - 3 l/ha, aplicat cu câteva zile înainte de răsărirea plantelor de măselariță (de reținut că plantele de măselariță sunt distruse de acest erbicid) (E. Păun, 1995). Combaterea buruienilor pe vegetație se realizează cu DMA-6 (1 l/ha) în amestec cu unul dintre produsele Fusilade (2 l/ha) sau Furore (2 l/ha), când buruienile nu au mai mult de 10 cm înălțime (V. Dulămea, 2000). În caz de atac de mană se fac tratamente cu Ridomil MZ (0,25 %), Zineb (0,4 %), Dithane M 45 (0,2 %) etc., iar fâinarea se combate cu Metoben 70 PU (0,1 %), Rubigan 10 CE (0,01 %) sau Karathane (0,15 %) etc. Gândacul din Colorado se combate cu Sumi-alpha 2,5 EC (0,02 %), Polytrin 200 EC (0,15 %), Decis 2,5 CE (0,05 %) (V. Dulămea, 2000). Deoarece se folosesc frunzele, se recomandă ca tratamentele cu pesticide să se întrerupă cu 40 de zile înainte de recoltare.

Tabelul 4.17.3.1.
Influenta epocii de semănat asupra producției de herba uscată

Epoca de semănat	Producția de herba uscată (q/ha)	d	%	Semnif.
În pragul iernii (noiembrie)	37,6	Mt.	100	-
Primăvara urgența I	43,5	5,9	116	***
Primăvara urgența II	29,5	- 8,1	78,4	000
DL 5% = 2,8 DL 1% = 4,03 DL 0,1% = 5,8				

Tabelul 4.17.3.2.
Influenta distanței de semănat asupra producției de semințe la *Hyosciamus niger* L.

Distanța între rânduri (cm)	Producția (q/ha)	Diferența	%	Semnif.
25	6,3	-0,6	91	00
37,5	6,5	-0,4	94	0
50	6,9	Mt	100	-
DL 5% = 0,4				

Tabelul 4.17.3.3.

Influenta cantității de sămânță asupra producției de semințe la <i>Hyosciamus niger</i> L.				
Cantitatea de sămânță kg/ha	Producția (q/ha)	Diferența	%	Semnif.
6	7,3	1,3	121	**
8	6,4	0,4	107	-
10	6	Mt	100	-
DL 5% = 0,9				

În loturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave. Deasemenea, se recomandă eliminarea florilor tardive sau slab dezvoltate (F. Crișciu și colab., 1977).

Recoltarea. Se recoltează frunzele, egalizat pe măsură ce ajung la dezvoltarea completă, la începutul înfloririi. Recoltarea se face manual, pe timp frumos, iar produsul recoltat nu se ține în grămezi pentru a nu se încinge.

Dacă se solicită *herba*, aceasta se recoltează la începutul înfloririi, cu secera sau cu costoaara (M. Verzea, 1986).

În loturile semincere, în anul întâi de vegetație, se vor menține frunzele din jurul vârfului de creștere, pentru ca planta să se fortifice până la intrarea în iarnă și să poată rezista la iernare (M. Verzea, 1986). În anul doi de vegetație nu se vor mai recolta frunzele. Fructele se recoltează la completa maturare a lor, când calicul persistent pe fruct are culoarea cafeniu deschis, iar frunzele, tulpina și ramificațiile sunt uscate. Loturile semincere se recoltează cu combina, sau cu secera, apoi se treieră.

Condiționarea. Uscarea frunzelor se face natural în încăperi curate și aerisite, în strat subțire (1 kg frunze proaspete la m²), întorcându-se de 2 - 3 ori pe zi. Uscarea artificială se face la cca. 40 °C. Randamentul la uscare este de 7 - 9 : 1. Frunzele uscate se ambalează în saci sau lăzi, care se păstrează în încăperi uscate și curate până la livrare. Plantele tocate de măslărie se usucă în aceleași condiții ca și frunzele.

Condițiile tehnice de recepție prevăd ca impurități: frunze brunificate sau înnegrite, maximum 3 %; corpuri străine organice, maximum 1 %, iar minerale nu se admit; umiditatea maximă 13 %.

Producția care se obține este de 7 - 10 q/ha frunze uscate. Producția de herba proaspătă este de 100 - 180 q/ha, respectiv 15 - 20 q/ha herba uscată (M. Verzea, 1986).

Producția de sămânță de măslărie este cuprinsă între 300 - 500 kg/ha.

Observație Planta fiind toxică, se iau aceleași măsuri de protecția muncii în timpul recoltării și prelucrării ca și cele recomandate la mătrăgună.

4.17.4. ZÂRNA AUSTRALIANĂ (*Solanum laciniatum* Ait.)

Fr: Pomme kangourou de tasmanie; E.: Nichtsade; G: Kanguruh apfel

4.17.4.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Materia primă și compoziția chimică. De la Zârna australiană (*Zarna laciniată*), se folosește partea aeriană (*Solanum laciniat herba*) la începutul înfloririi, în formă uscată sau proaspătă.

Întreaga plantă conține glicocaloizi, cu excepția fructelor coapte (de culoare portocalie) și a semințelor, care sunt lipsite sau conțin doar urme. Glicocaloizii au ca aglicon solasodina, un aminoalcool steroicid (R. Kuhn și J. Löw, 1955, V. Cucu și colab., 1982). Conținutul în glicocaloizi în frunze uscate este de 1,4 - 3,89 % (în frunze proaspete 0,43 - 0,78 %), în herba, din partea superioară a plantei, este de 0,86 - 3,38 % (ca și în frunze), în tulpină 0,26 - 0,5 %, în fructele verzi, necoapte 2,5 - 6,16 % (fiind organele plantei cele mai bogate în glicocaloizi) (V. Cucu și colab., 1982, V. Okrsar și colab., 2002). H. Popescu și colab., 1983, au găsit conținutul de solasodina în frunze cuprins între 0,15 - 1,5 % (media 0,81 %), la un

număr mare de probe, dintr-un sortiment de ameliorare de la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca. Dintre glicoalcaloizi predomină solamargina (56 - 70 %), urmată de solasonină, β -solamargină, solanină etc. Prin hidroliza acidă, solamargina și solasonina pun în libertate solasodina și alți compuși. Unii autori au găsit în plante și agliconul solasodină liberă. Solasodina are o mare importanță putând fi transformată pe cale industrială în hormoni steroideici, de pildă în cortizon. Acesta se obține din glandele suprarenale ale animalelor (din 1000 kg glande de vită se extrăgeau 100 - 500 mg cortizon, sau din 1000 kg glande de scroafă, 755 mg cortizon), fiind neeconomic, după cum nu este economică nici obținerea cortizonului sintetic. Se apreciază că din producția de masă verde de pe un ha cultivat cu zîmă australiană se pot obține cca 2 kg cortizon (E. Coiciu, 1967).

Utilizări. Hormonii steroizi care se pot obține prin semisinteza din solasodină (cortizon, testosteron, progesteron etc.) au multiple utilizări în terapeutică. Cortizonul are acțiune antiinflamatoare și antialergică, produce retenție hidrosalină, fiind indicat ca hormon substitutiv în insuficiența corticosuprarenală (boala Addison, după suprarenalectomie sau hipopituitarism). Progesteronul, hormon sexual feminin, este indispensabil pentru menținerea sarcinii, inhibă ovulația în timpul sarcinii și intervine în dezvoltarea glandei mamare; este indicat în insuficiența luteinică, avort iminent și habitual, sterilitate prin hipoluteinism etc. Testosteronul, hormon androgen, indicat în pubertatea tardivă, eunucoidism, frigiditate, gigantism, fibrom uterin, eczeme etc.

Răspândire. *Solanum laciniatum* Ait. este originară din Noua Zeelandă, fiind răspândită în Australia, Noua Guinee, Tasmania (G.T.S. Baylis, 1963 citat de V. Cucu și colab., 1982). În zona de origine este arbust de cca. 3 m înălțime, putând trăi 3 - 7 ani. În Europa s-a aclimatizat ca plantă anuală, fiind introdusă în cultură în Rusia, Ungaria, România, Cehia și Slovacia.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Solanum laciniatum* Ait. (fig. 4.17.4., după G. Rácz și colab., 1970 și 4.17.4.a., original). Apropiată de aceasta este *Solanum aviculare* Forst. Solasodină s-a izolat și din fructe de *Solanum xanthocarpum* Schrad. Wendl. (J. Verbist și R. Monnet, 1974, 1975) și de *Solanum adoense* (Ntahomvukiye și colab., 1983). A. Laza și G. Rácz, 1975, arată că *S. laciniatum* Ait are $2n = 48, 92$. După alți autori (citați de V. Cucu și colab., 1982) specia *S. laciniatum* Ait are $2n = 29$ iar *S. aviculare* Forst are $2n = 46$.



Fig. 4.17.4. *Solanum laciniatum* Ait.
a - părțile aeriene; b - frunze.

La noi în țară, din specia *Solanum laciniatum* Ait. se cultivă soiul local (populația "De Dunăre" (din anul 1973).

Particularități biologice. Specie perenă în zona de origine, *Solanum laciniatum* Ait. se comportă ca plantă anuală în climatul temperat. Are rădăcina adâncă și bine ramificată. Tulpina este înaltă de 1,5 - 2,5 m, ramificată, glabră sau slab pubescentă. Frunzele sunt dispuse altern, de formă ovală, adânc segmentate, obișnuit cu 3 - 5 lobi. Florile sunt grupate în raceme cu 5 - 15 flori, dispuse la subsuara frunzelor. Florile sunt de tipul 5, calicul gamosepal, corola gamopetală, de culoare violetă. Fructele sunt bace ovate dispuse în ciorchine. Bacele au 1,5 - 2 cm lungime, de culoare verde în prima fază, iar la maturitate sunt galbene - portocalii. Semintele sunt mici, de culoare brunie, bogate în ulei gras (cca. 20 %).

Cerințele față de climă și sol. Zârna australiană fiind plantă originară din zona subtropicală, este pretențioasă la căldură. Din determinările efectuate la Catedra de Fitotehnie a U.S.A.M.V. Cluj Napoca, s-a constatat că temperatura minimă de germinație a semințelor este de 8 - 9 °C, iar cea optimă de 27 - 30 °C. Plantele vegetează bine la temperaturi medii cuprinse între 18 - 22 °C. Planta

rezistă bine la înghețuri timpurii de până la -6 °C. Are cerințe ridicate față de umiditate, de aceea în sudul țării nu reușește decât în condiții de irigare. În zone ceva mai umede, se obțin producții bune și fără irigare, dacă cultura se realizează prin răsad. Pretinde soluri fertile, ușoare, profunde, bine drenate și afânate. Nu reușește pe soluri grele sau pe nisipuri sărace în elemente nutritive.

Zonare. Având în vedere cerințele termice ridicate, în cazul semănatului direct în câmp, reușește numai în zona sudică și vestică a țării, în condiții de irigare. E Păun și colab., 1983, recomandă cultivarea ei în județele Dolj, Arad, Bihor și în sectorul agricol Ilfov. Se poate cultiva și în zonele subumede (neirigat), însă numai prin răsad.

4.17.4.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Zărna austriană se cultivă ca plantă anuală, după cereale, leguminoase și alte plante (cu excepția *Solanaceelor*). Pe același teren poate reveni numai după 5 - 6 ani.

Loturile semincere se organizează separat de culturile pentru producția de materie primă vegetală. Aceste culturi se realizează prin răsad, urmând să se facă, în cursul vegetației, lucrări specifice lotului semincer.

Fertilizarea. Planta reacționează favorabil la fertilizarea cu azot, fosfor și potasiu asigurând sporuri de producție de herba (fosforul influențează favorabil fructificarea, sporind producția de sămânță) (A. Dumitrescu, 1980 și 1986). Se aplică doze de 40 - 60 kg/ha P_2O_5 și 30 - 40 kg/ha K_2O (sub arătură) și 80 - 100 kg/ha N (primăvara).

După A. Dumitrescu și colab., 1980, prezentăm influența fertilizării cu azot (4.17.4.1.), fosfor și potasiu (tabelul 4.17.4.2.) asupra conținutului de solasodină la zărna laciniată. Se constată că în special azotul sporește conținutul de principii active, urmat de fosfor și potasiu.

În tabelul 4.17.4.3. (după A. Dumitrescu și colab., 1981) se prezintă influența microelementelor aplicate la sămânță asupra producției și calității la *S. laciniatum* Ait. (media anilor experimentali). Producția de herba a fost influențată favorabil de Mg - 0,5 % și Mo - 0,5 %, iar solasodina s-a modificat mai puțin prin tratamentele aplicate (valorii mai mari la Mo 0,5 % și Mg - 0,5 %).

Tabel 4.17.4.1.
Influența dozelor de azot asupra conținutului
în solasodină la *Solanum laciniatum* Ait.

Doze de azot	Solasodină în herba uscată % raportat la M _t	
	N ₀ (M _t)	N ₁₀₀
N ₀	0,845	100
N ₅₀	0,93	110
N ₁₀₀	0,992	117
N ₁₅₀	1,097	130
N ₂₀₀	0,845	100

Tabelul 4.17.4.2.
Influența fertilizării cu P și K asupra conținutului
în solasodină la *Solanum laciniatum* Ait.

Combinația	Solasodina	
	% în i.u.	% M _t
P ₀ K ₀ (M _t)	0,891	100
P ₅₀ K ₀	1,008	113
P ₅₀ K ₅₀	0,927	104

Tabelul 4.17.4.3.
Influența microelementelor aplicate la sămânță asupra
producției și calității la *S. laciniatum* Ait.

Tratamentul	Conc. %	Herba uscată			Solasodină		
		q/ha	%	seminif	mg/100 g în h. u.	%	kg/ha
M _t	-	35,1	100	-	0,836	100	27,9
(tratat cu apă)							
Bo (tetraborat de sodiu)	0,2	36,8	104	-	0,874	104,5	33,4
Bo (tetraborat de sodiu)	0,4	34,9	99,4	-	0,666	79,5	23,2
Mg (sulfat de magneziu)	0,3	28,5	81,2	-	0,624	74,6	17,8
Mg (sulfat de magneziu)	0,5	44,7	127,4	**	0,782	93,5	35,4
Mn (sulfat de mangan)	0,5	34,2	97,4	-	0,644	77	32,2
Mn (sulfat de mangan)	0,8	35,3	100,6	-	0,848	101,4	31
Mo (molibdat de amoniu)	0,3	34,8	99,1	-	0,814	97,4	29,7
Mo (molibdat de amoniu)	0,5	43,5	123,9	**	0,849	101,6	36,2
Zn (sulfat de zinc)	0,4	36,4	104,6	-	0,762	91,1	28
Zn (sulfat de zinc)	0,6	35,4	100,9	-	0,923	110,4	32,4

Lucrările solului. Arătura se execută la adâncimea de 28 - 30 cm. Patul germinativ se pregătește cu cultivatorul înainte de semănat.

Sămânța și semănatul. Cultura de *Solanum laciniatum* Ait. se poate realiza prin semănat direct în câmp (în zonele mai calde ale țării) sau prin răsăd. În ambele cazuri, sămânța trebuie să aibă puritatea de 95 % (minimum 85 %), iar germinația de 75 % (minimum 65 %).

Semănatul direct în câmp se face în pragul iernii sau primăvara (în martie) (tabelul 4.17.4.4., după A. Dumitrescu și A. Milcu, 1981) asigurând 28 - 30 plante la m², cu semănători universale, la 62,5 cm între rânduri, iar pe rând la 5 - 6 cm. Adâncimea de semănat este de 2 - 4 cm, iar cantitatea de sămânță este de 3 - 4 kg/ha (amestecată în proporție de 1 : 2 cu nisip fin uscat și cu salată ca plantă indicatoare, circa 100 g sămânță) (A. Dumitrescu, 1988).

Tabelul 4.17.4.4.

Influența epocii de semănat asupra desimii plantelor și producției de herba la *S. laciniatum* Ait.

Epoca de semănat	Plante /m ²	Producția de herba uscată		
		q/ha	%	Dif.
Noiembrie I	26,5	33,4	100	-
Martie II	28,6	36,2	108	2,8
Aprilie III	16,1	23,4	70	- 10
DL 5%		9,7 q/ha		

Înmulțirea prin răsăd se practică pentru herba în zonele subumede și pentru producerea de sămânță (în toate zonele de cultură). Răsădul produs (în solarii sau răsădniță) se plantează între 20 - 30 aprilie (zone sudice) și 1 - 10 mai (zone subumede) la 60 cm între rânduri și 15 - 20 cm pe rând (L.S. Muntean, 1990).

Loturile semincere realizate prin plantarea de răsăd asigură producții semnificativ mai ridicate de sămânță decât semănatul direct în câmp (tabelul 4.17.4.5., după A. Dumitrescu și E. Păun, 1979) (valori medii pe anii 1976 - 1978). A. Dumitrescu, 1988, arată că sporurile la producția de sămânță (200 - 300 %) realizate la culturile prin răsăd, comparativ cu semănatul direct în câmp, compensează cheltuielile cu producerea răsădului. La culturile realizate prin plantat, înflorirea plantelor se petrece cu o lună mai devreme și bacele ajung la maturitate până toamna (*S. laciniatum* Ait. are o perioadă de vegetație lungă).

În zonele mai umede și răcoroase, înmulțirea prin răsăd se recomandă și pentru producția de herba (L.S. Muntean, 1990). În tabelul 4.17.4.6. (după Al. Salontai, L.S. Muntean și Sanda Cernea, 1979), prezentăm rezultatele privind modul de cultură a speciei

S. laciniatum Ait. în două zone pedoclimatice din Transilvania (Cluj-Napoca și Suatu). În ambele zone s-a dovedit mai rațională cultivarea speciei prin răsăd, care asigură două recolte de herba.

Tabelul 4.17.4.5.

Influența modului de cultură asupra producției de sămânță la zărna austriacă

Mod de cultură	Data înflorit	Producția de sămânță		
		kg/ha	Dif.	%
Semănat sub iarnă (XI)	8-10.VII	135	-	100
Plantat răsăd ep. I (15.IV)	25-27.VI	201	66	149
Plantat răsăd ep. II (10.V)	12-14.VII	123	12	91
DL 5%		57		

Tabel 4.17.4.6.

Influența modului de cultură asupra producției de herba proaspătă la *Solanum laciniatum* Ait. în două zone ecologice din Transilvania

Varianta	Zona mai umedă și răcoroasă (Cluj-Napoca)					Zona semiaridă de câmp a Transilvaniei (Suatu)				
	Recolta I 25.VI-1.VII		Recolta II 6.X		Total	Recolta I 25.VII		Recolta II 5.X		Total
	q/ha	semm	q/ha	semm		q/ha	semm	q/ha	semm	
	q/ha	semm	q/ha	semm	q/ha	q/ha	semm	q/ha	semm	q/ha
Sem. direct în câmp 2-4 °C	-	-	138,8	O	138,8	185	000	81	000	266
Sem. direct în câmp 5-7 °C	-	-	162,4	-	162,4	191	00	105,4	-	295,4
Sem. direct în câmp 8-10 °C	-	-	175,8	-	175,8	201,2	00	101,2	0	302,4
Pl. răsăd în ghivecc. 4 mai	161,6	xx	274,2	xx	435,8	342,1	xxx	168,2	xxx	590,3
Pl. răsăd în ghivecc. 14 mai	92,8	-	202,2	-	295	282,3	xx	111,6	-	393,8
Pl. răsăd obișnuit, 4 mai	85,2	-	197,5	-	282,7	-	-	-	-	-
Pl. răsăd obișnuit, 14 mai	80	-	132,2	O	212,2	-	-	-	-	-
X (M)	104,8	-	183,2	-	288	240,3	-	113,5	-	353,6
DL 5 %	33,8	-	45,3	-	79,1	27,5	-	10,2	-	37,7
1 %	48,8	-	62,3	-	111,1	37,7	-	15,2	-	52,9
0,1 %	71,7	-	103,6	-	175,3	51,4	-	24,4	-	75,8

Lucrările de îngrijire. Buruienile se combat prin prașile și pliviri. La culturile semămate, înainte de răsărire se poate folosi un erbicid de contact (Gramoxone 3 - 4 l/ha). Mana se combate prin tratamente cu Ortocid 0,5 %, Dithane M-45 0,2 % etc., iar gândacul din Colorado cu Danex 80 PS 1,2 kg/ha, Decis 2,5 CE 0,28 l/ha, Nogos 50 CE 0,1 % etc. (A. Dumitrescu, 1986). În sudul țării se irigă menținând solul la 70 - 80 % din capacitatea de câmp pentru apă.

În loturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave. De asemenea, se

recomandă o lucrare specială de ciupit (înlăturarea vârfului lăstarilor după ce plantele au format trei etaje de ramuri), pentru a limita creșterea vegetativă a plantelor (fructele formându-se pe etajele doi și trei), contribuind la grăbirea maturizării fructelor (A. Dumitrescu, 1988).

Recoltarea. Masa verde se recoltează la începutul fructificării primului racem. Plantele se taie cu cositori la cca. 20 cm de la sol pe timp frumos. Din porțiunea de tulpină rămasă plantele regenerează, putându-se lua 2 - 3 recolte de herba (iulie, august, septembrie).

În loturile semincere bacele se recoltează manual pe măsură ce acestea se colorează în galben - portocaliu, iar la începutul lunii octombrie (înainte de primele brume) se recoltează toate bacele care au dimensiunile caracteristice speciei (inclusiv cele verzi), deoarece la -4 °C celulele plantelor sunt distruse. (A. Dumitrescu, 1988). Bacele se așează în strat subțire (pe stelaje) și se țin până se colorează în portocaliu. Semintele se scot din fruct prin frecare pe site, ca și la semințele de tomate, apoi se usucă la 12 %.

Condiționarea. Uscarea herbei se poate face pe cale naturală (prima recoltă) la soare, pe platforme (betonate) în strat subțire întorcându-se de 3 - 4 ori ca să nu se încingă și ocrându-se de ploi. Uscarea artificială se face la 70 - 80 °C. Randamentul la uscare este de 5 - 7 : 1. După uscare, produsul se lasă o zi în vrac apoi se ambalează în saltele de pânză și se depozitează în încăperi uscate și curate.

Condițiile tehnice de recepție prevăd pentru produsul uscat ca impurități: părți din plante înnegrite, maximum 10 %, fructe zdrobite, înnegrite, seci maximum 0,5 %, corpuri străine organice maximum 1,5 %, cele minerale maximum 1,5 %, iar umiditatea maximum 13 %.

La produsul în stare proaspătă se admit ca impurități: părți din plantă îngălbenite - maximum 10 %, fructe zdrobite, seci, maximum 0,5 %; corpuri străine organice, maximum 1,5 %, minerale - maximum 0,3 %, iar umiditatea normală în momentul recoltării (fără urne de apă).

Producția care se obține de la cele 2 - 3 recolte (iulie, august, septembrie) este de 25 - 30 de tone produs proaspăt, respectiv 2 - 2,5 tone produs uscat.

S-a elaborat o tehnologie (de către Sklizkov și colab., 1975, citați de A. Dumitrescu, 1986), de obținere a sucului de herba proaspătă de *S. laciniatum* și folosirea acestuia în extragerea glucoalcaloizilor (Solasodină brută).

În loturile semincere, de pe un ha plantat cu răsad, se pot obține 1500 - 3500 kg bace din care rezultă 100 - 300 kg semințe (raport bace/semințe fiind de circa 14:1).

4.17.5. ARDEIUL IUTE DE CAYENNE (*Capsicum annuum* L. var. *cayenne*)

Fr: Piment de cayenne, Poivre de Cayenne; E: Pepper; G: Roter Pfeffer

4.17.5.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă o constituie fructele proaspete sau uscate (*Capsici Cayenne fructus*; *Capsici fructus acer*).

Fructul conține capsaicină, amida vanilinică a unui acid izodecenic, care dă gustul iute arzător, foarte pronunțat, simțit până la diluția de 1:2.000.000. Conținutul în capsaicină în fructe este de 0,1 - 0,5 %. Fructele de ardei iute au un conținut de cel puțin 150 mg % capsaicină (E. Coiciu și G. Racz, 1962). Alți compuși sunt : ulei volatil (cca 1,5 %), pigmentul capsantina (cca. 1 %), capsorubina, alcoolii polienici, care dau culoarea roșie a fructului, poliene galbene (zeaxantina, xantofila și criptoxantina), glicozizi flavonici, vitamina C (peste 0,1 %) , vitaminele A, B, amida acidului nicotinic, alcaloidul capsină etc. (N. Berkoff, 2002, U. Stănescu, 2004 etc.). Din ardeiul iute, Szentgyörgyi (1927 - 1932), a obținut pentru prima dată vitamina C în stare cristalizată (cca. 200 mg/kg), mult timp aceasta fiind principala sursă de obținere a vitaminei C.

Utilizări. Capsicina se utilizează sub formă de tinctură în freții, dureri reumatice, nevralgii, etc. Boiaua de ardei este un foarte răspândit condiment, având gust și aromă specifică, precum și o mare putere de colorare. Capsicina pe care o conține, în doze mici, mărește pofta de mâncare, stimulează secrețiile gastrice. În exces însă, este nocivă, producând gastrite, afecțiuni hepatice și renale.

Răspândirea. Specia este originară din America tropicală (Mexic, Brazilia) (E. Păun, 1995). Se cultivă în toate continentele, numeroase varietăți, ca plantă alimentară (legună) și condiment, precum și în scop medicinal (ardeiul iute și cel pentru boia). În aceleași scopuri este cultivat și în țara noastră.

Sistematică. Soluri. Specia cultivată este *Capsicum annuum* L., (fig. 4.17.5., după Flora României, vol. VII, 1960 și 4.17.5.a.,

original) în scop medicinal cultivându-se var. *cayenne*. Se menționează și faptul că în scop medicinal se folosesc ardeii iute și cel pentru boia, care aparțin varietății *longum* (U. Stănescu și colab., 2004). Denumirea genului se pare că derivă de la latinescul "*capsa*" = capsulă, cutie, cu aluzie la fruct (care însă este o bacă specială) (E. Ghișa, 1960).

La noi în țară din *Capiscium. annuum* L. var. *cayenne*, se cultivă soiul local (populația) "De Deta", din anul 1976.

Particularități biologice. *Capiscium annuum* L. var. *cayenne* este o plantă anuală, cu rădăcina pivotantă. Tulpină cilindrică, ramificată în partea superioară. Frunzele, dispuse altern, sunt simple, petiolate, cu limbul ovat lanceolat, marginea întreagă sau ușor sinuată. Florile sunt dispuse solitar sau 2 - 3 la locul de ramificare al tulpinilor. Caliciul este format din 5 - 7 dinți scurți, corola din 5 - 7 lobi lanceolați, androceul din 5 stamine, gineceul cu ovar superior (bi- sau tricarpetar). Fructul este o bacă cu caliciul persistent la bază, are forma conic alungită, de 5 - 12 cm lungime și până la 4 cm grosime, cu pericarpul lucios și roșu aprins, la maturitate. În interior, fructul prezintă un corp spongios pe care sunt inserate semințele și pereții despărțitori (septe) cu puncte glanduloase care conțin principiul activ (capsicina). Semințele sunt plane, reniforme, de cca 3 - 5 mm lungime.

Cerințe față de climă și sol. Este o plantă cu cerințe ridicate față de temperatură. Pentru creștere și dezvoltare pretinde temperaturi de 25 - 30 °C, sub 15 °C creșterea încetează, iar temperaturi peste 30 °C sunt dăunătoare fructificării. Cerințele față de apă sunt de asemenea mari, necesitând udări, carența de umiditate ducând la avortarea florilor. Are cerințe ridicate față de sol, dând rezultate mai bune pe terenul cu textură ușoară (tuto nisipos) și fertilizate rațional.

Zonare. Planta are cerințe ridicate față de climă și sol. Se recomandă cultivarea ei în județul Timiș (F. Crăciun și colab., 1977).

4.17.5.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Se cultivă după palte care lasă solul curat de buruieni. Pe același teren poate reveni numai după 6 ani.

Pentru obținerea de semințe se vor alege parcelele cu plante tipice, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea se face cu îngrășăminte chimice în doze de 20 - 30 kg/ha N, 50 - 80 kg/ha P₂O₅ și 30 - 40 kg/ha K₂O, (F. Crăciun și colab., 1977), fosforul și potasiul încorporate cu arătura, iar azotul primăvara la pregătirea terenului pentru plantare.




Fig. 4.17.5. *Capiscium annuum* L.:

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 25 - 30 cm și se menține curată de buruieni până la plantare, prin lucrări cu discul în agregat cu grapa cu colți.

Plantarea. Cultura se realizează prin răsăd, care se produce în răsădnie calde (ca și pentru alte plante termofile). Pentru 1 ha de cultură sunt necesari 100 m² de răsădnie calde (inclusiv suprafața pentru repicare). Semănatul în răsădnie se face în a doua jumătate a lunii martie. La 100 m² răsădnie se folosesc 2 - 2,5 kg sămânță. Prin amestecarea semințelor (5 ore) cu soluție de procaină (50 - 100 mg/l) se favorizează acumularea vitaminei C în fructele de ardei. Plantarea răsădului se face între 10 - 15 mai, la 25 cm între rânduri și la 20 cm între plante pe rând (F. Crăciun și colab., 1977).

Lucrările de îngrijire. În cursul vegetației se menține solul curat de buruieni prin prașile, ori de câte ori este nevoie (obișnuit, după udări). Pentru combaterea bolilor se fac stropiri cu zeamnă bordelează 0,5 - 0,7 %.

În loturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. Se recoltează fructele, egalonat (3 - 4 ori), când ajung la maturitatea industrială (au culoarea roșie). Fructele se strâng în lădițe sau în coșuri și se transportă la locurile de uscare.

Culturile pentru producerea de semințe se recoltează și se condiționează separat de culturile pentru producția de materie primă.

Condiționarea. Uscarea se face artificial la 50 - 60 °C, apoi se ambalează în saci de hârtie, care se păstrează în încăperi curate și bine aerisite.

Condițiile tehnice de recepție pentru produsul uscat prevăd ca impurități: fructe decolorate sau brunificate, maximum 3 %; corpuri străine nu se admit; iar umiditatea, maximum 14 %. La produsul proaspăt se admit ca impurități (fructe decolorate): maximum 1 %; nu se admit corpuri străine, iar umiditatea normală a produsului la recoltare (fără urme de apă).

Producția care se obține la ha este de 10 - 15 tone produs proaspăt, din care rezultă cca. 2 tone produs uscat.

4.18. FAMILIA SCROPHULARIACEAE

4.18.1. DEGETELUL LÂNOS

(*Digitalis lanata* Ehrh.)

Fr: Digitale lainense; E: Woolly foxglove;
G: Wolliger Fingerhut, Gelber Fingerhut

4.18.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Degetelul lănos a fost studiat și folosit în medicină numai din perioada primului război mondial (E. Coiciu, T. Săveanu, 1955). După cum menționează A. Mihalea, 1986 „deși specia este considerată un element al florei balcanice”, primele culturi experimentale s-au efectuat în SUA (California, 1917)”. În Europa (Germania, Austria, Elveția, Olanda, Franța, Rusia, Cehia și Slovacia) s-a introdus după al doilea război mondial, în timp ce s-au dezvoltat studiile farmacologice asupra ei, iar după 1945 se extinde și în alte țări datorită „creșterii incidenței și gravității bolilor cardiovasculare”. Același autor arată că în țara noastră primele culturi cu această plantă au fost realizate în anul 1945, iar după anul 1965 a avut loc o creștere simțitoare a suprafețelor cultivate. Cultura degetelului lănos s-a făcut în ritm mai lent, deoarece a fost recoltată din flora spontană, iar necesitățile pentru afecțiunile cardio - vasculare erau satisfăcute mai mult de *Digitalis purpurea* L.

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă o constituie frunzele (*Digitalis lanatae folium*) în stare proaspătă sau uscată.

Frunzele conțin heterozide (glicozide) cardionice de tip cardenolidic. Conținutul total de cardenolide în frunzele uscate de degetel lănos din flora spontană este de 0,4 - 0,7 %, iar la formele ameliorate ajunge până la 1,7 %, fiind mai mare decât la degetelul roșu. (V. Cucu și colab., 1982, V. Manero și colab., 2003; U. Stănescu și colab., 2004). Spectrul cardenolidelor este mult mai complex (cuprinde peste 70 glicozide) decât la degetelul roșu, conținând, pe lângă cardenolide din grupele A (cu aglicon digtioxigenină) și B (cu aglicon gitoxigenină) și cardenolide caracteristice din grupa C (cu aglicon digoxigenină) și din seria D (cu aglicon dignatigenină). Principalele glicozide sunt următoarele (V. Cucu și colab., 1982): din

seria A: lanatozida A (80 - 240 mg %), glucodigitoxigenin - glucometilozida (30 - 60 mg %), glucoevatomonozida (20 - 60 mg %), neoglucoedigifucosida (20 - 50 mg %) și glucodigifucosida (10 - 40 mg %); din seria B: digitalinum verum (20 - 120 mg %), glucogitorozida (20 - 120 mg %), glucolana - doxina (20 - 120 mg %), glucoverodoxina (20 - 120 mg %) și lanatozida B (10 - 50 mg %); din seria C: lanatozida C (80 - 240 mg %), care este cea mai importantă din tot complexul cardenolidic; neolanatozida C, digoxina etc.; din seria D: lanatozida D (2 - 10 mg %) etc., cuprinzând, în general, mai puține glicozide și în cantitate mică (sub 1 mg %). Pe lângă glicozidele enumerate, în fiecare grupă mai sunt și altele, însă în proporție mult mai redusă, de mai mică importanță. S-a constatat că frunzele bazale sunt mai bogate în cardenolide decât cele din vârf și celelalte organe ale plantei (I. Tomozei și colab., 1979, E. Vogel, M. Luckner, 1981). Conținutul în cardenolide este influențat și de tratamentele semințelor cu raze gama (I. Tomozei și colab., 1980). Factorii climatici (F. Meyer, 1973) și tehnologici condiționează conținutul în glicozide al frunzelor. Au fost izolate și alte cardenoide din *Digitalis lanata* Ehrh; digoxigenin - digitoxosido glucomethylsidosid; digoxigenin - bisdigitoxosido - glucomethylsidosid și diginatinogenin - digitalosid (D. Kruger și colab., 1983). Frunzele mai conțin, pe lângă glicozide, saponine, steroli, flavone, enzime, vitamina C (105 - 114 mg % în anul I și 73 - 93 mg % în anul al II-lea), săruri minerale etc. (V. Cucu și colab., 1982, A. Hiermann, 1982 etc.).

Utilizări. Acțiunea hetrozidelor (glicozidelor) din frunzele de degețel lănos este similară cu a celor din frunzele de degețel roșu. Sunt însă mai active (datorită componentilor și conținutului mai mare), mai termostabile și rezistente la acțiunea enzimatică. Lanatozidele au efecte mai rapide (se pot utiliza în cazuri de urgență, obținându-se efect în câteva minute), acțiunea farmacodinamică a lanatozidelor situându-se între preparatele din *Digitalis purpurea* L. și cele din *Strophantus* sp. (F. Crăciun și colab., 1977). În *Farmacopeea Română* figurează multe substanțe pure sau preparate din *Digitalis lanata* Ehrh: acetydigoxinum, deslanosidum (desacetyl lanatosidum C) digitoxinum, digoxinum, lanatosidum C, comprimata acetyl-digitoxini 0,2 mg, comprimata digoxini 0,25 mg, comprimata obducta lanatosidi C 0,25 mg, solutio digitoxini 0,1 %. Preparatele medicamentoase care conțin heterozide din degețelul lănos sunt prezentate în tabelul 4.18.1.1. (după U. Stănescu și colab., 2004).

Produsele pe bază de heterozide din degețel lănos se indică în toate formele de insuficiență cardiacă (cele injectabile în cazurile de urgență, când efectul se impune în câteva minute).

Tabelul 4.18.1.1.
Preparatele medicamentoase în care intră heterozide (glicozide)
din *Digitalis lanatae folium*

Preparate medicamentoase	Specificare (heterozide)
Corlan (soluție injectabilă 0,25 mg/ml)	Digoxozida
Digoxin (comprimat 0,25 mg; soluție injectabilă 0,25 mg/2 ml; soluție uz intern 0,5 mg/ml)	Digoxozida
Dilacor (comprimat 0,25 mg/ml; soluție injectabilă 0,25 mg; soluție uz intern 0,75 mg/ml)	Digoxozida
Lanoxin (soluție uz intern 0,05 mg/ml)	Digoxozida
Novodigal (comprimat 0,2 mg; soluție injectabilă 0,2 mg/ml și 0,4 mg/2 ml)	Digoxozida
Lanatozid C (drajeuri 0,25 mg)	lanatozida C
Deslanozid (soluție injectabilă 2 mg/ml)	desacetyl-lanatozida C
Lanitop	β -metildigoxină
Sandolan	α -acetyl digoxină
Allocor	β -acetyl digoxină
Novodigal	β -acetyl digoxină

Răspândire. Degețelul lănos este răspândit în sud - estul Europei și în Caucaz. La noi crește spontan în sudul țării în locuri pietroase, prin tufărișuri și poieni. Cerințele mari pentru frunzele acestei plante au condus la extinderea culturii ei în diferite țări europene: Olanda, Marea Britanie, Franța, Elveția, Austria, Germania, Cehia, Slovacia, România, Rusia, SUA etc.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Digitalis lanata* Ehrh. (fig. 4.18.1., după G. Răcz și colab., 1970 și 4.18.1.a., original). Alte specii importante din genul *Digitalis* sunt menționate la subcapitolul *Digitalis purpurea* L., *Digitalis lanata* Ehrh. are $2n = 56$ (48) (A. Laza și G. Răcz, 1975).

La noi în țară din specia *Digitalis lanata* Ehrh. se cultivă soiurile "Lanata 1" (din anul 1973) și "Tonic" (din anul 2000).

Particularități biologice. *Digitalis lanata* Ehrh. este plantă biennială sau perennă, formând, în primul an, o rozetă de frunze, iar în anul al doilea tulpina floriferă. Rădăcina este pivotantă, lungă de 25 - 30 cm și bine ramificată. Tulpina are înălțimea de 30 - 100 (150) cm, cilindrică, neramificată sau ramificată spre vârf, păroasă la bază și lănoasă în partea superioară. Frunzele din rozetă (în primul an) sunt alungit lanceolate, de 15 - 25 cm lungime și 2 - 3 cm lățime, cu margini întregi, slab ondulate, sau cu dinți slab evidențiați. Cele tulpinale sunt dispuse altern, lanceolate, sesile, semiamplexicaule, de

dimensiuni mai mici decât cele din rozetă (8 - 12 cm lungime și cca. 1 cm lățime), scăzând în dimensiuni spre vârf. Atât frunzele din rozetă cât și cele tulpinale sunt glabre și lucioase.

Florile, de 3 - 4 cm lungime, sunt grupate în raceme spiciforme terminale (lungi de 10 - 25 cm), păroase. Bracteele sunt lanceolate și păroase. Calicul are lăcinii lanceolate. Corola este gamopetală, zigomorfă, cu labiu superior format din două petale, iar cel inferior din trei petale, la exterior de culoare brun - gălbuie, la interior brun - ruginie, reticulată. Înfloarește din luna iunie în luna august. Fructul este capsulă ovoidă, biloculară, de cca. 1,3 cm lungime, cu calicul persistent. Semințele sunt ovoide, muchiate, ruginii, de cca. 1,4 mm lungime și 0,8 mm diametru, iar MMB de cca. 0,4 g (sunt mai mari decât cele de la *D. purpurea* L.).

Cerințele față de climă și sol. Degețelul lănos are cerințe pedoclimatice apropiate de ale degețelului roșu, cu unele deosebiri. Suportă temperaturi mai ridicate și rezistă mai bine la secetă decât degețelul roșu. Rezistența la iernare este mai bună decât a degețelului roșu. Reușește pe aceleași terenuri ca și degețelul roșu.

Zonare. Se poate cultiva aproape în toate zonele agricole din țară F. Crișciun și colab., 1077, dau ca zone foarte favorabile: Câmpia Crișurilor. Podișul Transilvaniei (județele Alba, Bistrița-Năsăud, Mureș și Brașov), iar ca zone favorabile Câmpia Bărganului și Câmpia Burnazului. A. Mihaile, 1986, recomandă cultivarea în zonele de silvostepă din S și V, precum și în zonele mai umede din centrul Transilvaniei și Moldovei. E. Păun și colab., 1983, arată că zona de cultură a degețelului lănos este în Câmpia Crișurilor, Podișul Transilvaniei, iar în condiții de irigare, în Câmpia Bărganului și Burnazului.

4.18.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Degețelul lănos, pentru producția de frunze, se cultivă ca plantă anuală. Se amplasează după cereale păioase sau prășitoare, putând reveni pe același teren după circa cinci ani. Încercările de cultură intercalată (cu *Datura innoxia*, *Althaea rosea* - *migra*, *Foeniculum vulgare* și *Valeriana officinalis*) au dus la rezultate slabe și neeconomice (F. Silva și colab., 1966). Aceiași autori au constatat și fenomenul de allelopatie dintre *D. lanata* și *D. innoxia*, scăzând conținutul în cardenolide la prima și dublându-se conținutul în alcaloizi la a doua.




Fig. 4.18.1. *Digitalis lanata* Ehrh.

Loturile semincere se amplasează separat de culturile pentru producția de frunze. Acestea se mențin în cultură și în anul al doilea de vegetație, când plantele formează inflorescențele.

Fertilizarea se face cu 50 - 60 kg/ha P_2O_5 (incorporat toamna) și 40 kg/ha N (aplicat primăvara devreme) (A. Mihalea, 1986). La degețelul lănos, îngrășămintele cu azot sporesc producția de frunze, iar cele cu fosfor, pe lângă creșterea producției de frunze, au rol și în acumularea principiilor active (A. Mihalea și colab., 1979, E. Păun și F. Silva, 1967 etc.).

Prezentăm după A. Mihalea și colab., 1979, influența azotului asupra producției de frunze uscate (tabelul 4.18.1.2.), asupra conținutului în lanatozida C (tabelul 4.18.1.3.) și asupra producției de lanatozida C (tabelul 4.18.1.4.) la *D. lanata* (în trei zone ecologice).

Tabelul 4.18.1.2.
Influența azotului asupra producției de frunze uscate (q/ha)

Agrofondul	Producția q/ha	Dif.	%	Semif.
FUNDULEA				
Neîngrășat N_{45} kg/ha	15,5 16,5	- 1	100 106	- -
DL 5‰=1,4 q/ha DL 1‰=2,3 q/ha				
MĂGURELE				
Neîngrășat N_{45} kg/ha	13,4 17,1	- 3,7	100 127	- *
DL 5‰=2,2 q/ha DL 1‰=4 q/ha				
SECUIENI				
Neîngrășat N_{45} kg/ha	15,1 16,5	- 1,4	100 109	- *
DL 5‰=1,2 q/ha DL 1‰=1,7 q/ha				

Lucrările solului. Arătura adâncă (de 25 - 28 cm) se întreține curată de buruieni, prin lucrări cu discuri urmat de grăpă. Trebuie să se acorde o atenție deosebită la pregătirea patului germinativ (bine mărunțit și nivelat) în cazul semănatului direct în câmp, folosindu-se în acest scop combinatorul sau cultivatorul în agregat cu grapa cu colți, urmând ca terenul să se tăvălugească (cu tăvălugul inelar) înaintea semănatului (pentru a limita adâncimea de semănat, semințele fiind foarte mici).

Sămânța și semănatul. Degețelul lănos se poate cultiva prin semănat direct în câmp sau prin răsad. Sămânța trebuie să aibă puritatea de 95 % (minimum 85 %), iar germinația de 65 % (minimum 50 %). Prevenirea atacului de boli (septorioză), se face cu Topsin M 70 (4 kg/t sămânță).

Tabelul 4.18.1.3.
Influența azotului asupra conținutului în lanatozida C (%)

Agrofondul	Conținut în lanatozida C mg la 100 g	Dif.	%	Semif.
FUNDULEA				
Neîngrășat N_{45} kg/ha	0,188 0,186	- -0,002	100 99	- -
DL 5‰=0,008				
MĂGURELE				
Neîngrășat N_{45} kg/ha	0,175 0,161	- -0,14	100 92	- -
DL 5‰=0,031				
SECUIENI				
Neîngrășat N_{45} kg/ha	0,156 0,168	- +0,014	100 107	- -
DL 5‰=0,021				

Tabelul 4.18.1.4.
Influența azotului asupra producției de lanatozida C (kg/ha)

Agrofondul	Producția de lanatozida C kg/ha	Dif.	%	Semif.
FUNDULEA				
Neîngrășat N_{45} kg/ha	2,91 3,07	- 0,16	100 105	- -
DL 5‰=0,36 kg/ha				
MĂGURELE				
Neîngrășat N_{45} kg/ha	2,34 2,75	- 0,41	100 117	- -
DL 5‰=0,44 kg/ha				
SECUIENI				
Neîngrășat N_{45} kg/ha	2,35 2,77	- 0,42	100 117	- -
DL 5‰=0,4 kg/ha				

Semănatul direct în câmp se face într-un teren bine mărunțit și nivelat. Perioada de semănat este toamna târziu (în pragul iernii), iar în zonele mai umede și primăvara devreme. Densitatea este de 16 - 20 plante/m² (după rărire) (A. Mihalea, 1986). Semănatul se face cu semănători universale, adaptate pentru semințe mici, la 50 cm între rânduri și adâncimea de 1 cm, folosindu-se 4 - 5 kg sămânță/ha, în amestec 1 : 1 cu material inert și cu plantă indicatoare - circa 60 - 70 g/ha mac sau salată.

În cazul înmulțirii prin răsad, pentru un ha (circa 200.000 fire de răsad) sunt necesare 100 m² paturi semicalde (semănat în 1 - 10 martie) sau 800 - 1.000 m² straturi reci (însămânțate în aprilie), urmând ca plantarea să se facă la începutul lunii mai (50/10 - 12 cm).

Lucrările de îngrijire. Degețelul lănos răsar greu și de aceea, se face o *prașilă oarbă* - după răsărirea plantei indicatoare sau un tratament cu un erbicid de contact (Roundup 3 l/ha, Basta 4 l/ha, Reglone 3 - 4 l/ha, Gramoxone 3 - 4 l/ha), cu 3 - 4 zile înainte de

răsărirea plantelor. În continuare se menține terenul curat de buruieni prin prașile și se răresc plantele la 10 - 12 cm pe rând. Pe vegetație se pot folosi erbicidele antigramineice Furore (2 l/ha) sau Fusilade (2 l/ha), când buruienile au 4 - 6 frunze (N. Ungureanu, 2000). În sudul țării, prin irigare, crește producția de frunze baze de 2 - 3 ori. Contra septoriozei se tratează cu Topsin M70 (0,2 %), iar contra antracnozei cu Dithane M 45 (0,2 %) (N. Ungureanu, 2000).

În loturile semincere, pentru a reduce pierderile cauzate de îngheț, toamna se va efectua o lucrare cu răria (E. Păun, 1995). În anul doi de vegetație se întreține cultura curată de buruieni, prin prașile între rânduri și pe rând și se face purificarea biologică, înlăturând plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. Frunzele se recoltază (prin tăierea cu secera), când ajung la maturitate (au vârsta de circa 90 de zile), pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua. Un număr corespunzător de frunze de circa 90 de zile se realizează în jurul datei de 1 august, iar până în octombrie se pot obține 2 - 3 recolte de frunze

Frunzele tinere și cele îmbătrânite de degețelul lănos, au 40 - 65 % din conținutul potențial de cardenolide, iar cele îmbătrânite sunt și depreciate morfologic. În tabelul 4.18.1.5. (după Silva și colab., citat de A. Mihailea, 1986) prezentăm dinamica conținutului în cardenolide în funcție de vârsta frunzelor la degețelul lănos.

La prima recoltare (luna iulie) se lasă vârful de creștere pentru a putea regenera planta, în vederea obținerii celei de a doua recolte (septembrie - octombrie). La prima recoltă se taie frunzele ajunse la maturitatea tehnică, iar la recoltarea de toamnă, întreaga rozetă bazală.

În lanurile destinate producerii de sămânță, recoltarea frunzelor în anul întâi se va termina mai timpuriu. Recoltarea semincierilor se efectuează în anul al doi de vegetație când circa 50 % din fructele de la baza inflorescenței s-au maturat (înaintea diseminării acestora). Se taie plantele cu secera, se leagă în snopi mici și se așază în glugi, iar după 4 - 8 zile se poate începe trectatul cu combina sau cu batoza (A. Mihailea, 1986). Sămânța se condiționează (cu vântuțori sau selector), se usucă în strat subțire, apoi se ambalează în saci de hârtie.

Condiționarea. După recoltare, frunzele se duc imediat la locul de uscare. Se pot usca pe cale naturală în încăperi uscate și curate, amenajate în acest scop, unde se așază frunzele în strat subțire (la m² cca. 1 kg frunze, uscarea durând cca. o săptămână). Pe cale artificială, uscarea se face la temperatura de 35 - 40 °C. Randamentul

la uscare este de 4 - 5:1. După uscare frunzele se ambalează în sacetele și se păstrează în încăperi uscate și curate.

Tabelul 4.18.1.5.

Vârsta frunzelor, zile	Cardenolide totale			Lanatozid C		
	mg/100 g	d	%	mg/100 g	d	%
60	1.334	-	100	0.154	-	100
90	1.588	0.234	119	0.188	0.033	121
110	0.833	-0.501	62	0.097	-0.057	62

Condițiile tehnice de recepție pentru produsul uscat prevăd un conținut de lanatozid C de minimum 0,15 %, ca impurități: frunze brunificate sau pătate, maximum 2 %, frunze mai mici de 7 cm, maximum 3 %, corpuri străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 1 %, iar umiditatea maximum 10 %.

La produsul în stare proaspătă, conținutul de lanatozid C trebuie să fie de minimum 0,03 %; ca impurități se admit frunze brunificate sau pătate, maximum 2 %, frunze mai mici de 7 cm, maximum 3 %; corpuri străine organice, maximum 0,1 % cele minerale, maximum 0,2 %, iar umiditatea normală a produsului proaspăt recoltat, fără urme de apă pe frunze.

Producția de frunze ce se obține anual la ha este de 7 - 9 tone frunze verzi (1,5 - 2 tone frunze uscate). A. Mihailea, 1986, arată că, în condiții de irigare, se pot obține până la 9 - 12 t/ha frunze proaspete.

În loturile semincere se pot obține 600 - 700 kg/ha sămânță de degețel lănos

Observație *D. lanata* Ehrh fiind plantă toxică, se iau măsurile de protecție a căilor respiratorii și a tegumentelor în timpul lucrărilor de întreținere, recoltare, uscare și ambalare recomandate și la alte plante toxice (*Solanaceae* etc.) și la *Digitalis purpurea* L.

Frunzele de *Digitalis lanata* Ehrh. se aseamănă cu cele de *Plantago lanceolata* L. La aceste specii operațiunile de uscare și ambalare trebuie să se facă în locuri separate, pentru a nu se impurifica produsele.

4.18.2. DEGEȚELUL ROȘU (*Digitalis purpurea* L.)

Fr: Digitale pourpre; E: Purple foxglove, Foxglove;
G: Roter Fingerhut, Purpurtoter Fingerhut

4.18.2.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Informații referitoare la degețel se întâlnesc începând din sec. I e.n. în scrierile lui Dioscorides și Pliniu cel Bătrân (A. Mihalea, 1969). Denumirea genului derivă de la latinescul "*digitus*" = deget, degetar, cu referire la forma corolei (I. Grințescu, 1960). Denumirea de *Digitalis* a fost dată de Tragus în 1535 (Klaus - Tylor) sau de Fuchs în 1542 - 1543 (A. Mihalea, 1969). Mențiuni referitoare la degețelul roșu se găsesc în lucrările medicilor din Țara Galilor (Anglia) din anul 1250. Degețelul roșu este descris botanic de Fuchsius (1542), care l-a numit *Digitalis purpurea* (datorită aspectului și culorii florilor), studiile sistematice privind compoziția chimică încep din anul 1820, cu rezultate notabile realizate de Nativelle (1868), Kiliani (1891), Stoll (1938) și Hoack (1956) etc. (V. Istudor 1998). Deși unele efecte benefice ale degețelului roșu sunt semnalate în primele mențiuni despre el, numai după izolarea digitalinei pure, sunt evidențiate proprietățile sale cardiotonice. După cum menționează St. Gavrilescu și colab., 1978, administrarea documentată a digitalei în insuficiența cardiacă a fost făcută de medicul William Withering (în decembrie 1775). Înainte se folosea în medicina empirică în tratamentul epilepsiei, scrofulozei și a dispneei. Studiile lui Eggleston (1913 - 1920) cu preparate standardizate au pus bazele concepțiilor contemporane asupra digitalizării. St. Gavrilescu și colab., 1978, arată că în România introducerea și fundamentarea terapiei digitale a fost făcută de C.C. Iliescu și B. Theodorescu, fiind continuată de discipolii lor. Astăzi digitalizarea se face pe baze științifice, preparatele digitale fiind frecvent prescrise în clinică și terapia ambulatorie.

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă o constituie frunzele (*Digitalis purpureae folium*) în stare proaspătă sau uscată, fără pețiol. S-a constatat că frunzele de cca. 90 zile au conținutul cel mai ridicat în principii active (F. Silva și A. Mihalea, 1968, A. Mihalea, 1969). Frunzele conțin compuși steroidici, acțiunea cardioactivă fiind dată de heterozide (glicozidele) cardiotonice din grupa cardenolidelor. Din frunzele de *D. purpurea* au fost izolate

peste 30 heterozide cardiotonice, în frunzele uscate conținutul variind între 0,1 - 0,4 % (B. Fansey și colab., 2003, U. Stănescu și colab., 2004). V. Cucu și colab., 1982, grupează glicozidele cardiotonice după agliconul lor în patru serii (A, B, C, D): seria A (glicozide cu aglicon digitoxigenină) din care s-au izolat și identificat purpureaglicozida A, digitoxina (digitalina) etc.; seria B (cu aglicon gitoxigenină) din care fac parte purpureaglicozida B, gitoxina, glucogitorozida, gitaloxina, strospezida, glucoverodoxina, verodoxina etc.; seria C (cu aglicon digoxigenină); seria D (cu aglicon diginatină); seria E (dată de unii autori) care cuprinde glicozidele cu aglicon 16 - formilgitoxigenină (gitaloxigenină), aparțin de fapt seriei B. Glicozidele cardiotonice din degețelul roșu aparțin seriei A și B, raportul între ele variind în limite largi, în flora spontană predomină cele din seria B, la formele cultivate, predomină cele din seria A. După diverși autori, conținutul în diferite glicozide este: purpureaglicozida A 9,6 - 120 mg %; digitoxina 2 - 140 mg %; purpureaglicozida B 3 - 80 mg %; glucogitaloxina 3 - 100 mg %; gitoxina 2 - 97 mg %; gitaloxina 1 - 82 mg %; strospezida 2 - 20 mg %; glucoverodoxina 5 - 40 mg %; verodoxina 2 - 20 mg % și altele cu conținut sub 5 mg %. Diferențele mari în conținutul glicozidelor secundare (digitoxina, gitoxina, gitaloxina) sunt condiționate și de transformările suferite de glicozidele primare (purpureaglicozida A, purpureaglicozida B, glucogitaloxina) în timpul uscării și prelucrării. Se apreciază că în planta proaspătă se găsesc numai glicozide primare (în frunzele stabilizate acestea reprezintă 70 - 100 % din total). În frunzele uscate s-au semnalat și agliconii glicozidelor (digitoxigenina, gitoxigenina, gitaloxigenina), în proporție de 0,1 - 1 mg % (V. Cucu și colab., 1982). Principiile active se acumulează intens în decada a II - de vârstă (mijlocul lunii august) și ating un maxim spre sfârșitul lunii septembrie (F. Silva, A. Mihalea, 1968). Frunzele conțin și glicozide steroidice necardioactive, steroli, ceruri, glucide, compuși polifenolici (flavone), antrachinone, acizi fenolici, enzime, mucilagi, săruri minerale etc. Florile de degețel roșu conțin numeroși derivați polifenolici, aparținând pigmenților antocianici, flavonelor etc. (R.R. Paris și colab., 1966).

În *Farmacopeea Română* figurează: *Digitalis purpureae folium* (frunză de digitală), cu o activitate cardiotoxică corespunzătoare la cel puțin 10 U.I./g; *Tinctura Digitalis* (tinctura de digitală), cu o activitate cardiotoxică de 1 U.I./g; *Digitalis purpureae pulvis tirtatus* (pulbere titrată de digitală), cu o activitate cardiotoxică corespunzătoare la 10 U.I./g.

Utilizări. Glicozidele cardiotonice produc o creștere a puterii de contracție a miocardului, urmată de o rărire a bătailor inimii. Se folosesc în insuficiența cardiacă cronică. Se utilizează în diverse produse românești și străine. Astfel, produsul românesc „*Digitalis*”, comprimate conținând 0,1 g pulbere de frunze de degetel roșu, are acțiune cardiotonică (datorită în special digitoxinei), efect cu instalare lentă, prelungită, indicat în toate formele de insuficiență cardiacă, în special în cele însoțite de fibrilație atrială. Produsul românesc „*Digitalină*” (soluție hidroalcoolică glicerinată pentru uz intern, conținând 1 % digitoxin cristalizată) este un tonicardiac, cu instalare lentă, prelungită, indicat în insuficiențe cardiace (congestivă, cele cu ritm normal sau puțin accelerat, cea din infarctul miocardiac, a copiilor și bătrânilor).

Degetelul roșu este cunoscut și ca plantă ornamentală sau cu utilizare mixtă, medicinală și ornamentală (A.M. Costea, 2006 etc.).

Pentru obținerea unor forme de degetel cu utilizare mixtă (ornamentală și medicinală), se recomandă aplicarea selecției pentru conținutul total de glicozide în cadrul celor mai ornamentale populații, dat fiind că acesta nu este corelat negativ cu caracterele inflorescențelor și florilor (A.M. Costea, 2006). Aceeași autore arată că utilitatea unor astfel de cultivare, pentru scopuri ornamentale, ar putea fi limitată doar la culturi compacte pentru flori tăiate, frunzele fiind apoi folosite pentru extragerea glicozidelor.

Răspândire. Degetelul roșu este o plantă spontană în vestul Europei, partea de nord a Spaniei până în Norvegia, în special în Germania (V. Cucu și colab., 1982). Nu s-a întâlnit în zona mediteraneană, de aceea nu a fost cunoscută de vechii greci, de romani și medicii arabi. Pentru a asigura cerințele pentru necesitățile terapeutice, se cultivă în numeroase țări din vestul Europei (Olanda, Marea Britanie), în țările balcanice, Rusia, SUA etc., țări care sunt principalii furnizori ai produsului vegetal.

Sistematică. **Soiuri.** Specia cultivată este *Digitalis purpurea* L. (fig. 4.18.2., după G. Răcz și colab., 1970 și 4.18.2.a., original). *D. purpurea* L. are $2n = 56$ (48, 112) (A. Laza și G. Răcz, 1975). În cadrul genului *Digitalis* se întâlnesc și alte specii: *D. lanata* Ehrh (care este prezentată separat): *D. grandiflora* Mill. (*D. ambigua* Murr.), asemănătoare cu *D. purpurea* L., având însă corola galbenă (la interior brună); *D. ferruginea* L., asemănătoare cu *D. lanata* Ehrh., dar are tulpina glabra și corola brun roșcată. Speciele de *Digitalis* se încrucișează ușor, hibrizii au fost descriși de Crișan, 1960 (citât de E. Coicui și G. Răcz, 1962).




Fig. 4.18.2. *Digitalis purpurea* L.

La noi în țară, se cultivă din specia *Digitalis purpurea* L. soiul local (populația "De Măgurele" din anul 1975).

Particularități biologice. *Digitalis purpurea* L. este plantă biennială, care formează în primul an o rozetă de frunze și în anul al doilea tulpina floriferă. Rădăcina este pivotantă, de 20 - 30 cm lungime și 1 cm grosime, cu numeroase ramificații. Tulpina are înălțimea de 30 - 100 (150) cm, grosimea de 2 - 3 cm, neramificată, păroasă. Frunzele din rozetă, în primul an, sunt pețiolate cu limbul oval - lanceolat de 15 - 25 cm lungime și 8 - 10 cm lățime, marginea crenelată, fața superioară zbârcită și cu peri scurți (rari), iar fața inferioară pubescentă și cu o rețea de nervuri proeminente. Frunzele tulpinale sunt dispuse altern, cele inferioare sunt pețiolate, cu dimensiunile apropiate, cu ale celor din rozetă, cele superioare sunt sesile mai mici, cu limb alungit - ovat sau eliptic - lanceolat. Florile sunt dispuse într-un racem terminal, orientate într-o direcție. Sunt prinse pe un pedicel de 1 - 1,5 cm. Caliciul este gamosepal cu 5 lacinii ovate - lanceolate. Corola este gamopetală, zigomorfă, de 3,5 - 5 cm lungime, cu labiul superior rotunjit (format din două petale) și cel inferior trilob (trei petale, din care cea din mijloc mai mare), de culoare roșie - purpuriu la exterior, iar în interior roză, păroasă și cu pete brunii, înconjurate de un cerc alb. Androeul este format din 4 (5) stamine, cele inferioare mai lungi (3 cm), cele superioare mai scurte. Gineceul are un ovar superior și un stil lung (2 cm). Înfloreste din iunie până în august. Este plantă alogamă (datorită protandriei și macrostiliei), autopolenizarea având loc numai accidental (A. Mihalea, 1969). Fructul este o capsulă ovoidală, biloculară, de cca. 1 cm lungime, cu caliciu persistent. Semintele sunt mici (cca. 1 mm lungime), ovoidal - prismatice, suprafața reticulată, culoare brun - roșcată, iar MMB de cca 0,07 g.

Cerințe față de climă și sol. Semintele răsar la 22 - 26 °C în 6 zile, iar la 18 °C, în 12 - 14 zile (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Semănată direct în câmp, toamna târziu sau primăvara devreme, începe răsărirea la temperaturi de peste 5 °C (în masă la 10 °C). În prima parte a vegetației are creștere lentă (existând pericolul îmburuienării), însă când temperatura trece de 10 °C, creșterea se accelerează. Plantele ierneză bine la temperaturi de până la -20 °C (acoperite de zăpadă), dar la temperaturi de -30 °C pier în mare proporție (80 - 100 %) chiar și acoperite de zăpadă. În cursul vegetației, pretinde temperaturi moderate. Față de umiditate are cerințe destul de ridicate, însă excesul de apă în sol scade rezistența la iernare. Merge bine în zone cu precipitații de cca. 600 mm anual și cu

umiditate atmosferică ceva mai ridicată (cca. 70 %). Degețelul roșu are cerințe ridicate față de lumină, fiind o plantă heliofilă. Lumina favorizează creșterea plantei și acumularea principiilor active. Merge pe diferite tipuri de soluri, având o mare plasticitate în acest sens, însă producții mai bune se obțin pe soluri fertile, structurate și drenate, care se încălzesc mai ușor.

Zonarea. Planta apare spontan în zona pădurilor, în luminișuri, în condiții de soluri pietroase, sărace, cu apă în sol mai puțină, însă cu umiditate atmosferică mai ridicată (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Având în vedere cerințele ecologice ale plantei, s-a luat în calcul în zona de dealuri, însă cu ierni mai blânde. Zonarea dată de F. Crăciun și colab., 1977, este în nordul Moldovei (județele Boroșani și Suceava), Transilvania (județele Brașov și Hunedoara) și în Subcarpații Meridionali (județele Dâmbovița, Argeș și Vâlcea). A. Mihalea, 1986, arată că degețelul roșu având cerințe mai reduse față de temperatură și mai ridicate față de umiditate, se recomandă cultivarea în zone umede și răcoroase, iar în sud numai în condiții de irigare.

4.18.2.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Degețelul roșu, pentru producția de frunze, se cultivă ca plantă anuală. Se amplacează după plante care lasă solul curat de buruieni (cereale păioase sau prășitoare bine întreținute). Pe același teren se poate cultiva numai după circa 5 ani.

Pentru producerea materialului de semănat se organizează loturi semincere ca și la degețelul lănos, cultura menținându-se și în anul al doilea de vegetație (când se formează tulpina floriferă).

Fertilizarea se face cu 50 - 60 kg/ha P_2O_5 (încorporat cu arătura) și 40 - 50 kg/ha N (primăvara devreme). A. Mihalea 1968 evidențiază rolul fosforului în sporirea producției de frunze și creșterea conținutului în cardenolide, depășind, în acest sens, azotul și potasiul.

Lucrările solului sunt ca și la degețelul lănos.

Sămânța și semănatul. Degețelul roșu se poate înmulți prin semănat direct în câmp sau prin răsad. Sămânța trebuie să aibă puritatea de 95 % (minimum 85) și germinația de 65 % (minimum 50 %).

Degețelul roșu se însămânțează direct în câmp toamna târziu sau primăvara devreme (în zonele mai umede), cu semănători universale adaptate pentru semințe mici. Se asigură după rărire 15 pl/m². Distanța dintre rânduri este de 50 cm, adâncimea de semănat

circa 1 cm, iar cantitatea de sămânță 3 - 4 kg/ha, amestecată cu material inert în proporție de 1 : 1 și cu o plantă indicatoare - mac sau salată - 60 - 70 g sămânță/ha (A. Mihalcea, 1986).

La înmulțirea prin răsăd, cele circa 150 mii fire pentru 1 ha se obțin de pe 100 m² paturi semicalde (5 g sămânță/m²), sau de pe 1.000 m² straturi reci (1 g sămânță/m² semănată în august). Răsădul se plantează în câmp, în luna mai, la 50/15 - 20 cm.

Influența desimii de plantare asupra producției de frunze la gegetelul roșu se prezintă în tabelul 4.18.2.1. (după A. Mihalcea 1986).

Tabelul 4.18.2.1.

Distanța de plantare, cm	Destinca (nr. de plante/ha)	Producția de frunze uscate		
		q/ha	d	%
50/30	66 666	10,9	-	100
60/20	83 333	11,3	0,4	103,5
50/20	100 000	14,6	3,7	133,9
		semnificația		
		DL 5% = 1,12 q/ha		
		DL 1% = 1,51 q/ha		
		DL 0,1 = 1,96 q/ha		

Lucrările de îngrijire. După răsărirea plantei indicatoare se face prima prașilă. Cu 3 - 4 zile înainte de răsărirea culturii, se poate face un tratament cu un erbicid total (Roundup, Bata, Regione, sau Gramoxone), iar pe vegetație erbicide antigraminice (Fusilade sau Furore), în dozele și modul de aplicare prezentat la degețelul lănos. După răsărirea plantelor se face rărirea la 15 - 20 cm între plante pe rând, apoi se efectuează prașile și pliviri. Combaterea bolilor (septorioză, antracnoză) se face ca la degețelul lănos.

În loturile semincere, lucrările de îngrijire (în primul și al doilea an) și purificarea biologică sunt ca și la degețelul lănos. Unii autori recomandă ciupirea vârfului tulpinii, când se deschid primele flori (F. Crăciun și colab., 1977). Înflorirea și coacerea fructelor începe de la baza înflorescențelor spre vârf.

Recoltarea. Se recomandă recoltarea frunzelor în anul întâi de vegetație, la vârsta de 80 - 90 de zile (F. Silva și A. Mihalcea, 1968, A. Mihalcea, 1986). În această fază, frunzele sunt mari și numeroase, iar conținutul în principii active este cel mai ridicat. Recoltarea se face pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua. Se taie cu secera frunzele exterioare ale rozetei, lăsându-se vârful de creștere pentru a regenera planta. Se pot lua anual 2 - 3 recolte de frunze, la ultima recoltare tăindu-se întreaga rozetă. Producția maximă de cardenolide la ha se obține când în recoltă predomină frunzele în vârstă de 80 - 100 de zile (F. Silva și A. Mihalcea, 1968; A. Mihalcea, 1969). S-a constatat că în privința fluctuației diurne, acumularea cardenolidelor în frunze crește

spre prânz, îndeosebi pe timp însorit; astfel că pe timp însorit și cald, durata recoltării se poate întinde pe timp de 6 ore (A. Mihalcea, 1969).

În loturile semincere nu se recoltează frunzele în anul al doilea de vegetație. Tăierea tulpinilor semincere se face când o treime din fructe sunt coapte (au culoarea cărămizie), se leagă în snopi, care se așează în piramide (5 - 6 snopi), apoi se treieră, iar semințele se condiționează ca și la degețelul lănos.

Condiționarea. După recoltare, frunzele se duc la uscare, ce se poate face pe cale naturală (în încăperi uscate și aerisite, în strat subțire, întorcându-se până la uscare) sau pe cale artificială la 35 - 40 °C (la temperaturi mai mari scade conținutul de principii active). Frunzele uscate trebuie să aibă culoarea verde, fără pete. Rândamentul la uscare este de 4 - 5:1.

După uscare, frunzele se ambalează în sacule, păstrându-se în încăperi curate și uscate. Modul de conservare și uscare influențează calitatea frunzelor. La frunze de *D. purpurea* L. cu 10 % umiditate, s-a constatat că, după 8 luni, pierd 35 - 70 % din calitatea lor inițială (T. Goia și colab., 1967).

Condițiile tehnice de recepție prevăd pentru produsul uscat următoarele impurități: frunze brunificate, maximum 5 %, frunze sub dimensiunile admise, maximum 0,5 %, resturi de tulpini și pețiol maximum 5 %; corpi străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 0,25 %, iar umiditatea, maximum 8 %.

Pentru produsul în stare proaspătă se cere să aibă impurități: frunze brunificate, maximum 5 %, resturi de tulpini și pețiol, maximum 5 %, frunze sub dimensiunile admise maximum 0,5 %; corpi străine organice, maximum 0,1 %, cele minerale, maximum 0,05 %, iar umiditatea normală la recoltare, fără urme de apă pe produs.

Producția de frunze proaspete este de 5 - 6 tone la ha, respectiv 1,5 - 2 tone/ha frunze uscate.

Producția de sămânță de degețelul roșu este de circa 400 kg/ha. *Observație* Degețelul roșu, fiind plantă toxică, trebuie luate măsuri speciale de protecție a căilor respiratorii și a tegumentelor, în perioada lucrărilor de întreținere, recoltare și manipulare, recomandate și la alte specii (*Solanaceae* etc.). Primele simptome de intoxicare sunt scăderea numărului băților inimii, tulburări vizuale, greață (G. Răcz, și colab., 1970). Primul ajutor constă în spălături gastrice cu suspensie de cărbune activ sau folosirea unor purgative. În intoxicații mai grave, se impune repaus absolut până la sosirea medicului.

4.19. FAMILIA LAMIACEAE (LABIATAE)

4.19.1. MENTA ȘI MENTA CREATĂ (*Mentha piperita* L. și *Mentha crispa* L.)

Fr: Menthe poivrée; E: Peppermint and Common spearmint;

G: Pfefferminze und Echte Krauseminze

4.19.1.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Menta este cunoscută din antichitate fiind amintită în scrierile grecești (*mintha* sau *minthae*) de Dioscorides etc. și în cele latinești (*mentha*, *menta*) de Columella, Plinius și alții (M. Gușuleac, 1961). În scrierile antice au fost menționate însușirile sale terapeutice. În "Papyrus Ebers" se arată că menta a fost folosită în Egipt cu 1550 ani î.e.n. (E. Păun, 1975). În Japonia s-a cultivat din vechime *Mentha arvensis* var. *piperascens* Mal. (menta japoneză). Japonia este prima țară din lume care a exportat mentol (1883), după cum menționează Margarita Pandero, 1959 (citată de E. Păun, 1988).

Menta (Izma bună, Mînta) cultivată este un hibrid steril între două specii de mentă, care a apărut probabil spontan, fiind evidențiat în Anglia (regiunea Mitcham), în anul 1675, de către un cultivator englez (V. Velican, 1965). Menta s-a răspândit întâi în Anglia, în special în regiunea Mitcham (1750), apoi în alte zone pe glob (sub numele de mentă Mitcham). Din acest considerent i se mai spune și mentă englezească (Mitcham). Se pare că acest hibrid s-a format și în bazinul mediteranean (V. Cucu și colab., 1982), însă culturile de mentă răspândite azi pe glob se consideră că provin prin înmulțire vegetativă din hibridul apărut în Marea Britanie. Menta (izma bună) este una din cele mai răspândite plante medicinale și aromatice, cultivându-se pe tot globul. Menta (izma) creată se cultivă pe suprafețe mai mici.

La noi în țară, menta a fost între primele plante aromatice și medicinale luate în cultură. Prima cultură experimentală de mentă a fost făcută de B. Pater în anul 1908, la Cluj, pe o suprafață de 88 m² (fapt evidențiat și de E. Păun, 1988, după B. Pater, 1914) menționându-se că stolonii au fost obținuți din Ungaria de la preotul Josef Agnelli din Csări, pentru care această formă de mentă a figurat în diferite lucrări ca *M. piperita* var. *agnelliana*. Mai târziu, menta s-a

cultivat în scopuri industriale în Țara Bârsei, în jurul Brașovului, iar la Bod a luat finită o distilerie. În anul 1926, prin firma „Leo” (din Dresda) filiala Brașov, (specializată în produse dentrice), se înființează, după cum arată E. Păun, 1988, „pe terenurile desecate de lângă Bod, prima plantație de 5 ha cu stoloni de *M. piperita*- Mitcham adusă din Anglia și Italia”. Același autor menționează că în Țara Bârsei, în 1929, suprafața cultivată cu mentă a ajuns la 239 ha, iar ulterior (1930 - 1935), menta Mitcham este cultivată și la Orăștie (de farmacistul Andrei Farago).

Materia primă și compoziția chimică. *Mentha piperita* L. se cultivă pentru frunze (*Menthae folium*; *Menthae piperitae folium*) sau partea aeriană, frunze și tulpini subțiri, în stare proaspătă (*Menthae herba recens*; *Menthae recens*) sau uscată (*Menthae herba*), care conțin ulei volatil, fiind folosite în industria farmaceutică, cosmetică, alimentară etc. De la *Mentha crispa* L. se utilizează herba (*Menthae crispae herba recens*) sau frunzele (*Menthae crispae folium*). Produsul sitat (*Menthae herba bruch*) cuprinde fragmente de frunze ce trec prin sita de 1 - 1,5 mm.

Menta (izma bună) are conținutul de ulei volatil în funcție de varietate, soi, proveniența și condițiile de cultură. Frunzele proaspete conțin circa 0,2 - 0,4 % ulei volatil, iar cele uscate 1 - 3 % (V. Istudor 2001, V.D. Zheljazov, 2005). În alte lucrări se arată că în stare uscată, frunzele conțin între 0,5 - 4 % ulei volatil (V. Cucu și colab., 1982, U. Stănescu și colab., 2004 etc.) Herba are conținutul de ulei volatil și în funcție de înălțimea de tăiere: la 10 cm de sus conține 2,25%, iar la 30 cm de sus are 1,75 % ulei volatil. Tulpina cu cât este mai groasă cu atât este mai săracă în ulei volatil. S-a constatat că și frunzele au conținut diferit în ulei volatil, cele mai tinere (frunzele superioare) conțin de 1 - 2 ori mai mult ulei volatil decât cele inferioare. În uleiul volatil de mentă, în general, s-au identificat cca. 40 de compuși, iar la cel din țara noastră, 26 compuși chimici (E. Păun, 1975). Componentul principal al uleiului volatil de mentă este mentolul, al cărui conținut total (liber și legat) este cuprins între 47 - 73,6 %, urmat de mentonă (7,4 - 25,4 %) și mentofuran (2 - 5 %, în cantitate mare imprimă gust amăru), precum și cantități mici de alți compuși: pinen, felandren, limonen, mircen, cadinen, cineol, aldehida izobutirică și izovalerică, acizii acetic și izovalerianic, timol etc. (V. Cucu și colab., 1982). În herba predomină mentona în faza vegetativă, iar în cea generativă, predomină mentolul. La plantele umbrite și în anii ploioși se reduce proporția de mentol și crește cea de mentonă. Conținutul de mentol la mentă este determinat și de

Mentha cretață conține cca 1 - 3 % ulei volatil (E. Grigorescu și colab., 2001), în care compuşii principali sunt carvona (până la 70 % din ulei) și linalool (până la 65 % din ulei), fiind lipsit de mentol. Conținutul în carvona este foarte diferit între biotipuri (H. Rothbach și A. Kraus, 1971). Prezentăm în tabelul 4, 19.1.1. (după C. Barbu, 1996) conținutul de ulei volatili și carvona la soiurile *Mencris* și *Record* (care aparțin speciei *M. crispata* L.).

Tabelul 4.19.1.1.

Socii	Conținutul în ulei volatili (ml %)		Conținutul în carvoni (%)			
	SCPMA Fundulea	Rețeaua ISTIS	Limita de variație	Medie	%	
						Medie
Record	4,02	151	3,8	126	60,9	90
Monetris	2,66	100	3	100	63,2-70	67,4 100

diferite cearuri medicinale: Antiasmatic, Anticolitic, Antidiareic, Dietetic, Gastric, Împotriva tulburărilor cardiace, Hepatic nr. 2 etc. Datorită conținutului ridicat în materii tanante a frunzelor (până la 8 %), acestea au acțiune antidiabetică (E. Păun, 1975). Uleiul volatil de mentă intră în diferite produse farmaceutice românești: **Carbocif, Colebil, Boldocolin, Inhalant, Saliform** etc. Frunzele de mentă, extracte, ulei volatil sau componente ale acestuia intră în diferite preparate industriale, cum sunt medicamente colagoge și pentru căile biliare (**Rowachol, Chologogum, Natterman**), remedii gastrointestinale (**Ulceroat, Iberoast, Gastricard**), tratamentul unor afecțiuni respiratorii (**Inhalant, Meteorin**), hepatice sau hepato-sedative (**Esberi-Nervin**). Se folosește și corectiv pentru gustul unor medicamente, în frecții, inhalatii etc. Uleiul volatil și mentolul, administrate extern, au acțiune anestezică, fiind folosite în dermatologie și otorinolaringologie.

Mentolul este larg utilizat la prepararea unor paste de dinți și ape de gură, datorită proprietăților răcoritoare, antiseptice și de corectare a gustului și mirosului.

Uleiul volatil de mentă se folosește pe scară largă în industria alimentară, la prepararea lichiorurilor, bomboanelor, cărora le imprimă un miros și gust plăcut, răcoritor.

După extragerea uleiului volatil, deșeurile constituie un furaj valoros având peste 18 % proteină și 49 % grăsimi brute, sau ca îngășământ organic, după compostare cu gunoi de grajd (E. Păun, 1975).

În *Farmacopeea Română* figurează: *Menthae folium* (frunza de mentă) cu cel puțin 1 % (v/g) ulei volatil; *Aetheroleum Menthae* (ulei de mentă), *Mentholum* (mentol). *Aetheroleum Menthae* intră în compusul *Tincture anticholera*.

Mentă este cunoscută ca plantă meliferă.

Răspândire. Speciele de mentă sunt răspândite în Europa, Africa de Nord, Asia, America de Nord, Australia și Noua Zeelandă (C. Barbu 1986). Suprafețe mai mari cu mentă se cultivă în SUA, Rusia, Bulgaria, Grecia, Spania, Italia, Franța, fosta Iugoslavie, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia Germania. Principali exportatori ai produselor sunt SUA, Rusia, Bulgaria, Grecia, Spania.

La noi în țară, mentă face parte din cele mai importante plante medicinale cultivate. Pe suprafețe mai mari se cultivă în zona Bâsei, Valea Oltului și Mureșului, Câmpia Banatului, iar în condiții de irigare și în Câmpia Română. Ea este întâlnită frecvent și în grădini, pe suprafețe mai mici.


375

Sistematică, soiuri. Genul *Mentha* cuprinde numeroase specii și varietăți, care se hibridează ușor între ele, făcând destul de greoaie sistematizarea. Speciele cultivate sunt hibrizi naturali, îndepărtați între specii spontane, în general autosterili, care se înmulțesc pe cale vegetativă. În ultimii ani, s-au ameliorat forme autofertile, care produc sămânță, permițând înmulțirea și pe această cale. E. Păun, 1975, menționează că mai importante din punct de vedere economic sunt: *M. piperita* L. (menta, izma - bună sau mînta), *M. arvensis* L. var. *piperascens* (menta japoneză); *M. crispa* L. sin. *M. spicata* L. var. *crispa* (menta creastă) și *M. pulegium* L. (busuiocul cerbilor). După același autor, din producția mondială de ulei volatil 58 % provine de la *M. arvensis* L. var. *piperascens*; 29 % de la *M. piperita* L. și 13 % de la *M. spicata* L. Utilizări medicinale are și specia *Mentha rotundifolia* (L.) Hudson (I. Bellakodar și colab., 1983). Specia spontană în țara noastră, *Mentha longifolia* (L.) ssp. *molissima* (Borkh) var. *rocheliana* (Borb. et H. Br) Top, cu miros deosebit de plăcut și intens, conține 1,38 - 1,44 % ulei volatil în frunzele uscate, bogat în linalool (unele proveniențe, 81,6 - 82,7 %, altele 49,5 - 62,1 %), se consideră că merită să fie introdusă în cultură, ca sursă de ulei volatil și linalool, cu utilizări în parfumerie și cosmetică (V. Cucu și colab., 1984).

M. piperita L. (fig. 4.19.1., după G. Rácz și colab., 1970 și 4.19.1.a., original) și *M. crispa* L. sunt hibrizi naturali între *Mentha spicata* (L.) Huds. (*Mentha viridis* L.) și *Mentha aquatica* L. Specia *M. spicata* (*M. viridis*) este considerată și ea un hibrid între *M. longifolia* (L.) Huds. (*M. silvestris* L.) cu *M. rotundifolia* (L.) Huds.

Mentha piperita L. cuprinde două subspecii: ssp. *eupiperita* Briq. care se apropie morfologic de *M. spicata* (*M. viridis*); ssp. *citrata* (Ehrh) Briq. apropiată mai mult de *M. aquatica*. În cultură este *M. piperita* L. ssp. *eupiperita* Briq. var. *officinalis* (Sole) Briq., cu două forme: *f. rubescens* Camus („black mint”), cu tulpina și nervurile frunzelor de culoare roșu - violet și flori violacee, mai rezistentă la boli și dăunători, mai productivă dar cu ulei de calitate mai slabă; *f. pallescens* Camus („white mint”), cu tulpini și nervuri de culoare verde și flori albe, cu pretenții mai ridicate, producții mai mici, dar cu ulei de calitate mai bună, fiind cultivată mai ales în Franța.

Pentru *Mentha piperita* L., A. Laza și G. Rácz, 1975, arată că $2n = 36, 48, 64, 65 - 69, 72, 84, 108, 144$. Crearea materialului inițial se realizează prin înmulțire generativă, obținându-se un material heterogen, dând posibilitatea alegerii individuale și înmulțirii pe cale vegetativă a elitelor extrase (E. Păun, 1968).

Fig. 4.19.1. *Mentha piperita* L.

posibilă dacă se respectă desimea normală de cultură și se combat buruienile.

Față de umiditate, cerințele mentei sunt ridicate, reușind într-un climat umed (600 - 1000 mm anual), iar în zone mai secetoase numai în condiții de irigare. De menționat că irigarea prin aspersiune favorizează atacul de rugină. Cerințele față de umiditate sunt mai ridicate până la înflorire, apoi până la recoltare nevoia de apă scade. Imediat după recoltare, preținde umiditate mai mare pentru formarea cât mai rapidă a producției a doua. Este importantă umiditatea solului, dezvoltându-se optim la cca 80 - 90 % din capacitatea totală a solului pentru apă, însă apa stagnantă este dăunătoare. Umiditatea solului este importantă și la plantarea stolonilor. În teren uscat, stolonii pierd apa și se reduce numărul mugurilor care dau tulpini. Umiditatea solului sub 20 % duce la uscarea majorității stolonilor și compromiterea culturii.

Rezultatele cele mai bune se obțin pe solurile fertile de luncă, cu textura mijlocie spre ușoară (luto - nisipoase) și cu apă freatică la mică adâncime. Merge pe solurile aluvionare, turbatoase, bine drenate. Solurile prea bogate în humus, datorită excesului de azot, imprimă uleiului aromă și gust neplăcut. Solurile cu exces de umiditate favorizează mult creșterea tulpinilor în dauna frunzelor și plantele sunt mai sensibile la rugină. Se evită și aluviunile pe care menta sălbatică crește spontan. Nu sunt recomandate solurile grele, argiloase, nestructurate, impermeabile, mlaștinose și nici cele nisipoase. Pe solurile grele planta degenează, iar pe solurile prea acide sau prea alcaline calitatea recoltei este slabă.

Zonare. La noi în țară menta deține suprafețe mai mari în trei bazine de cultură (Banat, Brașov, Prahova - Buzau), iar în ulterior s-a introdus în cultură și în al patrulea bazin, în județele Teleorman și Giurgiu (E. Păun, 1982, C. Barbu, 1986). E. Păun și colab., 1983, arată că zonele de cultură recomandate pentru mentă sunt: Câmpia Timișului, Câmpia Crișurilor, Câmpia Olteniei (irigat), Câmpia Burnazului (irigat), Câmpia Bărăganului (irigat), sudul Moldovei (Neamț, Bacău), Țara Bârsei și Podișul Transilvaniei.

4.19.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Menta este plantă perenă, însă în cultură se menține 1 - 2 ani, fiind recomandată introducerea ei în rotație (E. Păun, 1988). Dacă se menține mai mulți ani, rugina poate compromite cultura. Se cultivă după borceag, leguminoase pentru boabe, cereale de toamnă și

unele prășitoare bine întreținute. Pe același teren poate reveni numai după 5 - 6 ani.

În vederea obținerii stolonilor pentru plantare se organizează culturi speciale, asemănătoare loturilor semincere pentru alte plante (F. Crăciun și colab., 1977), care se întrețin în condițiile cele mai bune.

Fertilizarea se face cu 50 - 80 kg/ha P_2O_5 și 35 - 40 K_2O (toamna) și 70 - 130 kg/ha N (primăvara, în 1 - 2 reprize) (C. Barbu, 2000). Azotul sporește masa vegetativă însă în exces favorizează atacul de rugină, scade conținutul și calitatea uleiului volatil (scade procentul de mentol și crește cel de mentonă). Fosforul și potasiul corectează efectul negativ al azotului (E. Păun, 1988). Gunoiul de grajd este cel mai adecvat îngrășământ pentru mentă (mai ales pe solurile sărace), în funcție de sol se aplică în doze de 20 - 40 t/ha (încorporat cu arătura) (C. Barbu, 2000).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 25 - 30 cm adâncime, imediat după eliberarea terenului de către planta premergătoare. Înainte de plantare se efectuează o lucrare cu discul în agregat cu grapa.

Plantarea. Menta se înmulțește exclusiv pe cale vegetativă, prin stoloni (E. Păun, 1995). Stolonii se recoltează de la culturile ce se desființează sau din culturi speciale de la care se obțin 8 - 10 tone stoloni/ha (F. Crăciun și colab., 1977). Pentru plantat, stolonii trebuie să fie fasonați (bucăți de 20 - 25 cm lungime) (E. Păun, 1995) și să aibă 3 - 4 noduri.

Lungimea de segmentare a stolonilor influențează producția de herba și ulei volatili (tabelul 4.19.1.2, după Musteață, citat de E. Păun, 1988). Cu cât stolonii sunt mai mici, scade densitatea și producția de herba și ulei volatili. E. Păun 1988 arată că stolonii de 20 - 22 cm realizează producții similare cu cei nesegmentați și reprezintă un deosebit avantaj la plantarea mecanizată.

Plantarea se face toamna (octombrie) și numai excepțional primăvara, în rigole deschise de cultivator la distanțe de 70 cm și 10 - 12 cm adâncime, asigurând o densitate de 25 - 30 plante/m² (E. Păun, 1988). Stolonii se așază în rigole cap la cap, apoi se acoperă. Stolonii nu se plantează în sol uscat, deoarece se deshidratează. Se folosesc minimum 1200 kg/ha stoloni de mentă de bună calitate (proaspeți și curățați) (E. Păun, 1995).

Lucrările de îngrijire. Se combat buruienile prin prașile și pliviri. Se pot aplica erbicidele: Gesagard (Cosatrin) (4 kg/ha) sau Aftalon (2 l/ha) înainte de plantare, sau primăvara înaintea pornirii în

vegetație a plantelor din anul al doilea. Pe vegetație se aplică Fusilade (3 l/ha) sau Furore (2 l/ha) (E. Păun, 1995). Toamna se face o arătură de acoperire, la culturile care se mențin doi ani.

Tabelul 4.19.1.2.

Influența lungimii de segmentare a stolonilor asupra producției de herba și ulei volatil la mentă

Lungimea stolonilor	Producția medie de:			
	herba proaspătă		ulei volatil	
	q/ha	%	kg/ha	%
Stoloni întregi (Mt.)	42,9	100	23	100
Stoloni segmentați la 5-6 cm	28,7	67	15,3	66
Stoloni segmentați la 15-16 cm	38,5	90	19,3	84
Stoloni segmentați la 20-22 cm	42,2	98	21	91

În anul al doilea, primăvara, se grăbează pentru nivelare, iar după rășăirea plantelor se fac prașile mecanice între rânduri, pentru refacerea rândurilor (la 50 cm distanță) și pliviri pe rând.

Rugina (*Puccinia menthae* Pers. se combate prin măsuri preventive și igienă culturală; mijloacele chimice (Plantavax 75 WP - 0,2 %) se aplică limitat, deoarece partea aeriană se folosește în scop medicinal. Dăunătorii, puricele mentei (*Lagitarus lecopi*), păduchi de frunze (*Aphis menthae*) etc., se pot combate cu produse piretroide de sinteză: Decis 2,5 CE (0,05 %), Fastac (0,02 %) sau Sumi-alpha (0,02 %), produse cu remanență redusă (C. Barbu, 2000).

La deficit de umiditate se fac 3 - 5 udări cu norme de 400 - 500 m³ apă la hectar (E. Păun, 1988).

În loturile pentru obținerea stolonilor destinați plantării se acordă o atenție specială lucrărilor de îngrijire, inclusiv irigarea în condiții optime.

Recoltarea. Dacă s-a plantat toamna, în primul an se pot obține două recolte de mentă. În „loturile semincere” deoarece recolta a doua (otava) influențează negativ dezvoltarea stolonilor, se recomandă să se facă numai o recoltare către sfârșitul înfloriturii (E. Păun, 1975). Stabilirea momentului optim de recoltare este în funcție de materia primă care se urmărește să se obțină: masa vegetală proaspătă pentru extragerea uleiului, masă uscată sau frunzele (pentru ceauri) (E. Păun, 1975, J. Jolivet, 1976, E. Păun, 1988 etc.). În cazul în care se folosește materia primă proaspătă pentru extragerea uleiului volatil, se recoltează când plantele au înflorit în proporție de 50 % (baza inflorescenței tulpinii principale este trecută de înflorire, iar

jumătatea bazală a inflorescenței ramificațiilor de bază au înflorit). Taierea plantelor se face mecanic cu cositori (la 6 - 10 cm de la sol), urmând ca produsul să fie transportat în aceeași zi la locul de prelucrare. În acest caz se recoltează numai cât se poate transporta într-o zi.

Dacă materia primă este masa vegetală uscată (folosită în compoziția unor ceaiuri), se recoltează când plantele au înflorit în proporție de 30 - 40 %.

Influența epocii de recoltare asupra producției de frunze și calității lor se prezintă în tabelul 4.19.1.3., (după Kasimovskaia, citat de E. Păun, 1988).

Tabelul 4.19.1.3.

Influența epocii de recoltare asupra producției de frunze și calității acestora

Epoca de recoltare	Producția medie de:					
	Frunze uscate		Ulei volatil		mentol	
	q/ha	%	kg/ha	%	kg/ha	%
Butonizare	8	59	18,9	59	8,8	62
Înflorire 25 %	9,4	70	21,8	68	9,9	70
„ „ 50 %	13,5	100	32	100	14,1	100
„ „ 75 %	4,8	35	9,6	30	4,2	29
„ „ 100 %	6,3	46	12,1	38	5,5	39

Recoltarea frunzelor se face când au lungimea de 5 - 6 cm în mai multe etape. În prima etapă, frunzele se recoltează când au 6 cm lungime, direct de pe plantă în lan, frunză cu frunză, se așează în coșuri de nuiele și se transportă la locurile de uscare. Această etapă durează 15 zile, de la începutul recoltării. Etapa a doua durează 10 zile, frunzele luându-se tot direct din lan, ca și la prima, pe calități (superioară și a I-a), cu lungimea de minimum 5 cm în stare proaspătă. În etapa a treia, plantele se taie când 15 - 20 % sunt înflorite, apoi tulpinile se strujesc, obținându-se frunze de calitate a II-a. Taierea se face la 7 - 8 cm (nu mai jos) pentru regenerarea plantelor din recolta a II-a (pentru frunze sau iarbă). Se taie zilnic, cât, se poate struji imediat, altfel plantele se ofilesc, iar strujirea este dificilă și productivitatea scăzută. Pentru strujire se prinde vârful plantei cu mâna stângă, iar cu dreapta se trage tulpina prin palmă, unde rămân frunzele și ramurile (ramurile cu frunze mai multe se strujesc ca și tulpinile). Frunzele separate și de ramuri se duc apoi la uscat. În toate situațiile, recoltarea se face între orele 10 - 14, pe timp însorit și călduros, fără vânt, precipitații, rouă sau ceață, iar frunzele trebuie să fie zvântate.

În loturile pentru producerea de stoloni destinați plantării, nu se recoltează herba, putându-se recolta numai frunzele de calitate superioară și clasa I-a (F. Crăciun și colab., 1977). Stolonii se recoltează numai în momentul începerii plantării (pentru a nu se deprecia, prin deshidratare), iar pe măsura scoaterii, stolonii se strâng în grămezi și se acoperă (cu pământ sau paie și se udă până la plantare). Dacă trebuie transportați la o distanță mai mare, se acoperă cu prelate sau rogoji și se udă la expediere.

Condiționarea. Uscarea frunzelor de mentă se face la umbră (șoproane, poduri, pălule) sau la soare. La umbră, frunzele se așează pe hârtie albă, rogoji, prelate, până de sac, iar uscarea durează 5 - 6 zile (în încăperi uscate și bine aerisite). Frunzele se întorc de 2 - 3 ori în prima zi, apoi zilnic o dată, în următoarele trei zile. La soare, uscarea durează 5 - 6 ore (între orele 10 - 17), iar seara frunzele se pun pe rogoji, hârtie albă, până de sac, sau prelate în încăperi (în strat de 5 cm), unde se mențin încă 1 - 2 zile pentru completarea uscării. Iarba se usucă 1 - 2 zile la soare pe prelate, rogoji, rame etc., în strat de 5 - 8 cm, întorcându-se de 2 - 3 ori pe zi. După orele 19, ramele cu iarbă se adăpostesc și se scot a doua zi la soare după ce s-a ridicat roua. În aceste două zile, plantele se usucă 70 - 75 %, după care se continuă uscarea în încăperi (strat de 10 - 15 cm) încă 3 - 4 zile (fără să se întorcă plantele pentru a nu se scutura frunzele). Uscarea numai în încăperi durează mai mult (8 - 12 zile) decât uscarea mixtă (soare - umbră). După 15 septembrie, timpul de uscare se dublează. Frunzele și iarba se pot usca artificial la 35 °C.

Ambalarea frunzelor se face în lăzi speciale (căptușite cu hârtie de culoare închisă, în cantitate de 30 - 40 kg), iar iarba în saltele, făcându-se și condiționarea (din frunze se înlătură resturile de plante, iar din iarbă, buruienile sau alte plante). Randamentul la uscare este la frunze de 6 : 1, iar la iarbă de 4 : 1.

Condițiile tehnice de recepție sunt redată în continuare, în funcție de produs.

Frunzele (*Menthae folium*) se recepționează pe trei clase de calitate prezentate în tabelul 4.19.1.4.

Partea aeriană proaspătă (*Menthae herba recens*), se cere să aibă conținut de ulei volatili de minimum 0,23 %; impurități formate din tulpini mai lungi de 10 cm înainte de ultima ramificație maximum 3 %; corpuri străine organice maximum 0,1 %, iar cele minerale maximum 0,1 %; umiditatea normală a produsului în stare proaspătă, fără urme de apă pe suprafața frunzei.

La acest produs se prevede ca: procentul de impurități și corpuri străine să se stabilească din proba medie de 5 kg (din 5 - 7 locuri ale lotului), urmând ca impuritățile și corpurile străine ce depășesc limitele admise să se scadă cantitativ și valoric; părțile de plantă atacate de rugină nu se consideră impurități sau corpuri străine; tulpinile mai lungi de 10 cm înainte de ultima ramificație care depășesc 5 % din cantitate se scad cantitativ și valoric; pentru extragerea uleiului volatil, produsul trebuie să aibă minimum 25 % inflorescențe, însă nu se admit fructificații; transportul acestui produs se poate face cu mijloace de transport deschise.

Condițiile tehnice de recepție pentru frunzele de mentă
Tabelul 4.19.1.4.

Specificare	calitatea		
	superioară	cal. I	cal. II
Principii active :			
- ulei volatili	1	1	0,9
Lungimea frunzelor (cm)	5	4	sub 4
Impurități :			
- frunze brunificate și decolorate (% max.)	3	5	10
- resturi de tulpini și inflorescențe (% max.)	2	2,5	5
Corpuri străine :			
- organice (% maximum)	1,5	2	4
- minerale (% maximum)	0,5	1	2
Umiditate (% maximum)	13	14	14

Pentru partea aeriană uscată (*Menthae herba*) se admit ca impurități maximum 5 % frunze brunificate, maximum 3 % tulpini mai groase de 2 cm, nefiind admise tulpini și ramuri fără frunze. Corpuri străine organice maximum 2 %; iar cele minerale maximum 1 %; umiditatea maximă 13 % Nu se admit fructificații.

La produsul silat (*Menthae herba bruch*) se admit ca impurități: maximum 3 % resturi de tulpini, de pețol și nervuri; maximum 2 % fragmente care trec prin sita cu ochiuri de 0,5 mm; maximum 3 % fragmente brunificate. Nu se admit corpuri străine organice și minerale. Umiditatea maximum 12 %. Nu se admit fructificații.

Producția medie ce se poate obține este de 10 - 20 t/ha herba proaspătă, respectiv 2,5 - 3 t/ha herba uscată sau 1000 - 1300 kg/ha frunze uscate.

Producția de stoloni din loturile speciale destinate acestui scop este de 8 - 10 t/ha material de plantare.

4.19.2. LAVANDA ȘI LAVANDINUL

(*Lavandula angustifolia* Mill. și *L. hybrida* R.)

Fr: Lavande; E: Lavander; G: Echter Lavendel

4.19.2.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Lavanda (Levănțica), plantă spontană pe pantele însoțite din jurul Mediteranei, este cunoscută și utilizată încă din antichitate. Denumirea genului vine de la latinescul "*lavare*" = a spăla, planta fiind folosită în acest scop de romani (I. Grințescu, 1961), pentru a-și parfuma băile și pentru efectul său terapeutic. „Prima mențiune” a speciei *L. angustifolia* pare a fi făcută de Hildegarde (1098 - 1179) în cartea "Materia Medica", în care se găsește un capitol întreg intitulat "Despre lavandulă" (E. Păun, 1988). Același autor arată că lavandula a început să fie cultivată "după aproape cinci secole, de-abia după primul război mondial". O lungă perioadă de timp, până la începutul secolului trecut s-a folosit lavanda din flora spontană (Franța, Italia, Spania, Africa de Nord). Uleiul din lavandă a fost izolat pentru prima dată în secolul al XVI-lea (H.P. Dörfler și G. Roselt, 1984). Extinderea în cultură s-a făcut în secolul al XX-lea, după primul război mondial, după cum s-a arătat. Astfel, în 1923 din producția mondială de ulei volatil de lavandă (circa 60 tone) aproximativ 90 % provenea din plantele spontane colectate, iar în 1956, din totalul uleiului volatil de lavandă (circa 70 t) 90 % provenea din plante cultivate (V. Velican, 1965). La noi în țară, lavanda s-a cultivat mai mult prin grădini ca plantă ornamentală și aromatică, în ultimul timp cultivându-se pe suprafețe ceva mai mari. Ea poate însă să fie extinsă pe numeroase pante însoțite care astăzi au o slabă utilizare. Este o foarte bună plantă fitoameliorativă pentru valorificarea terenurilor erodate și prevenirea eroziunii solului, putându-se cultiva pe pantele abrupte, însoțite, calcaroase.

Materia primă și compoziția chimică. Lavanda se cultivă pentru inflorescențe (*Lavandulae flos*, *Lavandulae angustifoliae flos*, *Flores Spicae*), utilizate în stare proaspătă sau uscată, iar de la lavandin se folosesc inflorescențele proaspete (*Lavandulae hybridae flos*).

Florile proaspete conțin între 0,7 - 1,4 % ulei volatil, iar raportat la planta uscată, poate ajunge la 11,3 %. Prin uscare o parte din uleiul volatil se pierde (apreciat 35 - 47 %), astfel că florile uscate au în medie până la 1,5 % ulei volatil (U. Stănescu și colab., 2001), cu

limite între 1 - 3 %, mai rar până la 2 - 6 % (V. Cucu și colab., 1982; V. Istudor, 2001; A. Flower, 2004). Componentul principal al uleiului volatil din florile de lavandă este linaloolul, liber sau esterificat (mai ales ca acetat). Calitatea acestui ulei volatil este dată în principal de proporția de acetat de linalil, care în medie este de 30 - 40 %, însă poate ajunge la peste 50 % (E. Gildemeister și F. Hoffmann 1961, citați de V. Cucu și colab., 1982). Conținutul în alcooli liberi, exprimat în linalool, este cuprins între 40 - 60 %.

Condițiile pedoclimatice influențează atât conținutul de ulei volatil cât și compoziția sa chimică. Astfel, după T. Goina și colab. 1967, uleiul volatil de la proveniențe franceze de lavandă are 49 - 53 % acetat de linalil, iar cele englezești numai 7 - 11 % acetat de linalil (însă conțin 20 - 30 % cineol). Uleiul volatil de lavandă, în afară de linalool, mai cuprinde și alți alcooli (geraniol, nerol, lavandulol, borneol, citronelol, terpinen etc.), o parte fiind în stare esterificată (acetat de geraniol, bornil, neril, lavandulil etc.), acizi liberi (acetic, butiric, izovalerianic etc.), fenoli (timol și eugenol), aldehide și cetone (citral, citronelal, carvonă etc.). În uleiul volatil de lavandă, compușii oxigenați (redați mai sus) constituie 74,2 % din total, iar restul de 25,8 % reprezintă hidrocarburile terpenice (A.P. Wotherspoon și P.Z. Bedoukian 1955, citați de V. Cucu și colab., 1982), cum ar fi α -ocimen, β -mircen, α -pinen, β -pinen, limonen, camfen, sabinen etc.

Comparativ cu lavanda, florile de lavandin (hibrid între două specii) au conținutul în ulei volatil ceva mai mare (2 - 3 % în flori uscate), însă este mai sărac în esteri și mai bogat în camfor, având mirosul camforat și mai puțin fin (decât uleiul de lavandă). A. Mihalea, 1975, a constatat o corelație pozitivă între numărul de flori pe inflorescența de lavandă și conținutul în ulei volatil. Nu s-a constatat corelație între culoarea florilor și calitate.

În *Farmacopeea Română* figurează *Aetheroleum lavandulae* (ulei de lavandă), obținut prin distilare cu vapori de apă, din inflorescențe de lavandă, cu un conținut de 35 - 55 g % esteri exprimați, în acetat de linalil.

Utilizări. Uleiul volatil de lavandă este un aromatizant puternic, utilizat în parfumerie și cosmetică, însă are și utilizări medicinale. Se utilizează în tulburări digestive, având acțiune carminativă, ca sedativ central în cefalee, ca stimulent general, aromatizant și corectiv. Are acțiune antiseptică și cicatrizantă, folosindu-se la vindecarea rănilor, a reumatismului etc. Uleiul de lavandă intră în compoziția unor produse farmaceutice (inhalant etc.) și a oțetului aromatic (cu care se fac fricțiuni în caz de răceală, gripă și

stări febrile). Florile de lavandă au acțiune carminativă și slabe efecte stimulente nervoase etc. Florile se folosesc sub formă de infuzie, având acțiune calmantă asupra sistemului nervos. Ceiul din flori de lavandă se folosește în tratarea bolilor de rinichi și ficat, împreună cu alte plante, mărind diureza și secreția biliară. Datorită acțiunii sedative, florile de lavandă se folosesc în componența ceaiului pentru boala hipertensivă. Florile se folosesc în compoziția țigărilor antiastmatice. Lavanda se utilizează și în amestecul pentru băi aromatice pentru parafum plăcut ce-l dă apei, precum și pentru acțiunea ei calmantă, antiseptică și cicatrizantă a rănilor. Este considerată una din cele mai tonice plante pentru sistemul nervos. Infuzia de lavandă combate chiar și melancolia (stările depresive). Lavanda se folosește în producerea unor medicamente sedative (*Nervoflux*), colagoge (*Choi-Traw, Cholagutt-N*) și antireumatice de uz intern (*Dolo-Cylo*). Florile se utilizează ca insectifug, alungă molii și parfumează hainele. Uleiul de lavandă este foarte mult folosit în industria parfumurilor și cosmetică, a detergentilor și porțelanurilor, uleiul fiind un valoros dizolvant și fixator de vopsele. Lavanda este o apreciată plantă decorativă și meliferă, obținându-se 100 - 120 kg/ha miere. După cum s-a arătat, ea poate fi folosită și ca plantă fitoameliorativă.

Răspândire. Lavanda este originară din sudul Europei, având centrul de răspândire partea apuseană a bazinului mediteranean, de la răsărit până la coasta Dalmației și în Grecia (E. Păun, 1995). Crește spontan și se cultivă pe suprafețe mai mari în Franța, Italia, Spania, Africa de Nord. Cele mai mari suprafețe cu lavandă se întâlnesc în Franța, urmată de fosta Iugoslavie, Bulgaria, Spania, țări care sunt principalele producătoare a produsului vegetal. La noi în țară, deține suprafețe mai mari în sudul și sud-vestul țării, iar prin grădini se cultivă și în alte zone agricole.

Sistematică. Soiuri. Genul *Lavandula* cuprinde cca 30 de specii. Pentru cultură, cea mai importantă este *Lavandula angustifolia* Mill. (sin. *L. vera* DC, *L. officinalis* Chaix et Vill) (fig. 4.19.2., după G. Răcz și colab., 1970 și 4.19.2.a., original). Această specie are mai multe varietăți, din care cea mai importantă este var. *delphinensis* (lavanda mică), apoi var. *fragrans* (lavandă mijlocie) etc. Mai puțin răspândite sunt: *Lavandula latifolia* (L.) Medic (sin. *L. spica* L.), numită lavanda spaniolă; *Lavandula hybrida* (L. *intermedia*), numită Reverson (lavandin, sau lavandă englezască), un hibrid între *L. angustifolia* și *L. latifolia*; *Lavandula lanata* Boiss (cultivată în Spania).




Fig. 4.19.2. *Lavandula angustifolia* Mill.

După A. Laza și G. Rácz, 1975, *L. angustifolia* Mill. are $2n = 36, 42, 48, 50, 54$. *L. angustifolia* Mill. este o specie europeană, crește spontan în bazinul mediteraneeu (sudul Franței, Italiei, Spaniei și Greciei), pe versanții meridionali ai Alpilor francezi, între 700 - 1800 m. *L. latifolia* (L.) Medic. crește în același areal însă la altitudini mai mici (ex. în Alpii francezi între 400 - 700 m), iar la limita între cele două specii (600 - 800 m) apare hibridul natural reverșonul (lavandinul) (E. Coiciu și G. Rácz, 1962). La noi în țară se cultivă specia *L. angustifolia* Mill. care produce un ulei volatil de calitate superioară, însă este mai puțin productivă și mai pretențioasă la condițiile pedoclimatice decât *L. hybrida* (lavandin). Lavandinul se cultivă sporadic prin grădini. Este mai tardiv cu 10 - 14 zile decât *L. angustifolia* Mill.

Din *Lavandula angustifolia* Mill. se cultivă soiul „Codreanca” (din anul 1992) și soiul local (populația) „De Moara Domnească” (din anul 1973), iar din *L. hybrida* se cultivă soiul local (populația) „De Brănești” (din anul 1970).

Particularități biologice. *Lavandula angustifolia* Mill. este un semiarbust vivace, cu perenitate mare (20 - 30 de ani). Rădăcina este lignificată, puternică, groasă de 2 - 3 cm, adâncă până la 2 m și cu numeroase ramificații. Tulpina are numeroase ramificații, formând o tuță aproape globuloasă, înaltă de 30 - 70 cm. Ramificațiile bătrâne sunt lignificate, brune cu scoarța exfoliată, cele tinere sunt patrunghiuare, pubescente, iar coloritul general este verde cenușiu. Ramificațiile care poartă inflorescențele au 25 - 30 cm lungime și poartă frunze numai în partea inferioară, iar cele sterile sunt mai scurte și foliate complet. Frunzele sunt dispuse opus, întregi, sesile, linear - lanceolate, cu vârful ascuțit și marginea răscuită în sus, lungi de 2 - 5 cm și late de 3 - 5 mm (cele superioare mai mari, cele inferioare mai mici). Frunzele mai des păroase pe dos sunt prevăzute cu peri glanduloși, gălbui. Florile sunt dispuse în partea terminală a ramurilor în inflorescențe asemănătoare cu un spic (3 - 7 cm lungime), formate din 3 - 8 pseudoverticile, fiecare cu 2 - 7 flori labiate, scurt pediculate. Florile sunt compuse dintr-un caliciu cilindric (5 - 6 mm lungime) cu 4 dinți scurți, albaștrui, des, păros și glandulos; corola de cca 10 mm lungime, albastră, cu labiul superior adânc, bilobat, iar cel inferior cu 3 lobi înguști; androceul din 4 stamine dispuse în tubul corolei; gineceul cu ovar superior, la baza căruia se găsește glanda nectariferă disciformă, stilul de 3 - 3,5 mm lungime și stigma înegal bifurcat. Înfiorirea are loc în iunie - iulie. Polenizarea este alogamă entomofilă; după cum s-a arătat, lavanda fiind o valoroasă plantă meliferă.

Fructele sunt nucule, brune, lucioase, ovoidale, de cca 2 mm lungime și 1 mm grosime; grupate câte 4 la baza caliciului persistent; MMB este de cca. 0,9 - 1 g.

Cerințele față de climă și sol. Fiind plantă de origine sudică, lavanda are cerințe termice ridicate. Pretinde temperaturi ridicate pentru germinare (10 - 15 °C) și pornirea în vegetație (10 - 14 °C) în anii următori. În perioada de repaus, este rezistentă la ger (-15 °C fără zăpadă și -30 °C acoperită cu zăpadă). Planta suferă însă la înghețurile venite brusc la sfârșitul toamnei (medii zilnice de la -8 °C până la -12 °C), când solul este umed și neacoperit cu zăpadă (E. Coiciu și G. Rácz, 1962). Plantele tinere, după răsărire suportă temperaturi de -8 °C până la -10 °C. În cursul vegetației cerințele termice sunt ridicate, acestea condiționând producția, conținutul în ulei și calitatea acestuia. Față de umiditate, lavanda este mai puțin pretențioasă, suportând bine seceta, datorită înrădăcinării adânci, a frunzelor înguste și pubescente. Planta are o foarte mare plasticitate ecologică, fiind răspândită și în afara arealului ei de origine. Cerințe mai ridicate față de apă are la germinarea semințelor sau după plantare și înainte de înflorire. În perioada înfloririi și la recoltare, precipitațiile sunt dăunătoare. Lavanda este o plantă iubitoare de lumină (heliofilă), plantele crescute în locuri însorite au tufe mai mari, inflorescențe mai numeroase și înfloresc mai repede decât cele crescute în locuri umbrite.

Lavanda este puțin pretențioasă față de sol, spontan crescând pe pante sărace sau chiar stâncoase. Rezultatele cele mai bune, în cultură, se obțin pe soluri profunde, bogate în calciu, permeabile, cu apă freatică în adâncime (peste 2,5 m) și cu expoziție sudică.

Lavanda valorifică bine pantele erodate cu soluri calcaroase și nisipurile de natură calcaroasă. Nu merge pe solurile reci, grele, cu exces de umiditate și apa freatică la mică adâncime.

Zonare. Având în vedere cerințele reduse față de sol și umiditate, precum și cerințele mai ridicate față de căldură și lumină, lavanda se poate cultiva pe pante cu soluri sărace, erodate și însorite, impropriei altor culturi. Poate fi folosită cu succes în acțiunea de combatere a eroziunii și fixarea nisipurilor (calcaroase). Pe lângă rolul fitoameliorativ, se cultiva și în scop ornamental sau melifer, în parcuri, grădini etc. F. Crăciun și colab., 1977, semnalau că extinderea acestei plante în zone sudice, în special pe dealurile calcaroase din Dobrogea (având condiții similare cu zonele de origine, pantele mediteraneene ale Alpilor francezi, Dalmației, Greciei), este mai potrivit decât zona Feldioara - Brașov. E. Păun și colab., 1983, recomandă cultivarea lavandei în Câmpia Timișului, Dealurile vestice,

Câmpia Olteniei, Câmpia Burnazului, Câmpia Bărăganului, Câmpia Dobrogei, Podișul Dobrogei, Carpații de curbură, Podișul Transilvaniei. E. Păun, 1988, arată că extinderea culturii lavandei și lavandinului trebuie să se facă în sudul și sud-estul țării.

4.19.2.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Cultura de lavandă durează 20 - 30 ani și este amplasată în afara asolamentului. Se cultivă după plante care lasă solul curat de buruieni mai ales perene (pălămida etc.) și eliberează terenul devreme (la începutul verii), pentru a se putea executa lucrările solului și fertilizarea de bază. Se recomandă cultivarea după plante pentru nutreț verde. Pe același teren poate reveni după 8 - 9 ani. Lavanda este un bun mijloc antierozional dar se poate cultiva pe terenuri a căror unghi de înclinare să nu depășească 15° (E. Păun, 1988).

Pentru producerea de sămânță se aleg parcelele cu plante tipice, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea. La înființarea culturii se încorporează 30 - 50 t/ha gunoi de grajd, apoi anual se aplică 70 - 80 kg/ha P_2O_5 și 40 - 60 kg/ha K_2O (toamna) și 60 - 80 kg/ha N (primăvara) (E. Păun, 1986).

Lucrările solului. La înființarea plantației terenul se desfundă la 40 - 50 cm, cu care se încorporează gunoiul de grajd. Toamna, cu 2 - 3 săptămâni înainte de plantare, se face o arătură la 20 - 22 cm cu care se încorporează îngrășămintele cu fosfor și potasiu. Până la plantare, solul se menține curat de buruieni prin lucrări cu discul urmat de grapă.

Plantarea. Lavanda se poate înmulți prin sămânță (semănată direct în câmp sau mai frecvent prin răsad), și pe cale vegetativă (butași înrădăcinați sau despărțirea tufei). Sămânța trebuie să aibă puritatea de 95 % (minimum 85 %), iar germinația de 70 % (minimum 50 %).

Cultura prin răsad se practică în mod curent și se obțin lanuri fără goluri, uniforme, plante viguroase și cu o bună productivitate. Se produce răsad în straturi reci (pe un ha de straturi se folosesc circa 10 kg sămânță, semănată toamna, la 20 cm între rânduri și se obțin circa 400 - 500 mii fire răsad) (E. Păun, 1995). Pentru un ha de lavandă, răsadul se obține de pe circa 100 - 150 m² straturi semănată la 10 - 15 cm între rânduri, cu 0,3 - 0,35 kg sămânță (L. Piroșca, 2000). Plantarea răsadului se face în septembrie - octombrie, la 100 cm între rânduri și 50 cm pe rând (orientate pe curbe de nivel), revenind 20.000 plante/ha (pe soluri bogate se poate planta la 100/60 - 75,

revenind 16.666, respectiv 13.333 plante/ha) (E. Păun, 1988).

Se poate înmulți și prin înrădăcinarea butașilor (lăstari ierboși de 7 - 8 cm lungime cu baza lignificată și înrădăcinați), plantați ca și răsadul, sau prin despărțirea tufei (mai rar).

Lavandinul fiind un hibrid steril se înmulțește prin butași (de 7 - 8 cm lungime cu baza lignificată), înrădăcinați în straturi la 10/5 cm. Toamna butașii înrădăcinați se scot și se plantează la 100/100 cm (circa 10.000 plante/ha).

Lucrările de îngrijire. Se fac completări de goluri și se menține solul curat de buruieni prin prăsilă, ori de câte ori este nevoie. În plantațiile pe rod se pot folosi erbicidele Gresagard (Cosatin) (5 kg/ha) + Lasso (Meclozan) (6 l/ha), aplicate toamna târziu sau primăvara devreme înaintea pornirii în vegetație. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate, se aplică Fusilade (3 l/ha) sau Furore (2 l/ha), când buruienile au 4 - 6 frunze (E. Păun, 1995).

La plantațiile îmbătrânite se face operația de regenerare, prin tăierea ramurilor lignificate la 12 - 16 cm, primăvara sau imediat după recoltare. Tăierile de regenerare se execută manual sau cu mașini de tăiat (POL-1 etc.). Influența înălțimii și a epocii de tăiere pentru regenerarea plantelor de lavandă, asupra producției de inflorescențe și ulei volatil, se prezintă în tabelul 4.19.2.1. (după Serebrakova, citat de E. Păun, 1988). S-a constatat că tăierile de regenerare la 2 cm, executate în noiembrie și februarie, asigură producții ridicate de inflorescențe și ulei volatil.

Tabelul 4.19.2.1.
Influența înălțimii și a epocii de tăiere pentru regenerarea plantelor de lavandă asupra producției de inflorescențe și ulei volatil

Înălțimea de tăiere	Epoca (luna)	Producția de		Producția de ulei volatil	
		Inflorescențe	%	kg/ha	%
Necătat (Mt)	-	8,9	100	6,24	100
	Februarie	34,1	383	31,51	504
	Iulie	10,5	118	7,85	126
	Octombrie	26	292	22,88	367
	Noiembrie	40,3	453	35,48	568
Tăiat la 2 cm	Februarie	18,1	203	14,26	228
	Iulie	6,5	73	4,86	78
	Octombrie	10,2	115	6,73	108
	Noiembrie	15,8	177	13,9	223
Tăiat la 10 cm	-	-	-	-	-
	Februarie	-	-	-	-
	Iulie	-	-	-	-
	Octombrie	-	-	-	-

Culturile atacate de lăcuste de pășune (peste 4 - 5 ex./m²) se tratează cu unul din insecticidele Karate (0,02 %), Fastac (0,02 %), Sumi-alpha (0,02 %) (L. Piroșca, 2000) sau Danex 80 PS (0,15 %), Wofatox 50 CE (0,15 %), Carbetox 37 CE (0,4 %), iar contra fânării

se aplică Zeamă bordează 0,25 %, înainte de înflorire sau după recoltarea inflorescențelor (E. Păun, 1986).

În parcelele destinate producerii de sămânță se face purificarea biologică, înlăturând plantele netipice și bolnave. Plantele (tufele) de la care se recoltează sămânța trebuie să aibă flori de culoare albastru - violet (F. Crăciun și colab., 1977).

Recoltarea. Recoltarea se începe din anul al II-lea de cultură (anul al III-lea de viață), o cultură menținându-și capacitatea ridicată de producție 12 - 15 ani, după care apar goluri, exploatarea ei, devenind mai puțin rentabilă. De la lavandă se valorifică inflorescențele în stare proaspătă sau uscată. Perioada de recoltare este la înflorirea deplină, când conținutul de ulei volatil (și de esteri) este maxim. Perioada și durata înfloririi depind de zona de cultură. Înfloresc în iunie - iulie, mai devreme în silvostepă (unde durata înfloririi este de 15 - 20 zile) și mai târziu în zone mai răcoroase (unde înflorirea durează 25 - 30 de zile) (E. Coiciu și G. Răcz, 1962).

Lavandinul se recoltează cu cca. 10 - 15 zile mai târziu decât lavanda (E. Păun, 1986), fapt care permite prelungirea perioadei de utilizare a instalațiilor de prelucrare (distilare).

Recoltatul este bine să înceapă când cca. 50 % din flori au înflorit și sunt puține flori veștejite. Orice întârziere duce la scăderea producției de ulei și a calității acestuia. Recoltarea pentru flori uscate se face în momentul când încep să se deschidă primele flori (E. Păun, 1986). Recoltarea se face în zile însorite, după ora 10, când s-a ridicat roua, până la prânz. Conținutul în ulei în inflorescențe proaspete a fost, în zile senine, cuprins între 0,78 % (ora 7 - 13) - 0,75 % (ora 13 - 20), iar în zilele cu nori, 0,67 % (ora 7 - 13) - 0,61 % (ora 13 - 20). (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). E. Păun, 1988, recomandă ca lavanda să se recolteze între orele 10 - 12 pe suprafețe mici, iar pe suprafețe mari, între orele 9 - 14.

Inflorescențele se taie cu secera sau cu aparate de tuns, cu cel mult 10 cm de tijă sub ultimul verticil. După tăiere se așează în coșuri, fără să se îndese și se transportă imediat la locul de uscare sau la distilerie. După cum rezultă din tabelul 4.19.2.2. (după Topalov, citat de E. Păun, 1988), păstrarea lavandei în grămezi sau chiar în strat subțire duce la pierderi semnificative de ulei volatil.

Plantele destinate producerii de sămânță se recoltează când fructele ajung la maturitate pe majoritatea inflorescențelor. După recoltare, sămânța obținută se condiționează și se păstrează în saci de pânză.

Tabelul 4.17.2.2.

Influența duratei și modului de păstrare a inflorescențelor la lavandă asupra conținutului în ulei volatil

Feiul inflorescențelor	Conținutul în ulei volatil	
	%	% față de inflorescențe proaspete
inflorescențe proaspete	1,01	100
inflorescențe păstrate în strat subțire 9 ore	0,596	59
inflorescențe „încinse”	0,519	51

Condiționarea. Uscarea inflorescențelor se face fie pe cale naturală (în încăperi aerisite, uscate și ferite de soare), sau artificial la maximum 35 °C. Pentru uscare naturală inflorescențele se așează în straturi subțiri (pe rame, rogojini etc.) și se întorc după un timp, pentru a se usca uniform și a evita brunificarea.

După uscare, inflorescențele se strujesc, iar florile se ambalează în lăzi, care se vor păstra în depozite curate, aerisite și uscate. Randamentul la uscare este de 5 - 7/1.

Condițiile tehnice de recepție la produsul în stare uscată prevăd: impurități maximum 5 % (resturi de tulpini florale, flori brunificate, fructificații etc.); corpuri străine organice nu se admit, iar cele minerale, maximum 0,5 %, umiditatea maximum 11 %.

La produsul în stare proaspătă, se admit: maximum 2 % impurități (tulpini florifere peste 7 cm lungime înainte de ultima floare, dar nu mai lungi de 10 cm, flori brunificate, resturi de frunze, fructificații); corpuri străine organice, maximum 0,25 %, iar cele minerale, maximum 0,5 %. Umiditatea trebuie să fie cea normală a produsului proaspăt, fără urme de apă pe inflorescențe. Conținutul de ulei volatil, de minimum 0,55 %.

Producția de inflorescențe proaspete în primii 2 - 3 ani este de 2 - 3 t/ha, iar în anii următori 5 - 6 t/ha. Dintr-o tonă de inflorescențe proaspete rezultă până la 10 kg ulei volatil. Producția de flori uscate este de cca. 1000 kg/ha.

În loturile semincere de lavandă se realizează între 300 - 400 kg/ha nucule.

4.19.3. ROINIȚA

(*Melissa officinalis* L.)

Fr: Mélisse officinale, Citronelle; E: Balm; G: Zitronenmelisse

4.19.3.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Roinița (Melisa, Busuocul stupului, Floarea stupilor) este folosită ca plantă medicinală din antichitate de greci și romani, după cum rezultă din scrierile lui Theophrast, Varro etc. Numele genului *Melissa* vine de la grecescul „*melissa*” - albină, planta având cunoscute însușiri melifere (I. Grințescu, 1961) și o calitate deosebită a mierii rezultată din culesul albinelor în lanul de roiniță. Despre melisa, celebrul medic și chimist Paracelsus (1541) spunea că, este cea mai bună plantă pentru bolile de inimă (V. Velican, 1965). În “The London Dispensary” (Clinica Londoneză) (1696) se evidențiază valențele terapeutice ale preparatelor farmaceutice în care intră roinița (boli nevralgice, dureri de cap, stimularea funcțiilor vitale etc.) (L.S. Muntean și O. Marian, 2005). A cunoscut o mai largă utilizare în zonele de origine, unde apare spontan, îndeosebi în sudul Europei, vestul și centrul Asiei. Arealul ei de răspândire este cel al culturii viței de vie. S-a luat în cultură pentru a asigura necesarul de materie primă solicitat din ce în ce mai mult în ultimii ani.

Materia primă și compoziția chimică. Roinița se cultivă pentru frunze (*Melissae folium*) sau toată partea aeriană a plantei (*Melissae herba*) pentru extragerea uleiului volatil.

Frunzele și celelalte organe ale plantei conțin ulei volatil, în cantitate mică. Astfel, conținutul în ulei volatil în frunze și herba proaspete este de 0,05 - 0,15 %, iar în produsul uscat este de max. 0,5 (V. Istudor, 2001, A. Allaverdiyev și colab., 2004), uleiul volatil conține mai multe aldehide terpenice (32 - 42 %), în primul rând citral (sub formă de amestec al celor doi izomeri cis și trans), geraniol și nerol. Citralul imprimă mirosul și gustul de lănaie. Uleiul de melisă mai conține citronelal, alcoolul terpenic (geraniol, linalool, citonelo), hidrocarburi terpenice (pinen, limonen etc.) (V. Cucu și colab., 1982, G. Titel și colab., 1982). Mirosul plăcut al roiniței este imprimat îndeosebi de citronelal (U. Stănescu și colab., 2004). Pe lângă uleiul volatil, acțiune farmacologică mai au și alți componenți cum sunt compuși fenilpropanici (acizi, flavonoide, taninuri etc.) (V. Cucu și colab., 1982; J. Pellecuer și colab., 1981 etc.).

Utilizări. Uleiul volatil de roiniță are acțiune sedativă, antispastică, coleretică, carminativă și stomachică. Se utilizează în tulburări digestive și stări de vomă, spasme, colici, nevroze intestinale și stomacale, dischinezii biliare și colite cronice. Extractele (apoase și alcoolice) din frunzele de roiniță intră în compoziția unor medicamente sedative și hipnotice (*Vagostabil*, *Melissae Stres perlen*), virusatic în tratamentul herpesului (*Lomaherpan*). Frunzele intră în compoziția **ceaiurilor Anticolicic, Aromat, Contra colicilor nr. 2, Laxativ nr. 2**. Se folosește la prepararea apei de melisă etc. Roinița se folosește extern sub formă de băi, ajutând la vindecarea rănilor, având proprietăți cicatrizante, antiseptice. Uleiul volatil de roiniță are largă utilizare în industria parfumurilor și a lichiorurilor. Frunzele de roiniță (verzi sau uscate) sunt un apreciat condiment, dând preparatelor aromă și un gust foarte plăcut. Roinița este o valoroasă plantă meliferă, este foarte bogată în nectar (150kg/ha) fiind mult căutată de albine.

Răspândire. Roinița este originară din sudul Europei (estul zonei mediteraneene), estul și centrul Asiei și nordul Africii. Se cultivă în Europa centrală, meridională și orientată, în Asia și America de Nord, ca plantă medicinală și aromatică.

La noi în țară apare spontan, dispersat în sud și în vest, în pașuni și lănușuri din zona stejarului. S-a luat în cultură în Transilvania, în sudul și vestul țării.

Sistematică. Soiri. Specia cultivată este *Melissa officinalis* L. (fig. 4.19.3., după G. Răcz și colab., 1970 și 4.19.3.a., original), plantă ierboasă, perenă, *M. officinalis* L. arc 2n = 32,64 (A. Laza și G. Răcz, 1975).

La noi în țară se cultivă soiul local (populația) „De Dobrotești (din anul 1973).

Particularități biologice. Roinița este o plantă perenă care se menține în cultură 4 - 6 ani. Are în sol un rizom lignificat de cca. 30 cm lungime, cu numeroase rădăcini adventive, iar de la noduri, stoloni ascendenți. Tulpina este înaltă de 50 - 100 cm, erectă, ramificată, patrunghulară, pubescentă spre partea superioară. Anual, tulpinile se refac din muguri de pe colet. Frunzele sunt dispuse opus, cu petiolul de 1 - 3,5 cm limbul oval (3 - 6 cm lungime și 2 - 5 cm lățime), cu marginea crenat - serată, păroasă, cu aromă și gust plăcut. Florile sunt labiate, grupate câte 10 - 20 în pseudovericile la subsuara frunzelor din vârful ramurilor. Calicul bilabiat, de 6 - 8 mm lungime. Corola de 8 - 12 mm, alb gălbui, albă sau alb - liliachie, cu labiul superior mai lung ca cel inferior.

Androceul este format din patru stamine. Gineceul are un ovar superior, dispus pe o glandă nectariferă, stilele fiind de lungimea staminelor. Fructele, nucule alungit - ovoide, brune, lucioase, cu o pată albă la bază, lungi de 1,5 - 2 mm, sunt grupate câte patru în caliciul persistent. MMB este de cca 0,6 g.

Cerințele față de climă și sol. Fiind originară din zone sudice, se poate cultiva în regiuni cu ierni ceva mai blânde și suficient de umede (zona viței de vie). Sub zăpadă rezistă până la -25 °C; la temperaturi mai scăzute, cultura se rărește sau se poate compromite. În cursul vegetației, pretinde lumină pentru o bună dezvoltare a plantei și acumularea uleiului volatil. În locuri umbrite, se dezvoltă slab și produce o cantitate redusă de ulei. Cerințele față de umiditate nu sunt prea mari. Cu excepția primului an de vegetație, rezistă la secetă. Merge bine pe soluri profunde, drenate, cu textură mijlocie și fertile. Se cultivă pe versanții înșoriți și adăpostiți de curenți. Nu merge pe solurile grele, acide, umede, iar pe cele prea bogate în humus, conținutul în ulei volatil este ceva mai redus.

Zonare. Roinița se cultivă în zona cernoziomului și brunului roșcat de pădure, cu ierni mai blânde. Se recomandă cultivarea îndeosebi în județele Buzău, Prahova, Teleorman și în sectorul agricol Ilfov (E. Păun și colab., 1983).

4.19.3.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Roinița, fiind plantă perenă, se cultivă în afara asolamentului după prășitoare bine întreținute. Cultura se menține circa 5 - 7 ani, urmând să se înființeze în alt loc. Pe același teren poate reveni numai după 8 - 9 ani.

Pentru obținerea de semințe se aleg parcele cu plante tipice; sănătoase și bine dezvoltate.

Fertilizarea. La înființarea culturii se fertilizează cu 60 kg/ha P_2O_5 și 50 kg/ha K_2O (toamna) și 50 - 60 kg/ha (primăvara). În anii următori se aplică doze similare de îngrășăminte chimice (C. Barbu, 1986, M. Gui, 2005). Roinița valorifică eficient îngrășămintele cu azot până la doze de N_{60} , după cum evidențiază studiile întreprinse de S. Niță și I. Borcean, 2005. Aceeași autori constată o tendință de diminuare a conținutului de ulei volatil la roiniță, odată cu creșterea dozei de azot (fig. 4.19.3.b., după S. Niță și I. Borcean, 2005).

Lucrările solului. Terenul se ară la 25 - 30 cm adâncime, imediat după eliberarea lui de planta premergătoare. În cazul semănatului direct în câmp, patul germinativ trebuie să fie bine mărunțit și nivelat, folosind combinatorul. În cazul plantării, terenul




Fig. 4.19.3. *Melissa officinalis* L.

trebuie să fie nivelat, afănat, curat de buruieni, iar în prezinua plantării se tăvălujește.

Sămânța și semănatul. Roșița se înmulțește prin sămânță (semănat direct în câmp și prin răsad) și pe cale vegetativă (despărțirea tufelor și înrădăcinarea butașilor). Înmulțirea mai ușoară și cu rezultate mai bune se obține prin semănatul direct în câmp sau producerea de răsad (când se dispune de cantități mici de sămânță) (E. Păun, 1995).

Sămânța trebuie să aibă puritatea de 95 % (minimum 85 %), iar germinația de 75 % (minimum 65 %)




Fig. 4.19.3.b. Variația conținutului de ulei volatili la roșița în funcție de genotip și fertilizare înregistrată în Depresionea Almajului

Semănatul direct în câmp se face în septembrie, (ca plantele să formeze rozetă) sau în noiembrie (ca semințele să răsară în primăvară), la distanța între rânduri de 50 - 62,5 cm, adâncimea cca. 1 cm, cu 8 - 10 kg sămânță/ha (E. Păun, 1995). Densitatea este de 20 - 30 plante/m². Sămânța se amestecă în raportul 1 : 2 (1 : 5) cu material inert, la care se adaugă o plantă indicatoare: circa 100 g sămânță de salată etc.

Înmulțirea prin răsad (produs în straturi reci sau răsaduri calde) asigură o cultură uniformă, fără goluri (C. Barbu, 1986). Răsadul (150 - 200 mii fire/ha) se produce pe 150 m² straturi reci (500 g sămânță) sau pe 60 m² răsaduri calde (250 g sămânță). Plantarea se poate face în septembrie sau în mai (în funcție de perioada semănatului în răsădnică), la distanțe de 50 - 60 cm între rânduri și 20 - 25 cm pe rând.

Înmulțirea prin despărțirea de tufe, plantate toamna (septembrie) sau primăvara timpuriu în primărie, la distanța de 60 cm între rânduri și 30 cm între plante pe rând (M. Gui, 2005). Se va avea grijă ca tulpinile despărțite să aibă fiecare rădăcină proprie.

Lucrările de îngrijire. Se efectuează: prașile și piviri pentru a menține solul curat de buruieni și afănat; rădăcină, când plantele au 3 - 4 perechi de frunze, la 20 - 25 cm pe rând. Buruienile se pot combate cu Basagran (2,5 l/ha), în timpul vegetației, sau Aftalon (2 kg/ha), aplicat după semănat sau înainte de plantare a răsadului, iar pentru combaterea monocoiledonatorilor se aplică Fusilade (3 l/ha) sau Furore (2 l/ha) când plantele au 15 - 20 cm (E. Păun, 1995). Dacă apare rugina și septorioza, se fac tratamente cu Alto Combi 420 (0,5 l/ha) și Archer 425 (0,8 l/ha), iar tratamentul cu Capitan 50 WP (0,2 %) se face pentru combaterea pătării brune a frunzelor (N. Ungureanu, 2000, G. David și colab., 2003).

În solele destinate producției de sămânță se efectuează purificarea biologică, înlăturând plantele netipice și cele atacate de boli și dăunători.

Recoltarea. La culturile înmulțite prin sămânță, recoltarea începe în anul al doilea, iar la cele provenite prin plantare, se poate lua o recoltă ceva mai mică (la sfârșitul verii) și în primul an. Din al doilea an se fac obișnuiri două recolări de frunze sau herba, una în iunie - iulie și a doua în septembrie - octombrie. Frunzele se recoltază când au ajuns la mărimea normală, până încă nu a început îngălbenirea. Se recoltază manual, individual, sau prin strujire. Herba se recoltază înainte de înflorire, prin tăiere cu seceră, coasa sau costioara mecanică, la cca. 10 cm de la suprafața solului. Recoltarea trebuie să se facă pe timp însorit, după ce s-a ridicat roua.

Plantele destinate producerii materialului de semănat, se recoltază prin tăierea inflorescențelor care se usucă, se treieră, iar sămânța se condiționează și se păstrează în saci de pânză.

Condiționarea. După recoltare, frunzele se pun imediat la uscat, pe rame în straturi subțiri, în încăperi bine aerisite, sau artificial la cel mult 30 °C. La temperaturi mai mari se pierde mult ulei volatil. Se acordă mare atenție uscării, astfel frunzele se depreciază foarte repede. După uscare se înlătură frunzele îngălbenite sau brunificate, apoi se ambalează în lăzi și se păstrează în încăperi uscate și întunecoase.

Herba se prelucerează în stare proaspătă (extragerea uleiului) imediat după recoltare se usucă în condițiile arătate la frunze.

Randamentul la uscare este de 4,5 - 5,5 : 1 la frunze și de 4 - 5 : 1 la partea aeriană (herba).

Condițiile tehnice de recepție sunt în funcție de produs. Pentru frunze: ca impurități se admit maximum 3 % frunze brunificate și maximum 1 % resturi de tulpini; corpuri străine organice, maximum 14 0,5 %, iar cele minerale, maximum 0,5 %; umiditatea, maximum 14 %. Pentru partea aeriană: să fie recoltată înainte de înflorire; să aibă pe tulpină numai frunze verzi (cele brunificate nu se admit), iar ca impurități maximum 2 % frunze brunificate; corpuri străine organice și minerale, maximum 1 %, pentru fiecare; umiditatea, maximum 13 %.

Producția medie este de 4 - 5 t/ha frunze verzi (1 - 1,5 t/ha frunze uscate) sau 15 - 18 t/ha herba proaspătă (3 - 4 t/ha herba uscată).

În loturile semincere de roiniță producția este de circa 4 q/ha nucule.

4.19.4. JALEȘUL (*Salvia officinalis* L.)

Fr: Sauge, Herbe sacré; E: Shapsage, Sage;
G: Edler Salbei, Echte Gartensalbei.

4.19.4.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Se cunoaște sub denumirea de jaleș, salvie sau jaleș de grădină. *Salvia* vine din latinescul „salvare” = a vindeca, fiind cunoscută ca plantă cu utilizări medicinale (M. Răvăruț, 1961). Jaleșul este una din cele mai vechi plante medicinale folosite de om. Este cunoscută și utilizată din antichitate, fiind considerată un panaceu universal (V. Cucu și colab., 1982). Medicul Gallenos (sec. al II-lea e.n.) evidențiază însușirile tonice, diuretice și hemostatice ale jaleșului, iar de prin secolul al XVI-lea, se cunoaște utilizarea în medicină chiar a uleiului acestei plante (Fischer, 1941, citat de V. Velican, 1965). Romanii îi apreciau atât de mult însușirile medicinale ale acestei plante încât spuneau: „Pentru ce să moară omul, când în grădină crește salvia?” (C. Constantinescu, 1967). Jaleșul este apreciat ca plantă ornamentală și meliferă.

Materia primă și compoziția chimică. Jaleșul se cultivă pentru frunze (*Salviae folium*), sau partea aeriană (*Salviae herba*).

Conținutul de ulei volatil în frunzele proaspete este de cca. 0,38 %, (V. Cucu și colab., 1982), iar în frunzele uscate, variază între 1 - 2,5 % (V. Istudor, 2001, U. Stănescu și colab., 2004, S. Maric și colab., 2006). Uleiul volatil conține hidrocarburi terpenice (α -pinen, β -pinen, camfen, mircen, limonen etc.), compuși oxigenați (borneol, terpineol, cineol, α -tuionă, β -tuiona, linalool, aldehidă acetică, acetat de linalil etc.). Componentul principal al uleiului volatil de jaleș este tuiona (tujona, salvinol, absintol), ce ajunge până la 50 % din total. Frunzele au un conținut ridicat în taninuri (3 - 8 %), cu efect astringent, importantă prezintă acidul rozmarinic (acid labiatenic), picrosalvina (carnosol) cca. 1,8 %, care dă gustul amar specific genului *Salvia*, flavone (1 - 3 %), steroli, vitamine etc.

Utilizări. Uleiul volatil și celelalte componente din frunzele de jaleș au efect coleretic, carminativ, antispastic, ușor hipoglicemiant, astringent și acțiune antisudorifică pronunțată. *Salviae folium* are utilizări în afecțiuni bucale (gingivite, stomatite), ca stimulent în tulburări digestive, antisudorific, în afecțiunile căilor respiratorii superioare, în disfuncții ovariene, ca antidiareic etc. Frunzele, tinctură, extract fluid sau uleiul volatil sunt componente ale unor medicamente, indicate în afecțiuni digestive (**Enterosanol**), ale cavității bucale și ale gâtului (**Salus Salbei**, **Salviathymol**) etc. Frunzele se folosesc în compoziția **ceailui antiastmatic și pentru gargară**, a țigărilor antiastmatice etc. Uleiul volatil de jaleș are numeroase utilizări în parfumerie. Jaleșul este o valoroasă plantă meliferă și condimentară.

Răspândire. Jaleșul, plantă originară din sud - estul Europei, (Dalmatia, Macedonia) este răspândită mai ales în țările mediteraneene. Se cultivă în Spania, Franța, Italia, fosta Iugoslavie, Grecia, Albania și în țările Europei centrale, Anglia, SUA etc. Produsul medicamentos este furnizat în principal de Albania și fosta Iugoslavie. La noi țara este mai răspândit în zonele sudice, iar în vest, pe locurile mai înalte cu apă freatică la adâncime mai mare de 2 m.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Salvia officinalis* L. (fig. 4.19.4., după E. Coiciu și G. Răcz, 1962 și 4.19.4.a., original), care cuprinde mai multe subspecii, deosebite după mărimea și forma frunzelor, porozitate și culoarea florilor. Mai frecvent întâlnite și cultivate sunt (după V. Cucu și colab., 1982); ssp. *lavandulifolia* Gams; ssp. *minor* (Gamelin) Gams, cu formele *auriculata* (Mill) Vis., *albiflora*, *rubriflora* și *purpurascens* Alef.; ssp. *major* Gams, cu forma *crispa* Alef. Specia *Salvia officinalis* are $2n = 14$ (A. Laza și G. Răcz., 1975). Specia *Salvia splendens* L., care are caliciul și corola de un roșu aprins, este cultivată ca plantă ornamentală.



Fig. 4.19.4. *Salvia officinalis* L.
(ramură cu flori)

La noi în țară din *Salvia officinalis* L. se cultivă soiul local (populația) De Răsmirești (din anul 1975).

Particularități biologice. Jaleșul este un subarbust vivace. În sol are un rizom lignificat și ramificat, cu numeroase rădăcini. Tulpina este de 30 - 80 cm înălțime, ramificată puternic, lignificată la bază, tetranuchiată în partea superioară, acoperită cu peri catifelati. Frunzele sunt dispuse opus, pețiolate (frunzele superioare aproape sesile), limbul lanceolat (lung de 5 - 8 cm și lat de 3 - 4 cm) cu nervuri reticulare, mai proeminente pe partea inferioară. Pe frunză sunt perișori localizați mai ales pe nervuri și glande secretoare. Culoarea frunzelor tinere este alb - cenușie, apoi verde - argintie. Florile sunt grupate câte 4 - 8 în pseudoverticile, în vârful ramificațiilor, la ultimele 5 - 8 perechi de frunze. Floarea are calicul de cca 1 cm lungime, verde - violaceu, bilabiat cu 3 sepal superioare și 2 inferioare. Corola este de 2 - 3 cm lungime, de culoare albastră - violacee (rar roză sau albă), cu labiul superior mai scurt și emarginat, iar cel inferior trilob (lobul mijlociu aplecat în jos). Androeul este format din 4 stamine, din care două ies de sub labiul superior, iar două sunt rudimentare având aspectul unei păgâhii cu brațe inegale, asigurând polenizarea entomofilă. Gineceul are ovarul situat pe o glandă nectariferă disciformă, stilul este de cca 2 cm lungime, iar stigmatul despicat. Înfloarește în iunie - iulie, iar polenizarea este alogamă entomofilă. Fructele sunt nucule calicului persistent, din care 1 - 3 ajung la maturitate. Nuculele au culoarea brun închisă sau negricioasă. MMB este de 7 - 8 g. Planta are un miros specific, iar frunzele au un gust aromatic amar. Perii secretori sunt de diferite tipuri, deosebindu-se între ei morfologic și histochimic (L. B. Maleci și colab., 1983).

Cerințele față de climă și sol. Jaleșul este o plantă de origine sudică, având cerințe ridicate față de temperatură. Plantele pier în zonele cu ierni aspre și zăpadă puțină. La germinare are nevoie de cca 10 °C. În timpul vegetației preținde căldură multă. Reușește în zone cu ierni scurte, mai blânde, cu geruri temperate și solul acoperit de zăpadă. Gerurile târzii survenite după desprindăvărare sunt cele mai periculoase pentru jaleș. Jaleșul are pretenții destul de ridicate față de lumină. E. Corciu și G. Răcz, 1962, arată că jaleșul merge și în condiții de semiumbră, având un conținut de ulei ceva mai ridicat, însă producțiile ceva mai mici decât la plantele crescute în plin soare. La umbră, frunzele sunt mai mari, glandele secretoare mai rare, iar rata evaporării uleiului mai mică decât la soare (V. Cucu și colab., 1982). Față de umiditate, cerințele jaleșului nu sunt mari; din anul doi de

vegetație plantele suportă bine seceta. Jaleșul este puțin pretențios față de sol. Cele mai bune rezultate se obțin pe soluri fertile, lutoase, profunde, permeabile și bogate în calcar. Având un sistem radical profund, se poate cultiva pe terenuri în pantă, calcaroase, pentru a preveni eroziunea, sau se poate folosi pentru fixarea nisipurilor mobile. Amplasarea culturilor trebuie făcută departe de drumurile pe care se produce mult praf, deoarece acesta se depune pe frunze și se îndepărtează greu, datorită neregularităților și perilor deși de pe suprafața limbului (depreciind calitatea materiei prime).

Zonare. În țara noastră, jaleșul întâlnește cele mai favorabile condiții de cultură în sudul și sud - vestul țării (R. Bondrescu, 1982, E. Scoreico, 1986). Se recomandă cultivarea jaleșului în județele Ialomița, Giurgiu, Călărași, Teleorman, Olt, Dolj și în sudul județului Constanța (F. Crăciun și colab., 1977).

4.19.4.2. Tehnologia de cultivare

Rotafia. Jaleșul, fiind plantă perenă, se amplasează în afara asolamentului, în condiții ecologice prielnice, o cultură putându-se menține până la 10 ani. Premergătoare favorabile sunt leguminoasele perene și prășitoarele fertilizate. Pe același teren poate reveni numai după 8 - 9 ani.

Pentru producerea de sămânță, se aleg parcelele cu plante tipice, la care se aplică lucrările specifice culturilor semincere.

Fertilizarea. La înființarea plantației se încorporează circa 30 t/ha gunoi de grajd bine fermentat, împreună cu 40 - 50 kg/ha P_2O_5 și 40 kg/ha K_2O (sub arătură), iar primăvara 30 - 50 kg/ha N. Anual se aplică 40 - 50 kg/ha P_2O_5 și 30 - 40 kg/ha K_2O (toamna) și 50 - 60 kg/ha N (primăvara). I. Borcean și colab., 1984 au stabilit că îngrășămintele cu azot influențează favorabil producția de ulei volatil prin efectul asupra producției de herba în primul rând și numai în al doilea rând prin efectul asupra conținutului de ulei volatil.

Lucrările solului. Arătura se face la 25 - 30 cm adâncime și se menține curată de buruieni prin lucrări cu discul. Patul germinativ se pregătește în preziua semănatului. În cazul plantatului primăvara, pregătirea terenului se face cu 5 - 6 zile înainte de plantare.

Sămânța și semănatul. Plantatul. Jaleșul se înmulțește prin semănat direct în câmp sau prin răsad. Se recomandă, obișnuit, semănatul direct în câmp (E. Scoreico, 1986, A. Dumitrescu, 1988 etc.). Sămânța trebuie să provină de la plante tipice, viguroase, cu conținutul ridicat de ulei și trebuie să aibă puritatea de 95 %

(minimum 85 %), germinația 70 % (minimum 50 %), iar MMB de circa 7,5 g.

Semănatul direct în câmp se face în noiembrie sau primăvara devreme, asigurând densitatea de 9 - 10 plante/m², la 62,5 cm între rânduri, 2 - 4 cm adâncime, folosind 10 - 12 kg sămânță/ha (eventual cu o plantă indicatoare) (I. Borcean și colab., 1984). După I. Borcean și colab., 1984, prezentăm influența distanței între rânduri și a cantității de sămânță la ha asupra producției de herba (tabelul 4.19.4.1.) și ulei volatil (tabelul 4.19.4.2.) la jaleș (anul doi de vegetație, 1982, în condițiile din vestul țării). În aceleași condiții de vegetație, redăm după V. Tabără și colab., 1987, producția medie de herba (tabelul 4.19.4.3.) și ulei volatil (tabelul 4.19.4.4.) la jaleș (în ciclul experimental 1981 - 1985), în funcție de distanța între rânduri și a normei de semănat. Rezultate mai bune s-au obținut la 62,5 cm între rânduri și 8 - 12 kg sămânță/ha. V. Tabără și colab. 1987 arată că se pot obține culturi reușite cu 8 - 10 kg/ha, iar pentru culturile de sămânță, recomandă norme de însămânțare până la 8 kg/ha

Tabelul 4.19.4.1.

Rezultatele de producție înregistrate la *Salvia officinalis* L. în anul II de vegetație (herba uscată la aer), în funcție de distanța între rânduri și cant. de sămânță la ha

Factorul A	Factorul B						Mediile factorului A		
	6	8	10	12	10	12	producția	dif.	Semnif.
	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	%	
62,5 cm	3 273	4 740	4 835	4 404	4 313	100	4 313	100	
75 cm	4 046	3 506	3 689	4 931	4 043	94	-270	0	
Producția (kg/ha)	3660	4 123	4 262	4 667					DL 5% = 144 DL 1% = 197 DL 0,1% = 270
%	100	113	116	128					
Diferența		463	602	1 007					
Semnif.		**	***	***					
									DL 5% = 170 DL 1% = 312 DL 0,1% = 692

Tabelul 4.19.4.2.

Producția de ulei volatil (l/ha) la *Salvia officinalis* L. în anul II de vegetație, în funcție de distanța între rânduri și cantitatea de sămânță la ha

Factorul A	Factorul B						Mediile factorului A		
	6 kg/ha	8 kg/ha	10 kg/ha	12 kg/ha	10 kg/ha	12 kg/ha	producția	Diff.	
	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	%	
62,5 cm	58,91	80,58	82,19	79,27	75,23	100	75,23	100	-
75 cm	64,73	52,59	51,64	73,96	60,73	81	60,73	81	14,5
Producția (kg/ha)	61,82	66,58	66,91	76,61					
%	100	107	108	124					
Diferența		4,76	5,09	14,79					

Tabelul 4.19.4.3.

Producțiile medii de herba uscată la *Salvia officinalis* L., obținute sub influența distanței între rânduri și a normei de semănat în ciclul experimental, 1981-1985

Factorul A, Anul experimental	Producția medie, kg/ha	Producția relativă	Dif kg/ha	Semnif	Factorul B, Distanța între rânduri, cm	Producția medie, kg/ha	Producția relativă %	Dif kg/ha	Semnif	Factorul C, Norma de semănat	Producția medie, kg/ha	Producția relativă %	Dif kg/ha	Semnif
a ₁	2 801	100	-	-	b ₁ - 62,5	3 454	100	-	-	c ₁ - 6 kg/ha	3 185	100	-	-
a ₂	4 192	150	1 391	***	b ₂ - 75,0	3 008	87	-446	000	c ₂ - 8 kg/ha	3 334	105	145	**
a ₃	2 246	80	555	000	DL 5%=70 kg/ha DL 1%= 91 kg/ha DL 0,1%= 143 kg/ha					c ₃ - 10 kg/ha	3 202	101	17	-
a ₄	4 715	168	1 913	***						c ₄ - 12 kg/ha	3 204	101	19	-
a ₅	2 200	79	601	000										

DL 5%= 127 kg/ha
DL 1%= 185 kg/ha
DL 0,1% = 278 kg/ha

DL 5%= 90 kg/ha
DL 1% = 120 kg/ha
DL 0,1% = 156 kg/ha

4. Plante medicinale și aromatice cultivate sau în curs de introducere în cultură în România

Tabelul 4.19.4.4.

Producții medii de ulei volatil la *Salvia officinalis* L. obținute sub influența distanței între rânduri și a normei de semănat

Factorul A, Anul experim.	Prod. medie l/ha	Prod. relativă %	Dif l/ha	Semnif	Factorul B, distanța între rânduri, cm	Prod. medie l/ha	Prod. relativă %	Dif l/ha	Seminif.	Factorul C, norma de semănat kg/ha	Prod. medie l/ha	Prod. relativă %	Dif l/ha	Semnif
1981	27,68	100	-	-	62,5	38,35	100	-	-	6	32,89	100	-	-
1982	68,23	246	40,55	***	75	31,03	81	-7,32	000	8	33,58	102	6,9	-
1983	17,8	64	-9,88	000	DL 5%= 0,75l/ha DL 1% = 1,06 l/ha DL 0,1%= 1,54 l/ha					10	35,1	107	2,21	***
1984	36,59	132	8,91	***						12	37,2	113	4,3	***
1985	23,18	84	4,5	000										

DL 5%= 1,43 l/ha
DL 1%= 2,08 l/ha
DL 0,1% = 2,12 l/ha

DL 5%= 0,82 l/ha
DL 1% = 1,09 l/ha
DL 0,1% = 1,41 l/ha

Jaleșul se poate înmulți și prin răsad produs în straturi reci (de vară) sau în răsadnițe. Răsadul pentru 1 ha se produce pe circa 150 m² straturi reci sau 60 m² răsadnițe calde (în ambele cazuri, cu 1,5 kg sămânță) (F. Crăciun și colab., 1977). Răsadul (cu 3 - 4 frunze) se plantează în septembrie sau în aprilie, la 60 cm între rânduri și 10 - 15 cm pe rând.

Lucrările de îngrijire. În primul și în anii următori de vegetație, se fac prașile între rânduri (la culturile semănate, după răsărirea plantei indicatoare) și prașile sau pliviri pe rând. Pentru combaterea buruienilor se aplică preemergent Gesagard (2 kg/ha) sau Asesin (2 kg/ha), iar începând din anul al doilea, înainte de pornirea vegetației se utilizează un erbicid cu acțiune totală, Roundup (3 l/ha) sau Basta (4 l/ha) (V. Plugaru, 2000). Buruienile monocotiledonate (costreiu, pirul) se pot combate cu Fusilade sau Furor, în doze de 2 - 3 l/ha, aplicate când buruienile au 10 - 20 cm înălțime (E. Păun, 1995) Erbicidele antigramineice se pot combina cu Basagran (3 l/ha), pe vegetație. La culturile semănate, plantele se răresc pe rând la 10 cm între ele, goliurile putând fi completate cu plante rezultate din rărit. Din anul al doilea tulpinile lignificate se înlătură primăvara devreme, la 10 cm de la sol. Gărgărița lăstarilor se combate cu Metation (0,02 %), iar țânțarul salviei se combate cu Clorofos (0,2 %).

În culturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturând plantele netipice și cele atacate de boli și dăunători. La plantele destinate producerii de sămânță se recomandă să nu se efectueze operația de întinerire (F. Crăciun și colab., 1977)

Recoltarea. Culturile bine întreținute pot da o recoltă (în septembrie) încă din primul an. Din anul doi de vegetație, se obțin 2 - 4 recolte de frunze anual. Recoltarea frunzelor se face cu mâna. Se începe recoltarea în prima parte a lunii iunie, înaintea înfloririi, când frunzele au ajuns la maturitate tehnică, până în septembrie.

Lăstarii se recoltează prin tăiere (manual sau mecanizat) la 15 cm de sol.

Se recomandă să nu se recolteze frunzele în culturile semincere, până la recoltarea semințelor (A. Dumitrescu, 1988). Semincerii se recoltează din anul doi de vegetație, când începe uscarea calicului florilor de pe ramurile inferioare, iar o parte din semințe au culoarea închisă. Dacă se întârzie există pericolul scuturării semințelor. Plantele se taie cu secera (porțiunea de tulpină cu inflorescențe), se usucă și se treieră, iar semințele se condiționează și se păstrează în saci.

Condiționarea. După recoltare, frunzele se usucă la umbră, în încăperi aerisite, sau artificial la 30 - 35 °C. La recoltarea din septembrie, nopțile fiind mai reci, uscarea la umbră durează mult și frunzele se înnegresc. În acest caz, uscarea se face în uscătorii. Randamentul de uscare este de cca. 4 : 1. Frunzele uscate se țin în încăperi, curate și aerisite. Pentru a înlătura praful de pe ele, se cern prin site, apoi se ambalează.

Condițiile tehnice de recepție pentru frunze uscate admit ca impurități maximum 5 % frunze brunificate, maximum 15 % resturi de tulpini și vârfuri tulpinale; corpuri străine organice, maximum 1 %, iar cele, minerale maximum 0,5 %; umiditatea maximă 13 %.

La iarba uscată se admit ca impurități: maximum 3 %, frunze brunificate și maximum 1 %, resturi de tulpini; corpuri străine organice și minerale, maximum 0,5 % pentru fiecare; umiditatea maximă 13 %. Nu se admit fructificații în produs.

Produsul proaspăt poate să aibă ca impurități: maximum 2 % frunze brunificate și maximum 1 % resturi de tulpini; corpuri străine organice, maximum 0,5 %, iar cele minerale, maximum 0,2 %; umiditatea normală a produsului proaspăt la recoltare. Nu se admit fructificații în produs.

Producția de frunze uscate este de 3 - 6 q/ha, în primul an de vegetație, iar în al doilea și următorii, de 10 - 14 q/ha. Cea de herba uscată, este de 20 - 30 q/ha.

În loturile semincere de jaleș se realizează 200 - 500 kg/ha nucule.

4.19.5. ȘERLAIUL (*Salvia sclarea* L.)

Fr: Sange sclarée, E: Sage; G: Muskatellerkraut

4.19.5.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Încercări de cultivare a acestei plante s-au efectuat din primii ani ai sec. al XX-lea la stațiunea de plante medicinale din Cluj (B. Pater, 1923). Primele cercetări și rezultate experimentale datează din anul 1960, realizate la Măgurele - Brașov. Pe la mijlocul secolului trecut, s-au inițiat și alte studii privind introducerea șerlaiului în cultură, iar prima cultură industrială s-a înființat la Feldioara, lângă Brașov (1953) (E. Păun, 1988). După înființarea S.C.P.M.A. Fundulea

(1975), s-au efectuat în această stațiune studii sistematice privind biologia și tehnologia de cultivare a șerlaului.

Materia primă și compoziția chimică. Șerlaul (larba Sfântului Ion) se cultivă pentru părțile aeriene, care conțin ulei volatil (de calitate mai bună fiind cel din flori).

Materia primă vegetală o constituie inflorescențele - *Salviae sclareae flos* (*Salviae sclareae summitates*).

În unele cazuri se menționează ca produs vegetal toată partea aeriană (*Salviae sclareae herba*) (E. Grigorescu și colab., 2001).

Conținutul în ulei volatil în florile proaspete este 0,015 - 0,27 %, în florile uscate, 0,13 - 0,34 %. Frunzele și tulpinile sunt mai sărace în ulei volatil decât florile. Astfel, în stare uscată, frunzele au 0,08 - 0,14 % ulei volatil (mai bogate fiind cele tinere), iar tulpinile 0,01 - 0,02 % ulei volatil. Herba proaspătă are 0,017 - 0,14 %, iar cea uscată 0,1 - 1,1 % ulei volatil (C. Cucu și colab., 1982, P. Farkas și colab., 2005). E. Coiciu, 1967, arată că inflorescențele conțin până la 0,53 % ulei volatil. Uleiul volatil din *S. sclarea* L. conține o cantitate mai mare de acetat de linalil, mai ales cel din flori (56,5 - 78,5 %) și mai scăzut în cel din frunze (5 - 10 %). Mai conține și alți compuși oxigenați, ca alcooli (linalool, geraniol, nerol etc.), mulți dintre ei esterificați, aldehide, cetone etc. Hidrocarburile terpenice (α -pinen, β -pinen, β -mircen, limonen etc.), se află în proporție de 15 - 16 % din uleiul volatil. Herba mai conține cca 2,5 % substanțe pectice, iar în frunze s-au identificat flavone. Semințele conțin cca 29 % ulei gras.

Utilizări. *S. sclarea* L. are importanță ca plantă aromatică.

Uleiul volatil din *S. sclarea* L. este întrebuințat în industria parfumurilor. Este apreciat pentru calitățile sale odorante, dar și ca excelent fixator al aromei altor uleiuri volatile. Se folosește și la fabricarea vernurilor. *S. sclarea* L. este cunoscută și ca plantă meliferă.

Răspândirea. *S. sclarea* L. crește în flora spontană din Europa de sud și centrală, în nordul Africii, Asia Mică, Afganistan, Iran, până în Crimeea și Caucaz (E. Păun, 1995). Suprafețe mai mari în cultură sunt în Franța, Germania, Italia, Bulgaria, Ungaria și Rusia (V. Cucu și colab., 1982). În țara noastră este puțin răspândită în flora spontană din sudul țării.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Salvia sclarea* L., (fig. 4.19.5., după E. Coiciu și G. Răcz, 1962 și 4.19.5.a.). Această specie are $2n = 28$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). În cadrul speciei există forme cu diferite densități a inflorescenței (de la compact la lax) și cu înflorirea în primul an sau al doilea an de la semănat.




Fig. 4.19.5. *Salvia sclarea* L.

În țara noastră din *Salvia sclarea* L. se cultivă soiul „Vosnesenski 24” (din anul 1976).

Particularități biologice. *Salvia sclarea* L. este plantă ierboasă bienală, rar perenă. În primul an formează obișnuit o rozetă de frunze, însă în cultură s-au extins soiuri care înfloresc în primul an. Rădăcina principală este groasă de 1 - 1,5 cm, de culoare brună, cu ramificații scurte și subțiri. Tulpina este de cca 1,5 m înălțime și groasă, până la 1 cm, păroasă mai ales în partea superioară. Frunzele sunt pețiolate, lat - ovate, tomentoase. Cele de la mijloc sunt mai mari, având lungimea până la 25 cm, iar lățimea până la 15 cm. Frunzele superioare sunt mai mici (6 - 16 cm/4 - 7 cm), scurt - pețiolate. Florile sunt grupate câte 4 - 6 în 6 - 10 pseudovercile dispuse într-o inflorescență terminală. Corola evident bilabiată, are 2 - 2,5 cm lungime, cu labiul superior violaceu, iar cel inferior gălbui. Fructele sunt nucule, dispuse câte 4 în caliciul persistent, sunt elipsoidale, de 2 - 3 mm, trimuchiate, brune; în contact cu apa devin mucilaginoase.

Cerințe față de climă și sol. Șerlaiul este o plantă termofilă fiind de origine sudică. Răsărirea are loc la 10 - 12 °C după 12 - 14 zile, iar la 28 °C după 2 zile (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Peste iarnă, plantele suportă și geruri de -30 °C dacă sunt acoperite cu zăpadă. Față de lumină are cerințe foarte mari, fiind sensibilă la umbră. Inflorescențele se formează numai în condiții de zi lungă și lumină intensă. Cerințele față de apă nu sunt prea mari, însă în cazul unui regim de precipitații mai scăzut se reduce stadiul de lumină din care cauză numărul plantelor înflorite în primul an este mai mic (R. Bondrescu, 1982, E. Păun, 1986). Pretinde soluri ușoare, drenate, fertile, cum sunt cernoziomurile luto - nisipoase, cu suficient calciu. Nu merge pe soluri grele, reci, impermeabile cu apă stagnantă.

Zonare. Este o plantă termo- și heliofilă. Zonele foarte favorabile sunt sud și sud - vestul țării (R. Bondrescu, 1982, E. Păun, 1986). Se poate cultiva în Câmpia Bărăganului, Câmpia Burnazului, Câmpia Olteniei, Câmpia Timișului și Câmpia Crișurilor (E. Păun, și colab., 1983).

4.19.5.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Șerlaiul se amplasează după prășitoare fertilizate sau după cereale bine întreținute, care lasă terenul curat de buruieni. Pe același teren poate reveni după 5 - 6 ani.

Pentru producerea de semințe se alege parcelele cu plante tipice, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea. Șerlaiul valorifică bine îngrășămintele chimice, sporind producția de materie primă (inflorescențe). S-a constatat că azotul influențează favorabil și producția de sămânță la șerlai (tabelul 4.19.5.1., medii pe anii 1985 - 1987, după E. Scoreico, 1989).

Tabelul 4.19.5.1.
Influența azotului asupra producției de sămânță la *Salvia sclarea* L.

Doza de azot	Producția de sămânță q/ha	D, q/ha	%	Semiif
N ₀	4,7	Mt	100	
N ₃₀	5,6	0,9	119	**
N ₆₀	6,2	1,5	132	***
N ₉₀	4,8	0,1	102	
DL 5% = 0,58				
DL 1% = 0,77				
DL 0,1% = 0,99				

Se folosesc doze de 40 - 60 kg/ha P₂O₅ și 45 - 60 kg/ha K₂O (toamna) și 60 - 80 kg/ha N (primăvara) (S. Radu, 2000).

Lucrările solului. Arătura se execută la 25 - 30 cm adâncime și se menține curată de buruieni, prin lucrări cu discul în agregat cu grapa, având și rol în menținerea apei în sol. Patul germinativ trebuie să fie afânat și mărunțit și se pregătește cu combinatorul în preajma semănatului.

Sămânța și semănatul. Șerlaiul se înmulțește prin semănat direct în câmp. Se folosește sămânță sănătoasă, cu puritatea de 95 % (minimum 90 %), germinația de 70 % (minimum 60 %) și MMB de circa 4g. Biotipurile anuale se însămânțează toamna târziu (în pragul iernii), când solul are 3 - 4 °C, caz în care răsărirea are loc primăvara, iar formele bienale se recomandă să fie semănate în septembrie - octombrie, pentru a forma o rozetă de 8 - 10 frunze încă din toamnă (E. Păun, 1995). Densitatea la răsărire trebuie să fie de 40 - 50 plante/m² (50 - 60 plante/ml). Semănatul se face cu mașini universale (atașând cutia pentru semințe mici), la 62,5 cm între rânduri și la adâncimea de 2 - 4 cm folosind 8 - 10 kg sămânță la ha. Nu se recomandă semănatul la 45 cm între rânduri (deși s-au obținut rezultate bune la această distanță), deoarece întreținerea mecanizată a culturii în acest caz este mult îngreunată datorită mărimii rozetei plantelor de șerlai (E. Păun, 1988).

Lucrările de îngrijire. Se fac prașile între rânduri și pliviri pe rând de câte ori este nevoie. Se poate folosi erbicidul Afalon (2 - 4 kg/ha) aplicat după semănat - până la răsărire, iar în anul al doilea, înainte de pornirea în vegetație. Se pot folosi înainte de semănat Venzar (2 kg/ha), iar imediat după semănat Prometrex (3 kg/ha) sau

Kerb (2 kg/ha) (S. Radu, 2000) Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate (costrei, mohor, pir), se folosesc Fusilade sau Furere (2 - 3 l/ha), aplicate când buruienile au 15 - 20 cm înălțime (E. Păun, 1995). Combaterea viermelui sârmă (care reduce densitatea) se face prin tratamente cu Lindatox sau Duplinox (30 - 40 kg ha), cu câteva săptămâni înainte de semănat.

Cultura se poate menține și în anul al treilea, dacă densitatea nu s-a redus sub 60 mii plante/ha.

În culturile semincere se efectuată purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice, cele atacate de boli și dăunători. Este bine să rămână în lan plante cu înflorire uniformă (simultană), cu flori de culoare asemănătoare, bine dezvoltate, sănătoase, cu rezistență bună la boli și dăunători și cu un frunziș cât mai bogat (F. Ciăciun și colab., 1977). În culturile semincere, se menține lanul curat de buruieni până la maturizarea semințelor.

Recoltarea. De la șerlai se recoltează inflorescențele la sfârșitul fazei de înflorire, când începe îngălbenirea calicului florilor de la baza inflorescenței centrale, iar semințele din primele 2 - 3 verticile bazale încep să se coloreze în brun (E. Păun, 1988). În această fază se obține cea mai mare cantitate de ulei volatil. Recoltarea se face pe timp frumos, fără ploi și ceață, mai bine după masă, când soarele nu arde așa puternic. E. Păun, 1988, recomandă ca recoltarea să înceapă după ora 10, iar după ploi, numai după 12 - 15 ore de timp însorit.

Se taie inflorescențele deasupra ultimei perechi de frunze cu secera, foarfeca de vie sau mecanic cu costori. După recoltare, inflorescențele se transportă în cel mai scurt timp la locul de distilare, unde se prelucurează imediat. Menținerea inflorescențelor la soare după recoltare timp de patru ore, duce la pierderea aproape în totalitate a uleiului volatil (R. Bondrescu, 1982, E. Păun, 1986).

În culturile semincere, recoltarea semințelor se face când mai bine de jumătate din inflorescența principală a ajuns la maturitate. Se taie plantele cu secera, se leagă în snopi, iar după 2 - 3 zile se vor treiera. Sămânța se selectează și se păstrează în saci de iută.

Conditionarea. Se înlătură frunzele ajunse în inflorescențe la recoltare, iar tijeile inflorescențelor nu trebuie să fie prea lungi.

Condițiile tehnice de recepție prevăd ca materia primă să fie formată numai din inflorescențe proaspete. Ca impurități se admit: maximum 5 % frunze și tulpini brunificate; corpuri străine organice,

maximum 1 %, iar cele minerale, maximum 0,5 %. Umiditatea trebuie să fie cea obișnuită pentru flori proaspete și fără urme de apă pe produs. Conținutul de ulei volatil, de minimum 0,1 %.

Productia medie de inflorescențe proaspete este de 100 - 120 g/ha. În condiții bune de cultură se obține 150 - 170 g/ha inflorescențe proaspete din care rezultă 25 - 35 kg/ha ulei volatil (R. Bondrescu, 1982).

În culturile semincere de șerlai se realizează 300 - 500 kg/ha nucule.

4.19.6. MĂTĂCIUNEA (*Dracocephalum moldavica* L.)

Fr: Mélisse turque, Mélisse de Moldavie; E: Turkish melisse;

G: Türkische Melisse

4.19.6.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Mătăciunea (Măăciină, Busuiocul stupilor, Busuiocul mănăstiresc, Melissa moldovenească) apare ca oficială în Farmacopeea orientală „Handard”, publicată la Karaki - Pakistan (1969). Ea este considerată de Edell (1835) ca plantă „proprie teritoriului dacic, stăvilită ca și altele de Prut și Dunăre” și o numește „*Dacocephalum moldavica*”. S-a constatat însă ulterior că aria ei de răspândire este mult mai mare, întărindându-se în Siberia și masivul Himalaya (de unde este originară), în Europa Centrală și de Est, America de Nord (V. Istudor, 2001). Numele de „busuioc mănăstiresc”, derivă de la faptul că în țara noastră călugării foloseau frunzele plantei pentru obținerea „apei de melisă” (E. Coiciu, 1967). Planta este clasificată de Linne în 1753 (care o citează ca Moldavica), atestând preocupări botanice în Moldova cu câteva decenii înainte de studiile lui B. Haquet (1790 - 1796) (A. Petrescu, 1977). Numele genului, *Dracocephalum* vine de la grecescul *drakon* - balaur și *kephale* - cap, aluzie la forma corolei (M. Răvărut, 1961).

Materia primă și compoziția chimică. Mătăciunea se cultivă pentru partea aeriană (*Dracocephali herba*).

Produsul uscat conține 0,2 - 0,7 % ulei volatil, asemănător cu uleiul de melisă (S. El-Gengaichi și H. Wahaba, 1995; E. Grigorescu și colab., 2001), bogat în citral a și b (până la 80 %), acetat de geranil, linalool, nerol etc. Întreaga plantă are gust și miros plăcut de lămâie.

S-a constatat că altitudinea influențează conținutul în ulei volatil al plantei, mai ridicat fiind la altitudini de 600 - 800 m (G. Răcz, și colab., 1978). I. Roventă și V. Pascu, 1973, au găsit conținutul maxim de ulei volatil la începutul butonizării (0,37 - 0,42 %), după care a scăzut până la maturitate (0,12 - 0,14 %). În tabelul 4.19.6.1. (după S. Radu și colab., 1997), prezentăm conținutul în ulei volatil la *Dracocephalum moldavica* L., în funcție de organ, faza fenologică și ora de recoltare.

Utilizări. Uleiul volatil din mătăciune are proprietăți antiseptice și carminative. Utilizările lui sunt similare cu cele prezentate la *Melissa officinalis* L. Mătăciunea intră în compoziția unor ceaiuri medicinale, folosite în bolile aparatului digestiv și a sistemului nervos. Uleiul are utilizări în industria parfumurilor și în cea alimentară, la prepararea siropurilor, aromatizarea băuturilor, bomboanelor etc. Din citral se obține vitamina A. Mătăciunea este o foarte bună plantă meliferă, putându-se obține până la 200 kg/ha miere.

Tabelul 4.19.6.1.


Variația conținutului în ulei volatil la specia *Dracocephalum moldavica* L.

Organul analizat	Faza fenologică	ml % ulei volatil				
		ora 9	ora 11	ora 13	ora 15	
Herba	îmbobocire	0,1	0,12	0,12	0,08	
	înflorire deplină	0,1	0,1	0,08	0,08	
	aparitiia fructelor	0,08	0,1	0,08	0,08	
	maturarea semințelor	0,08	0,1	0,08	0,08	
Frunze	îmbobocire	0,06	0,06	0,05	0,04	
	înflorire deplină	0,06	0,06	0,05	0,04	
	aparitiia fructelor	0,03	0,03	0,03	0,03	
	maturarea semințelor	0,03	0,02	0,02	0,02	
Inflorescențe	îmbobocire	0,28	0,3	0,37	0,25	
	înflorire deplină	0,27	0,28	0,28	0,23	
	aparitiia fructelor	0,17	0,23	0,23	0,23	
	maturarea semințelor	0,17	0,22	0,24	0,21	
Tulpini	îmbobocire	0,02	0,01	urme	urme	
	înflorire deplină	0,01	urme	urme	urme	
	aparitiia fructelor	urme	urme	urme	urme	
	maturarea semințelor	urme	urme	urme	urme	

Răspândire. Se consideră că mătăciunea este originară din flora siberiană și a masivului Himalaya. Planta se găsește și în țara noastră îndeosebi în zonele deluroase și premontane (E. Păun, 1995). În cultură este răspândită mai mult în Europa, America de Nord, Asia (zona de silvostepă). La noi în țară s-a luat în cultură în sudul și vestul țării.

Sistematică, soiuri. Genul *Dracocephalum* cuprinde cca. 40 de specii, din care mătăciunea este cea mai valoroasă din punct de

vedere medicinal (M. Verzea, 1986). Specia cultivată este *Dracocephalum moldavica* L. (fig. 4.19.6., după Flora României, vol. VIII, 1961 și 4.19.6.a., original). Această specie are $2n = 10$ (A. Laza și G. Răcz, 1975).

Fig. 4.19.6. *Dracocephalum moldavica* L.

În țara noastră, din specia *Dracocephalum moldavica* L. se cultivă soiul local (populația) „De Militari (din anul 1975).

Particularități biologice. Mătăciunea este o plantă anuală, ierboasă. Rădăcina este fasciculată, nu prea profundă. Ajunge în sol până la 35 - 40 cm adâncime. Tulpina este erectă, de 40 - 70 cm, ramificată puternic, păroasă, tetramuchiată, cu nuanță roșietică. Frunzele dispuse opus, sunt alungit lanceolate. Florile bilabiate (corola albăstră - violacee) sunt grupate în verticile, dispuse la baza frunzelor de la nodurile superioare ale tulpinii (ca un spic alungit). Plantele cu corola albă au un conținut mai redus de ulei (F. Crăciun și colab., 1977), trebuind să fie îndepărtate din lan. Fructele sunt nucule ovoidale, netede, de culoare brună, grupate câte patru la baza calicului persistent.

Cerințele față de climă și sol. Cerințele față de temperatură sunt mai reduse în prima parte a vegetației, însă cresc în perioada sintetizării uleiului volatil. Mătăciunea este o specie termofilă și iubitoare de lumină. Cerințele față de apă sunt ceva mai ridicate de la răsărire până la faza de ramificare, după care scad. În perioada dinaintea recoltării, ploile scad conținutul de ulei. Solurile potrivite sunt cele cu textură mijlocie, permeabile, fertile. Nu merge pe soluri grele, impemeabile, fiind sensibilă la excesul de apă.

Zonare. Pe baza cerințelor ei față de climă și sol, a fost zonată în județele Ialomița, Giurgiu, Călărași, Buzău (sud - est) și Brăila (F. Crăciun și colab., 1977), însă se poate cultiva cu succes în toată țara (R. Bondrescu, 1982, E. Scoreico, 1986).

4.19.6.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Mătăciunea se cultivă după leguminoase și cereale păioase. Se evită oleaginasele, sorgul și alte plante rapace. Poate reveni pe același teren numai după 4 - 5 cm.

Loturile semincere se amplasează cu spații de izolare de minimum 1000 m între diferite categorii biologice ale procesului producerii de sămânță (M. Verzea, 1986).

Fertilizarea se face în funcție de fertilitatea solului, cu 50 - 70 kg/ha P_2O_5 și 40 - 50 kg/ha K_2O (sub arătură) și 80 kg/ha N (primăvara) (E. Scoreico, 1986, S. Radu, 2000). În tabelul 4.19.6.2. (după R. Bondrescu și R. Lupeanu, 1980), prezentăm influența fertilizării cu NPK asupra producției de herba și ulei volatil la mătăciune (media pe anii 1977 - 1979). Se constată că îngrășămintele sporesc producția de herba și ulei volatil la această plantă.

Tabelul 4.19.6.2.

Influența îngrășămintelor cu NPK asupra producției de herba în stare proaspătă, conținutului în ulei volatil și producției de ulei la *Dracocephalum moldavica* L.

Doze	Specificare	P_0K_0			$P_{45}K_0$			$P_{45}K_{45}$			Media N			%		
		Herba t/ha		Ulei vol.	Herba t/ha		Ulei vol	Herba t/ha		Ulei vol	Herba t/ha		Ulei vol	Herba t/ha		Ulei vol
			ml %	l/ha		ml %	l/ha		ml %	l/ha		ml %	l/ha		ml %	l/ha
N_0	Herba t/ha Ulei volatil ml % Ulei volatil l/ha	18,6 - -	- 0,33 -	- - 13,75	20,2 - -	0,27 - -	- - -14,75	20 - -	- 0,34 -	- - 17,75	19,6 - -	- 0,31 -	- - 15,41	100 - -	- 100 -	- - 100
N_{40}	Herba t/ha Ulei volatil ml % Ulei volatil l/ha	19,9 - -	- 0,25 -	- - 13	22,6 - -	- 0,29 -	- - 18	20,3 - -	- 0,41 -	- - 21,75	20,93* - -	- 0,31 -	- - 17,58***	107 - -	- 100 -	- - 114
N_{80}	Herba t/ha Ulei volatil ml % Ulei volatil l/ha	21 - -	- 0,29 -	- - 15,25	22,2 - -	- 0,35 -	- - 22,75	21,9 - -	- 0,33 -	- - 19,25	21,7** - -	- 0,32 -	- - 19,08***	111 - -	- 103 -	- - 124
N_{120}	Herba t/ha Ulei volatil ml % Ulei volatil l/ha	21,2 - -	- 0,32 -	- - 15,25	23 - -	- 0,4 -	- - 24,5	22 - -	- 0,37 -	- - 22,5	22,06*** - -	- 0,36 -	- - 20,75***	113 - -	- 116 -	- - 135
Md.agr	Herba t/ha Ulei volatil ml % Ulei volatil l/ha	20,17 - -	- 0,29 -	- - 14,31	22 - -	- 0,32 -	- - 20	21,05 - -	- 0,36 -	- - 20,31	1,1 t/ha 1,47 t/ha 1,90 t/ha	1,107 l/ha 1,493 l/ha 1,992 l/ha				
%	Herba t/ha Ulei volatil ml % Ulei volatil l/ha	100 - -	- 100 -	- - 100	109 - -	- 110 -	- - 140	104 - -	- 124 -	- - 142						

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

1,86 t/ha
2,56 t/ha
3,48 t/ha

2,69 l/ha
4,08 l/ha
6,55 l/ha

Lucrările solului. După premergătoare timpurii, se face o lucrare superficială, apoi toamna se execută arătura adâncă la 25 - 30 cm. Patul germinativ se pregătește în preajma semănatului, căutând se realizeze o bună mărunțire a solului pe adâncimea de semănat (M. Verzea, 1986).

Sămânța și semănatul. Mătăciunea se înmulțește prin semănat direct în câmp. Sămânța trebuie să aibă puritatea de 95 % (minimum 90 %), germinația de 90 % (minimum 75 %), iar MMB de circa 1,8 g. Semănatul se face primăvara cât mai timpuriu cu semănători cerealiere (E. Păun, 1995). Densitatea potrivită este de 70 - 80 plante/m². Se însămânțează la 50 cm între rânduri și la adâncimea de 2 cm. Cantitatea de sămânță la hectar este de 6 - 7 kg (în funcție de valoarea culturală), la care se adaugă 3 - 5 părți nisip fin, după care se amestecă bine (M. Verzea, 1988).

Lucrările de îngrijire. În cursul vegetației se urmărește menținerea solului curat de buruieni, prin prașile și pliviri. Când plantele au 4 - 5 frunze, cu ocazia primei prașile manuale și a plivutului pe rând se face și răritul culturilor prea dese. Pentru combaterea buruienilor se pot folosi erbicidele Afalon (2 kg/ha), imediat după semănat, iar pe vegetație Furor (2 l/ha), când buruienile monocotiledonate au 4 - 6 frunze (S. Radu, 2000). Prevenirea atacului de viermi - sârmă se face prin aplicarea, înainte de semănat, a produselor Lindatox 3-PP sau Duplitox 5+3 PP (30 - 40 kg/ha).

În loturile semincere, la prima prașilă manuală și a plivutului se efectuează răirea plantelor la 10 - 15 cm între plante pe rând. Purificarea biologică se efectuează înainte de înflorit, eliminându-se plantele netipice, slab dezvoltate și bolnave, precum și buruienile de carantină (*Cuscuta* sp.) (M. Verzea, 1986).

Recoltarea. Se obțin în mod obișnuit două recolte de herba, prima în iulie, iar a doua după cca. două luni. Cantitatea maximă, de ulei este atunci când cca. 50 % din plante au înflorit. (tabelul 4.19.6.3., după I. Roventa și colab., citat de M. Verzea, 1986). Pentru ceaiuri se recoltează ceva mai devreme, la început de înflorire. Pentru extragerea uleiului, recoltarea începe când înflorirea este de cca. 35 %, deoarece distilarea produsului se eșalonează pe câteva zile. Recoltarea herbei se face pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua, prin tăiere cu cositori, la cca. 15 cm de la sol pentru a putea regenera planta. Zilnic se recoltează cât se poate prelucra prin distilare sau uscare.

Loturile semincere se recoltează când peste 60 % din inflorescențe sunt mature fiziologic (au culoarea cafenie), întârzierea putând determina pierderea semințelor (înflorirea și maturizarea

semințelor are loc eșalonat). Semincerii se recoltează cu combina, după aplicarea desicantului Reglone (3 l/ha în concentrație de 20 %) în 600 l de apă, când peste 60 % din plante sunt mature (M. Verzea, 1986).

Tabelul 4.19.6.3.

Dinamica conținutului în ulei volatil, în herba uscată de mătăciune, în funcție de faza de recoltare

Faza de recoltare	Conținutul în ulei volatil în herba uscată, ml %
Buionizare	0,15
Infloiri 50 %	50
După înflorit, la apariția primelor fructe	0,29
După fructificare și recoltarea semințelor	0,24

Condiționarea. Uscarea artificială se face la 30 - 35 °C, în primă fază, apoi la 20 - 30 °C. Se poate usca produsul și natural, la umbră, sub șoproane, în straturi subțiri. Uscarea la soare nu se recomandă deoarece se pierd până la 1/3 din uleiul volatil din plantă. Rândamentul la uscare al herbei este de cca 3,5 - 4,5:1. Din cca. 100 kg herba uscată, la batoză se obțin cca. 35 kg bruch (I. Roventa, V. Pascu, 1973).

Condițiile tehnice de recepție prevăd ca materia primă să fie formată din tulpini cu ramificații, recoltate înainte de înflorirea deplină fără tulpini brunificate. La produsul uscat se admit ca impurități: maximum 2 % frunze brunificate; corpuri străine organice și minerale, maximum 1 % pentru fiecare, iar umiditatea, maximum 13 %. La materia primă în stare proaspătă, condițiile de recepție sunt similare cu cele de la menta pentru ulei.

Productia, la cele două recolte, este de 30 - 40 q /ha herba uscată, respectiv 150 - 250 q /ha herba proaspătă (150: - 250 q/ha produs proaspăt).

În loturile semincere de mătăciune se obțin 600 - 800 kg/ha nucule.

4.19.7. ISOPUL

(*Hyssopus officinalis* L.)

Fr: Hysope; E: Hyssop wort; G: Y sop

4.19.7.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Isopul este cunoscut din antichitate, fiind amintit și în Biblie. Planta și domeniile ei de utilizare sunt menționate în lucrările lui Theophrast, Dioscorides, Columella și Plinius (I. Grigorescu, 1961). A figurat între plantele luate în studiu la începutul secolului trecut în cadrul stațiunii de plante medicinale din Cluj (B. Pater, 1923).

Materia primă și compoziția chimică. Isopul se cultivă pentru partea aeriană (*Hyssopi herba*), în stare uscată sau proaspătă.

Conținutul de ulei volatil în herba proaspătă este de 0,07 - 0,29 %, iar în cea uscată între 0,2 - 1,5 % (V. Cucu și colab., 1982; D. Benedec, 2001; V. Istudor, 2001; D. Fraternali și colab., 2004), mai frecvent fiind menționate limite între 0,3 - 1 % ulei volatil (E. Grigorescu și colab., 2001, U. Stănescu și colab., 2004 etc.). Mai bogate în ulei volatil sunt florile, urmate de frunze și vârfurile înflorite, tulpinile conținând cantități foarte mici. Herba recoltată vara are conținutul în ulei volatil mai mare (cu cca. 33 %) decât cea din toamnă. Principalul component al uleiului volatil este pinocanfona (24 - 50 %), în proporție mai mare în formele cu flori albastre decât în cele cu flori roșii. Uleiul volatil mai conține și alți derivați monoterpici: α -pinen (7,3 %), β -pinen (5,3 - 14 %), α -terpinen (9,4%), pinocamfeol (2,1 %), canfen etc. Planta mai conține derivați flavonoidici (5,2 - 5,8 % hesperidină, diosmină etc.), apoi glucide, lipide, taninuri, săruri minerale etc. După R.R. Paris și H. Moyses, 1971 (citați de V. Cucu și colab., 1982), gustul amăru al herbei s-ar datorita maurubinei. În plantele de isop, s-au pus în evidență și mucilagi, saponine și alți compuși (D. Benedec, 2001).

Utilizări. Componentele uleiului volatil au acțiune expectorantă, antiseptică etc., iar marubina și taninurile au efect tonic - amar, și ușor astringent. Se utilizează sub formă de infuzie în afecțiuni cronice ale aparatului respirator (bronșite cronice, astm bronșic). Având acțiune antiseptică și cicatrizantă, este utilizat sub formă de băi sau comprese. Substanțele amare au efect stimulator asupra poftei de mâncare și funcțiilor digestive. Intră în compoziția **ceaiurilor Antistamatic, Pectoral nr. 2 și Sudorific.** Nu se

recomandă persoanelor cu afecțiuni ale sistemului nervos, la care poate produce crize epileptiforme (A. Radu, E. Andronescu, 1984). Isopul este apreciat ca plantă condimentară, meliferă și ornamentală. Înflorirea a doua din toamnă asigură un cules bun albinelor, care întâlnesc rar alte flori. Se poate folosi în lucrările antierozionale și de fixare a nisipurilor mobile.

Răspândire. Isopul este originar din regiunea mediteraneană și Asia centrală (Al. Buia, 1944). Crește spontan în sudul Europei și vestul Asiei (E. Păun, 1995). Este răspândită mult în zona mediteraneană, Europa Meridională, precum și o parte din Europa Centrală și nordul Africii.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Hyssopus officinalis* L. (fig. 4.19.7., după Flora României, vol. VIII, 1961 și 4.19.7.a., original), care cuprinde următoarele subspecii și varietăți (E. F. Heeger, 1956, citat de V. Cucu și colab., 1982): ssp *officinalis* Briq, var. *vulgaris* Benth., cu flori albastre - violet (f. *cyaneus* Alef.) sau roșu - carmin (f. *Ruber* (Mill) Alef) sau albe (f. *albus* Alef), var. *decussatus* Pers., var. *angustifolius* (Bieb) Benth. și ssp. *canescens* (DC) Briq. Specia *Hyssopus officinalis* L. are $2n = 12$ (13) (A. Laza și G. Răcz, 1975).

La noi în țară din specia *Hyssopus officinalis* L. se cultivă soiul local (populația „De Ciorani”, din anul 1975).

Particularități biologice. Isopul este o plantă perenă care în cultură crește și produce 10 - 15 ani (E. Coicui și G. Răcz, 1962). În sol are un rizom brun și rădăcini verticale. Tulpina este ramificată, lignificată la bază, erbacee în partea superioară, patrunghinulară și slab păroasă. Frunzele sunt dispuse opus, scurt - pețiolate până la sesile, glabre, alungit - lanceolate (2 - 4 cm lungime și 0,5 - 0,8 cm lățime), cu margini întregi. Florile sunt grupate în pseudovericile, dispuse la subsuara frunzelor superioare, formând o înflorescență lungă de 20 cm, cu un spic unilateral. Floarea este constituită dintr-un caliclu tubulos, cu cinci dinți aproape egali; corola bilabială colorată violaceu (rar roz sau albă), cu labiul superior scurt și bilobat, iar cel inferior trilobat; androceul format din patru stamine erecte, gineceul cu ovar superior. Înfloarește din iunie în septembrie. Fructele sunt nucule, câte 4 în caliclu persistent, de formă ovaloidă, ușor trunchiată (lungime 2 - 2,5 mm, lățime 1 - 1,5 mm), netede, iar în contact cu apa devin mucilaginoase. Plantele nerecoltate la timp diseminează și ocupă spațiile libere din jur.

Cerințele față de climă și sol. Isopul are cerințe ridicate față de căldură și lumină. În aceste condiții realizează un conținut ridicat de ulei volatil în herba. Rezistă în timpul iernii la temperaturi destul de scăzute (minus 25 - 30 °C), dacă solul este acoperit de zăpadă. Față de umiditate are cerințe relativ scăzute. Din anul doi de vegetație, isopul este rezistent la secetă. Isopul valorifică bine terenurile în pantă, calcaroase, sau solurile nisipoase, ca și levănțica. Ca și aceasta se poate folosi la lucrările antierozionale și la fixarea nisipurilor mobile. Se poate cultiva în taluzuri, garduri vii, parcuri, servind ca plantă ornamentală sau meliferă, după cum s-a arătat.

Zonare. Isopul este zonat în județele Olt, Dolj, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Buzău, Prahova, Hunedoara (F. Crăciun și colab., 1967). Cele mai favorabile zone de cultură sunt cele din sudul, sud-vestul țării (R. Bondrescu, 1982) și pe dealurile Dobrogei (E. Scoreico, 1986).

4.19.7.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Isopul se cultivă în afara asolamentului, cultura durând mai mulți ani. Se amplasează după prășitoare sau cereale păioase, în condiții bune de întreținere. În tabelul 4.19.7.1. (după V. Niță, 1997), prezentăm rezultatele obținute la isop (media anilor 1992 - 1994), cultivat după diferite plante medicinale (față de monocultură, s-au obținut sporuri de 18 - 40 %).

Tabelul 4.19.7.1.
Influența plantei premergătoare asupra producției de herba proaspătă la *Hyssopus officinalis* L.

Planta premergătoare	Producția (g/ha)	Diferență (g/ha)	%	Semnificația
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	98,1	27,9	140	xxx
<i>Thymus vulgaris</i> L.	95,2	25	136	xxx
<i>Mentha piperita</i> L.	95	24,8	135	xxx
<i>Salvia officinalis</i> L.	90,5	20,3	129	xxx
<i>Salvia sclarea</i> L.	88,3	18,1	126	xxx
<i>Gypsophila paniculata</i> L.	83,4	13,2	119	xx
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	70,2	-	100	-

DL 5% = 8,04 g/ha; DL 1% = 10,72 g/ha; DL 0,1% = 13,96 g/ha

Pentru obținerea semințelor se aleg parcelele cu plante tipice, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea. S-a constatat că isopul valorificat bine îngrășămintele chimice și că azotul și fosforul influențează favorabil producția de ulei volatil (I. Fărcaș și colab., 1981 și 1984). La




Fig. 4.19.7. *Hyssopus officinalis* L.

infloarea culturii se aplică 50 - 70 kg/ha N, 60 - 80 kg/ha, P_2O_5 și 20 - 40 kg/ha K_2O . Anual se fertilizează cu 60 - 80 kg/ha P_2O_5 și 30 - 40 kg/ha K_2O (toamna) și 50 - 120 kg/ha N (primăvara), în funcție de fertilitatea solului (N. Ungureanu, 2000).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 25 - 28 cm adâncime și se menține curată de buruieni, prin lucrări cu discul urmat de grapă. Patul germinativ se pregătește cu combinatorul, iar dacă solul este prea afânat și uscat, înainte și după semănat terenul se tăvălușește.

Sămânța și semănatul. Cultura se poate realiza prin semănat direct în câmp, prin răsăd, prin butași înrădăcinați, sau desprinderea tufei. Sămânța trebuie să aibă purtarea de 90 % (minimum 80 %), germinația de 80 % (minimum 65 %) și MMB de 1 - 1,2 g.

Semănatul direct în câmp se face în luna martie (sau în pragul iernii), asigurând densitatea de 20 - 25 plante/ m^2 . Se însămânțează cu mașina, în rânduri, la distanțe de 50 - 62,5 cm și la adâncimea de 2 - 3 cm. Cantitatea de sămânță la 1 ha este de 6 - 8 kg (R. Bondrescu, 1982). Din tabelul 4.19.7.2. (după E. Scornico, 1998) se constată influența perioadei de semănat asupra producției de herba la isop (media pe anii 1981 - 1985), rezultatele cele mai bune obținându-se la semănatul în martie sau în pragul iernii.

Tabelul 4.19.7.2.

Influența perioadei de semănat asupra producției de iarbă uscată la <i>Hyssopus officinalis</i> L.				
Perioada de semănat	Producția de iarbă uscată, q/ha	Diferența q/ha	%	Semnificația
Pragul iernii	33	Mt	100	
Martie	33,3	0,3	101	
Aprilie	29,93	-3,07	91	0
Mai	26,44	-6,56	80	000

DL 5% = 2,8 q/ha
DL 1% = 3,76 q/ha
DL 0,1% = 4,97 q/ha

După I. Fazecaș și colab., 1984 prezentăm influența distanței între rânduri și cantității de sămânță la ha asupra producției de herba (tabelul 4.19.7.3.), și ulei volatil (tabelul 4.19.7.4.) (anul doi de vegetație, 1982), în condițiile din vestul țării. După I. Borean și colab, 1987, redăm producția medie de herba (tabelul 4.19.7.5.) și ulei volatil (tabelul 4.19.7.6.) la isop (în ciclul experimental 1981 - 1985), în condițiile din vestul țării, în funcție de distanța între rânduri și a normei de semănat. Producția de herba și ulei volatil a fost mai mare

la 62,5 cm între rânduri și la norma de sămânță de 6 (10) kg/ha. Nivelul producției de herba este mai mare în anul II și III de cultură.

Tabelul 4.19.17.3.

Producția de herba uscată la aer la *Hyssopus officinalis* L. în anul II de vegetație, în funcție de distanța între rânduri și norma de semănat, în condițiile de la Timișoara

Factorul A	Factorul B				Mediile factorului A		
	4 kg/ha	6 kg/ha	8 kg/ha	10 kg/ha	kg/ha	%	Dif. semnif
50 cm	9 413	9 440	8 430	8 660	8 986	100	
62,5 cm	9 412	8 969	9 463	9 620	9 366	104	***
75 cm	8 604	8 125	7 902	8 378	8 252	92	-733

Mediile factorului B				
Producție (kg/ha)	9 143	8 844	8 598	8 886
%	100	97	94	97
Diferență		-299	-545	257
Semnificație		000	000	

DL 5% = 50 DL 1% = 76 DL 0,1% = 122

DL 5% = 108
DL 1% = 146
DL 0,1% = 195

Tabelul 4.19.7.4.

Producția de ulei volatil (l/ha) la *Hyssopus officinalis* L. în anul II de vegetație, în funcție de distanța între rânduri și norma de semănat, în condițiile de la Timișoara

Factorul A	Factorul B				Mediile factorului A		
	4 kg/ha	6 kg/ha	8 kg/ha	10 kg/ha	l/ha	%	dif
50 cm	71,82	71,48	70,01	71,6	71,09	100	-
62,5 cm	51,14	48,04	58,22	56,5	53,47	75	-17,62
75 cm	52,17	46,81	49,24	50,68	49,72	70	-21,37

Mediile factorului B				
Producția (l/ha)	58,19	55,44	59,15	59,59
%	100	95	101	102
Diferență		-3,75	0,96	1,4

Isopul se poate înmulți prin răsăd produs în răsadnițe reci sau prin despărțirea tufei. Plantarea se face la 50 - 60 cm între rânduri și la 10 - 15 cm pe rând (după tehnica aplicată la lavandă sau roiniță etc.).

Lucrările de îngrijire. Se menține solul curat de buruieni, prin prașile și pliviri (cultura cere o îngrijire mai atentă în primul an de vegetație). Pentru combaterea buruienilor se recomandă erbicidele Cosatin (5 kg/ha) sau Afalon (2 kg/ha), aplicate în primul an, imediat după semănat, iar în anii următori, primăvara, înaintea pornirii plantelor în vegetație (E. Păun, 1995). Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate se recomandă erbicidele Fusilade (2 l/ha) sau Furore (2 l/ha), când acestea au 10 cm înălțime (N. Ungureanu, 2000).

Rărirea plantelor se face la a doua prașilă, lăsându-se la distanța de 10 cm pe rând. Primăvara, înaintea pornirii în vegetație, se tund tufele, înlăturându-se părțile uscate.

În culturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave.

Tabelul 4.19.7.5.
Sinteza producției de *Hyssopus herba* uscată la aer
în ciclul experimental 1981-1985, în condițiile de la Timișoara

Factorul A, anul experienței	Producția medic, kg/ha	Producția relativă, %	Dif. kg/ha	Semnif.	Factorul B distanța între rânduri, cm	Producția medic, kg/ha	Producția relativă, %	Dif. kg/ha	Semnif.
1981	1.794	100			50	4.154	100		
1982	8.864	494	7.070	***	62,5	4.374	105	220	***
1983	3.627	202	1.833	***	75	3.896	94	258	000
1984	3.037	169	1.242	***					
1985	3.384	189	1.590	***					
DL 5% = 79,77 kg/ha DL 1% = 116,03 kg/ha DL 0,1% = 174,05 kg/ha									
Factorul C, Norma de semănat, kg/ha	4	100							
6	4.128	100							
8	4.235	103		***					
10	4.098	99		-					
	4.105	99		-23					
DL 5% = 55,70 kg/ha DL 1% = 75,69 kg/ha DL 0,1% = 102,61 kg/ha									
Factorul C, Norma de semănat, kg/ha	4	100							
6	27,15	108		***					
8	26,04	103		***					
10	27,75	110		***					
DL 5% = 0,42 l/ha DL 1% = 0,56 l/ha DL 0,1% = 0,72 l/ha									

Recoltarea. De la isop se recoltează herba, în perioada înfloririi (cca. 50 %), fără părțile lemnoase ale tulpinii, respectiv porțiunea cu inflorescențe. Plantele se taie la cca. 10 cm de la sol cu cositori sau cu secera. Se recoltează de două ori pe an, prima în iunie - iulie, iar a doua în septembrie - octombrie.

După E. Scureico 1998, prezentăm în tabelul 4.19.7.7. producția de herba la isop în funcție de perioada de recoltare.

Culturile semincere se recoltează când semințele încep să se înnegrească (F. Crăciun și colab., 1977). Se taie plantele, se leagă în snopi pentru uscare și după 3 - 4 zile se treieră, iar sămânța se condiționează înainte de păstrare.

Condiționarea. După recoltare se înlătură tulpinile lignificate care mai sunt în produs, apoi se usucă la umbră, în strat subțire sau pe cale artificială la 30 - 35 °C. Randamentul la uscare este de cca. 4: 1.

Condițiile tehnice de recepție sunt în funcție de produs.

Pentru produsul în stare uscată și la cel sitat, se admit: maximum 3 % impurități, formate din tulpini lignificate și plante

decolorate; corpuri străine organice și minerale, câte 0,5 % pentru fiecare; umiditatea maximă de 12 %.

Tabel 4.19.7.6.
Sinteza producției de ulei volatil la isop (Timișoara, 1981-1985)

Factorul A, anul experienței	Producția medic, l/ha	Producția relativă, %	Dif. l/ha	Semnif.	Factorul B distanța între rânduri, cm	Prod. medic, l/ha	Prod. relativă, %	Dif. l/ha	Semnif.
1981	9,14	100			50	26,02	100		
1982	55,39	606	46,75	***	62,5	29,52	113	3,5	***
1983	25,17	275	16,03	***	75	24,11	93	1,91	000
1984	17,19	188	8,05	***					
1985	25,86	283	16,72	***					
DL 5% = 0,67 l/ha DL 1% = 0,97 l/ha DL 0,1% = 1,45 l/ha									
Factorul C, Norma de semănat, kg/ha	4	100							
6	27,15	108		***					
8	26,04	103		***					
10	27,75	110		***					
DL 5% = 0,42 l/ha DL 1% = 0,56 l/ha DL 0,1% = 0,72 l/ha									

Tabelul 4.19.7.7.
Influența perioadei de recoltare asupra producției de herba uscată la *Hyssopus officinalis* L.

Faza de recoltare	Producția de herba uscată q/ha	Diferența q/ha	%	Semnificația
Ramificat	21,32	-14,31	60	000
Eutonizare	28,63	-7	80	000
Începutul înfloritului	35,63	Mt	100	
Înfloritul deplin	37,13	1,5	104	
DL 5% = 1,69 q/ha DL 1% = 2,22 q/ha DL 0,1% = 2,86 q/ha				

Pentru produsul în stare proaspătă se admit: maximum 3 % impurități (tulpini lignificate, plante decolorate); corpuri străine organice și minerale, maximum 0,1 % pentru fiecare; umiditatea normală a produsului în stare proaspătă. Conținutul de ulei volatil, de minimum 0,2 %.

Producția este de cca. 100 - 150 q/ha herba proaspătă, respectiv 30 q/ha materie primă uscată. În culturile semincere de isop se realizează 300 - 600 kg/ha nucule.

4.19.8. MĂGHIRANUL

(*Majorana hortensis* Munch.)

Fr: Marijolaine; E: Majoran, Sweet majorana;
G: Majoran, Wurstkraut, Gartenmajoran

4.19.8.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Măghiranul este utilizat și cultivat din antichitate în Egipt, fiind introdus în Europa prin secolul al XIV-lea, inițial în zonele mediteraneene, luând o extindere mai mare în sudul Franței, apoi în nordul Africii și Peninsula Iberică (M. Verzea, 1988).

Materia primă și compoziția chimică. Măghiranul (Măghiranul; Măgheranul) se cultivă pentru partea aeriană (*Majoranae herba*) în stare uscată sau proaspătă.

Conținutul de ulei volatili în herba proaspătă este de 0,3 - 0,9 % (V. Cucu și colab., 2004) iar în cea uscată până la 3,5 % (V. Istudor, 2001, M.C. Palada și colab., 2004). Mai bogate în ulei volatili sunt florile și vârfurile înflorite, apoi frunzele, iar tulpinile au un conținut mai scăzut. Materialul biologic cultivat la noi în țară conține, în părțile aeriene, în stare uscată, cca. 1 % ulei volatili (A. Mihalcea, 1982). Conținutul în terpeni al uleiului volatili de măghiran este de circa 40 % (E. Grigorescu și colab., 2001). Uleiul volatili din măghiran are o compoziție relativ simplă, conținând α -terpinen, γ -terpinen, cis- și trans- β -ujanol, α -terpineol etc., predominând când unul când altul dintre acești compuși, în funcție de proveniență (V. Cucu și colab., 1982). Uleiul volatili mai conține și alți compuși însă în proporții mai mici, cum ar fi eugenol, carvacrol, chavicol, linalool, geraniol etc. La un produs de proveniență autohtonă, în părțile aeriene uscate, s-a determinat 1,6 ml ulei volatili în 100 g materie primă, identificându-se dintre compuși: linalool, limonen, acetat de geraniol, cariofilen, terpineol, geraniol, eugenol etc. (V. Hodișan și colab., 1981). Herba mai conține: lipide; glucide; diverși derivați flavonici (majoranină etc.); ca și alte labiate, acid rosmarinic (acid labiatic cca. 2 %); acid cafeic; acid clorogenic; vitamine etc.

Utilizări. Măghiranul se folosește mai puțin în terapeutică, având utilizare mai largă ca și condiment și în industria parfumurilor. Majoranae herba sau uleiul volatili au efect antispastic, carminativ, fiind utilizate în dispepsii stomacale. Ceaiul de măghiran stimulează

digestia, mărește pofta de mâncare și calmează colicile stomacale. Se recomandă și în combaterea unor stări nervoase și a insomniilor.

Răspândire. Măghiranul este originar din Peninsula Arabică, Nordul Africii (Egipt) și zona mediteraneeană (E. Păun, 1995), însă este răspândit în tot bazinul mediteranean. În cultură este mai răspândit în Germania, Franța, Spania, Tunisia și India. Măghiranul se cultivă în zilele noastre în toate continentele.

La noi în țară apare și prin grădini. Se cultivă ca plantă aromatică și condimentară.

Sistematică. Soluri. Specia cultivată este *Majorana hortensis* Munch. (sin. *Origanum majorana*; fig. 4.19.8. după G. Răcz și colab. 1970 și 4.19.8.a., original). Sunt numeroase varietăți, în cadrul speciei, însă în cultură se preferă o varietate franceză cu tufă mare și bogată în frunze, precum și una germană, mai săracă în frunze dar mai bogată în flori (V. Cucu și colab., 1982).

La noi în țară se cultivă din specia *Majorana hortensis* Munch., soiul local (populația „De Neamț”, (din anul 1973).

Particularități biologice. În zona mediteraneană este un subarbust, peren, iar în Europa centrală se comportă ca plantă ierboasă, anuală sau bienală. La noi în țară este cultivată ca plantă anuală.

Rădăcina este pivotantă de cca. 0,5 cm grosime și de culoare galbenă brunie. Tulpina este de 30 - 50 cm înălțime, ramificată, tetraunchiată, verde - cenușiu păroasă la început, apoi roșcată și glabră. Frunzele sunt dispuse opus, scurt pețiolate, ovate (lungime cca. 2 cm, lățime cca 1 cm), cu marginea întreagă, tomentoase și nervuri slabe. Florile sunt foarte mici și grupate în inflorescențe globuloase (cca 0,5 cm diametru), la subsuara frunzelor superioare. Calicul este pielos, corola bilabiată, roșietică (de 2 - 3 mm lungime), androceul format din patru stamine mai mici decât corola, gineceul cu ovar superior înfloarește în iulie - august. Fructele sunt nucule grupate câte patru în caliculi persistent. Au formă ovoidală cu lungimea până la 1 mm, sunt netede, colorate de la galben la brun. MMB este de cca 0,2g.

Cerințe față de climă și sol. Măghiranul este o plantă cu pretenții mari față de climă. Are pretenții mari față de căldură și lumină. Este o plantă termofilă, sensibilă la înghețurile târzii de primăvară. Are cerințe destul de ridicate și față de apă, dând rezultate bune în condiții de irigare. Dacă are apă asigurată în sol, suportă bine și temperaturile ridicate din timpul verii. Reușește pe soluri adânci, ușoare, calde, fertile, bine aprovizionate cu calciu, cu reacție neutră. Reacția solului influențează atât acumularea uleiului volatil cât și compoziția sa. Nu merge pe solurile acide, grele, reci, care fac crustă ușor la suprafață.

Zonare. În țara noastră, măghiranul de cea mai bună calitate s-a obținut în județul Neamț (F. Crăciun și colab., 1977). Se recomandă în cultură în județele Neamț, Buzău, Dolj, Teleorman, Bihor, Timiș și în Ilfov (E. Păun și colab., 1983). Cele mai favorabile zone sunt sudul și vestul Câmpiei române (A. Mihalea, 1986).

4.19.8.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Măghiranul se cultivă după cereale de toamnă și prășitoare bine întreținute. Pe același teren poate reveni numai după 4 - 5 ani.

Pentru producerea de sămânță se aleg parcelele cu plante tipice, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea se face cu 50 - 60 kg/ha P_2O_5 și 40 - 50 kg/ha K_2O (încorporate cu arătura) și 60 - 80 kg/ha N (aplicat $\frac{1}{2}$ la pregătirea patului germinativ și $\frac{1}{2}$ după prima recoltare) (A. Mihalea, 1986, R. Stoianov, 2000).

Lucrările solului. Măghiranul este pretențios la modul de lucrare a solului. Arătura se execută la 25 - 28 cm adâncime, după eliberarea terenului de planta premergătoare. Patul germinativ se pregătește foarte bine cu combinatorul.

Sămânța și semănatul. Măghiranul se înmulțește prin semănat direct în câmp iar în zonele mai reci (cu brune târzii) se cultivă prin răsad (E. Păun, 1995). Sămânța trebuie să aibă puritatea de 80 % (minimum 65 %) iar germinația de 75 % (minimum 50 %).

Semănatul direct în câmp se face în luna aprilie (după gerurile târzii), asigurând densitatea de 30 - 32 plante/ m^2 (A. Mihalea, 1986). Se însămânțează cu semănători universale la distanța de 50 cm între rânduri și la adâncimea de 0,5 - 1 cm. Se folosesc 4 - 5 kg sămânță la 1 ha, amestecată cu material inert (rumeguș uscat) în raport de 1 : 2 și cu o plantă indicatoare (circa 100 g de sămânță de salată).




Fig. 4.19.8. *Majorana hortensis* L. Mnch.

Se înmulțește prin răsăd (în zone mai reci cu brume târzii) produs în răsădite calde (pregătite în a doua jumătate a lunii februarie) sau semicalde (pregătite la începutul lunii martie). Pentru 1 ha sunt necesare circa 100 m² de răsădită (400 g sâmbătă). Plantarea răsădului (de 5 - 7 cm înălțime) se face în aprilie - mai, la 50 cm între rânduri și 15 cm pe rând (cu 2 - 3 fire la cuib), asigurând o densitate de 340 - 400 mii plante/ha (A. Mihalea 1988).

Recomandarea pentru plantarea sau semănatul la 50 cm între rânduri se face pentru a se crea posibilitatea întreținerii mecanice și manuale a culturii (A. Mihalea, 1988). Menționăm și rezultatele comunicate de E. Scoreico, 1991 privind influența distanței între rânduri (tabelul 4.19.8.1.) și între plante pe rând (tabelul 4.19.8.2.) asupra producției de herba la măghiran (media pe anii 1986 - 1988). Se constată că cele mai bune rezultate s-au obținut la 30 cm între rânduri, urmat de 45 cm între rânduri, iar între plante pe rând la 10 cm, urmat de 20 cm.

Tabelul 4.19.8.1.
Influența distanței între rânduri asupra producției de herba uscată la măghiran (*Majorana hortensis* L.)

Distanța între rânduri (cm)	Producția de herba uscată (q/ha)	Diferența		Semnificația
		q/ha	(%)	
30	9,3	1,3	116	***
45	8	Mt	100	
60	5,8	-2,2	73	000
DL 5% = 0,65 q/ha DL 1% = 0,92 q/ha DL 0,1% = 1,29 q/ha				

Tabelul 4.19.8.2.
Influența distanței între plantele pe rând asupra producției de herba uscată la măghiran (*Majorana hortensis* L.)

Distanța între plante pe rând (cm)	Producția de herba uscată (q/ha)	Diferența		Semnificația
		(q/ha)	(%)	
10	9,0	1,5	120	***
20	7,5	Mt	100	
30	6,7	-0,8	89	0
DL 5% = 0,65 q/ha DL 1% = 0,87 q/ha DL 0,1% = 1,15 q/ha				

Lucrările de îngrijire. În cursul vegetației se fac prașile și pliviri pentru combaterea buruienilor, iar la culturile semămate se face

rărirea la 10 cm între plante pe rând. Buruienile se combat cu erbicidele: Devrinol (2,5 l/ha), înainte de semănat, cu Betanal (6 l/ha) și DMA-6 (1 l/ha) pe vegetație, iar pentru monocotiledonate, Furore (2 l/ha), când buruienile au 4 - 6 frunze (R. Stoianov, 2000). Alternanța se combate cu Dithane M-45 (0,25 %) sau Zineb (0,4 %) (A. Mihalea, 1986). Pentru prevenirea atacului de vierni - sârnă se prașiește cu Duplitol 5 + 3 PP (25 - 30 kg/ha), încorporat la pregătirea terenului. Molia se combate tot preventiv cu Lindatox 3 (15 - 16 kg/ha) sau Pinetox 10 (15 - 20 kg/ha). În zone secetoase se irigă, numărul udărilor fiind dependent de precipitațiile din anul respectiv.

În culturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice, slab dezvoltate și bolnave.

Recoltarea. De la o cultură de măghiran, în condițiile din țara noastră se obțin obișnuit două recolte de herba (în anii cu toamne lungi se fac chiar trei recolări). Recoltarea se face la începutul înflorului, în zile frumoase, după ce s-a ridicat roua. Zilnic se recoltează cantitatea ce se poate întinde pe locul de uscare sau cât se poate usca artificial. După tăiere plantele trebuie să se transporte în cca. 1 - 2 ore la locul de uscare. Măghiranul se recoltează prin tăierea tufelor cu secera la 5 - 7 cm de la suprafața solului.

Culturile semincere se recoltează când semințele au culoarea galben - brună (A. Mihalea, 1988). Plantele se taie cu secera, dimineața pe rouă, se lasă în mănunchiuri câteva zile, apoi se treieră, iar semințele se condiționează și se aduc la umiditatea de păstrare (12 %).

Condiționarea. Uscarea naturală a produsului se face la umbră (în încăperi uscate și aerisite), în straturi subțiri (cca. 5 cm) pe rame, hârte etc., durând cca. 5 - 6 zile. În timpul uscării, produsul se întoarce de 2 - 3 ori. Uscarea artificială se face la 30 - 35 °C. Randalmentul la uscare este de 4 - 5:1. Herba uscată în condiții bune este de culoare verde, cu miros și gust caracteristic. Se ambalează în saci sau în satele și se predă pentru prelucrare în cel mai scurt termen, pentru a nu se pierde conținutul de ulei volatil.

Condițiile tehnice de recepție ale măghiranului în funcție de modul de prelucrare. Pentru partea aeriană întreagă, în stare uscată, se admit: impurități maximum 5 %, formate din frunze brunificate; corpuri străine organice, maximum 2 %, iar cele minerale, maximum 1,5 %; umiditatea de maximum 12 %.

La produsul sitat, impurități (resturi de rădăcini): maximum 1 %; corpuri străine organice, maximum 1 %, cele minerale, maximum 0,5 %; umiditatea maximă 12 %.

La produsul superior (sitat) se admit: impurități, maximum 1 % (resturi de rădăcini), corpuri străine organice, maximum 0,5 %, iar minerale, maximum 0,25 %, umiditatea maximum 11 %. La cele trei produse, nu se admit fructificații.

Pentru produsul în stare proaspătă (destinat extragerii uleiului) se admit: maximum 2 % impurități (frunze brunificate); corpuri străine organice, maximum 2 %, iar cele minerale, maximum 0,3 %; umiditatea normală a produsului în stare proaspătă, fără urme de apă.

Producția medie este de 15 - 20 q/ha herba uscată (în condiții de irigare se obține până la 30 q/ha herba uscată).

În loturile semincere de măghiran se obțin 2 - 3 q/ha nucule.

4.19.9. CIMBRUL DE CULTURĂ (Cimbrul de câmp) (*Thymus vulgaris* L.)

Fr: Thym; E: Thyme, Garden thyme; G: Garten Thymian

4.19.9.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Cimbrul de cultură (Cimbrul de câmp, Lămâioară, Cimbrul, Cimbrul adevărat) este cunoscut și utilizat de foarte mult timp, ca plantă medicinală și condimentară. El a fost luat în cultură din antichitate. Plinius (cit de V. Velican, 1965) menționează existența atât a formei cultivate cât și a celei sălbatice.

Materia primă și compoziția chimică. La cimbrul de cultură, materia primă este partea aeriană (*Thymi herba*) proaspătă sau uscată.

Thymi herba conține ulei volatil în proporții diferite în funcție de proveniență și condițiile de cultură, fiind cuprins între 0,2 - 0,9 % în produsul proaspăt și 0,8 - 2,5 % în cel uscat (V. Cucu și colab., 1982; U. Stănescu și colab., 2004; C. Biel și colab., 2005).

Florile și frunzele au conținutul cel mai ridicat de ulei volatil (peste 2 %). Tulpinile reprezintă cca o treime din masa plantei și au un conținut redus în ulei volatil (0,4 %). Uleiul volatil conține în cantitate mai mare (20 - 60 %) fenoli (timol 20 - 40 %, carvacrol), apoi hidrocarburi terpenice (p-cimen, α-pinen, β-pinen, camfen, limonen etc.), compuși oxigenați (linalool, geraniol, acetat de bornil, acetat de linalil etc.). La diferite proveniențe ale acestei specii s-au determinat în uleiul volatil, 3 - 4 componente principale (borneol, linalool, timol și acetat de linalil) (I. Cered-Csegedi, 1976). Planta mai conține acizi triterpenici (ursolic, oleanolic), flavonoide (derivați de luteolină și

apigenină etc.), tanin (cca. 10 %), acizi fenilpropanici (cafeic, clorogenic și rozmarinic), pentozani, parafine, vitamine (B₁, C), lipide (2,1 - 2,7 %), proteine (6,8 - 9,1 %) etc. (V. Cucu și colab., 1982; C. Broucke și colab., 1982). În *Pharmacopeea Română* figurează *Aethroleum thymi* (ulei de cimbru), obținut prin distilare cu vapori de apă din părțile înflorite ale plantei, cu un conținut de cel puțin 25 % (v/v) compuși fenolici (timol, carvacrol etc.).


Utilizări. Compușii din herba au efect expectorant, diuretic, coleretic - colagog (principiu amar), antihelmintic și antiseptic (datorită timolului etc.). Ceaiul din această plantă, datorită uleiului volatil, are proprietăți expectorante, calmând spasmele căilor respiratorii, fiind folosit la tratarea tusei convulsive, bronșitei și răgușeli (împreună cu alte plante). Tinctura intră în formula preparatului **Tusomag** (pentru afecțiunile căilor respiratorii), iar uleiul intră în compoziția produsului **Carmol** (contra mialgiilor). Amintim și preparatele: **Broncholand**, **Pertussin**, **Tussispect**, **Bronchicum** etc. Produsul vegetal intră în compoziția **ceaiurilor: Contra Colicilor nr. 2 și Pectoral nr. 2**. Uleiul volatil se folosește ca aromatizant și dezinfectant (ape de gură, gargarisme, paste de dinți), în parfumerie, cosmetică (loțiuni cu efect antiseptic) etc. *Thymi herba*, sub formă uscată, se folosește la prepararea conservelor (datorită mirosului plăcut) și condiment la prepararea unor produse alimentare. Cimbrul este apreciat ca plantă meliferă și ornamentală, putându-se cultiva și în acest scop.

Răspândire. Specie mediteraneană, cimbrul de cultură crește spontan pe locuri calcaroase, stâncioase (până la altitudini de 1000 m) în Spania, sudul Franței și Grecia, vestul și sudul Italiei. Cultura este răspândită în aceste zone, însă s-a introdus până în zonele nordice ale Europei (Norvegia), în nordul Africii și în America de Nord.

La noi în țară se găsește numai sub formă cultivată (E. Păun, 1995) cu rezultate mai bune în sud și sud - vest.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Thymus vulgaris* L. (fig. 4.19.9. după Flora României, vol VIII, 1961 și 4.19.9.a., original). Această specie are 2n = 30 (A. Laza și G. Rácz, 1975).

Se cunosc mai multe forme din care două au importanță mai mare (V. Cucu și colab., 1982): f. *capitatus* Willk et Lange și f. *verticillatus* Willk et Lange, din care s-au creat diverse soiuri cultivate, mai cunoscute fiind „Cimbrul francez de vară” și „Cimbrul german de iarnă” (mai rezistent la temperaturi joase).

Fig. 4.19.9. *Thymus vulgaris* L.

Compuși uleiului volatil ai unor specii de *Thymus* (*T. vulgaris* L., *T. satyroides* Cass, *T. serpyllum* L. și *T. zizys* L.) au fost studiate de A. Herisset și colab., 1973.

La noi în țară, din specia *Thymus vulgaris* L., se cultivă soiul local (populația) „De Dolj” din anul 1973) și soiul Smarald (din anul 1994), ultimul cu producție și calitate superioară populației locale (C. Barbu și M. Toma, 1997).

Particularități biologice. Cimbriul de cultură este un subarbust. Din anul doi până în anul cinci de vegetație realizează producții constante. Rădăcina, în anul întâi, este pivotantă (cca 20 cm adâncime), care ramifică mult în anii următori. De pe acestea pornesc mai multe tulpini care dau plantei aspect de tufă (din anul al III-lea de vegetație). Tulpina este lignificată la bază și acoperită de un suber cenușiu. Ramurile tinere sunt ierboase și acoperite cu peri îndreptați în jos. Înălțimea tulpinii este de cca. 40 cm. Frunzele sunt dispuse opus, ovat - lanceolate, mici (6 - 10 mm lungime și 2 - 4 mm lățime), păroase pe dos. Florile sunt mici, dispuse la subsuara frunzelor superioare, în inflorescențe specifice, spiciforme, laxe. Florile au caliciu tubulos, corola bilabiata, de culoare roșie - violacee. Înfloresc în luna iulie. Fructele sunt nucule grupate câte patru în caliciu persistent, sunt elipsoidale, brune mici (sub 1 mm) cu MMB de 0,2 - 0,25 g. Semințele își mențin germinația până la trei ani, în condiții bune de păstrare (V. Velican, 1965).

Cerințe față de climă și sol. Cimbriul de cultură este o plantă cu cerințe ridicate față de lumină și căldură, ca și levănțica. Față de aceasta are însă o rezistență la ger ceva mai scăzută. Plantele de cimbri de cultură sunt afectate la temperaturi negative de -20 - 25 °C, în iernile fără zăpadă și la gerurile târzii de primăvară. Nu suportă umbrirea. Conținutul de ulei este influențat favorabil de zilele însorite și calde. Cerințele față de umiditate sunt mai mari la răsărire și în primele faze de vegetație. În anii următori, planta are cerințe mai mici față de apa suportând bine perioadele de secetă. Excesul de ploi dăunează producției și calității. Nu are cerințe ridicate față de sol. Reușește bine pe soluri ușoare, calde, drenate și fertile. În condiții de fertilizare valorifică și solurile pietroase de luncă sau cele de pe pante însorite. Se poate folosi în lucrările antierozionale. Nu merge pe solurile grele, reci, cu apa freatică la suprafață.

Zonarea. Cea mai favorabilă zonă este considerată Câmpia Olteniei, județele Olt, Dolj), urmată de Câmpia Bărăganului (Ialomița, Brăila, Buzău și în Ilfov) Câmpia Burnazului, Subcarpații răsăriteni (Neamț, Bacău) și Câmpia Timișului (E. Păun și colab., 1983).

4.19.9.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Cimburl de cultură se amplacează în afara asolamentului, cultura durând 5 - 6 ani. Se amplacează după leguminoase pentru boabe, borceag, cereale păioase, cartof, plante de nutreț. Pe același teren poate reveni numai după 6 - 7 ani. Unele cercetări evidențiază ca producțiile cele mai ridicate de herba și ulei se obțin în anul III și IV de vegetație (E. Păun, 1988).

Pentru producerea de semințe se aleg parcelele tipice, sănătoase, fără cuscută.

Fertilizarea. Anual se aplică 60 - 80 kg/ha P_2O_5 și circa 40 - 50 kg/ha K_2O (toamna) și 80 - 100 kg/ha N (primăvara) (C. Barbu, 2000).

Lucrările solului. Terenul se pregătește în funcție de modul de înmulțire (semănat direct în câmp sau plantat). Arătura se efectuează la 28 - 30 cm adâncime. Când se seamănă direct în câmp, patul germinativ trebuie să fie bine mărunțit.

Înmulțirea. Cimburl de cultură se poate înmulți prin sămânță (semănat direct în câmp sau răsad) și pe cale vegetativă (despărțirea tufelor sau prin butași). Sămânța trebuie să aibă puritate de 85 % (minimum 75 %), iar germinația de 75 % (minimum 65 %).

Semănatul direct în câmp, pe soluri curate de buruieni și cu precipitații suficiente primăvara, se face la intrarea în iarnă sau primăvara foarte devreme, la 50 cm între rânduri și la 0,5 - 1 cm adâncime, folosindu-se 3 - 4 kg sămânță la ha (amestecată cu material inert).

Plantatul. Răsadul (circa 200 mii fire pentru 1 ha) se produce în răsadnițe calde sau semicalde (circa 60 m² și 0,3 - 0,6 kg sămânță) sau în straturi reci (60 - 80 m² și 0,4 - 0,5 kg sămânță, ce se seamănă în martie sau în iulie - august) și trebuie să aibă 5 - 10 cm înălțime. Se plantează primăvara după înghețurile târzii, iar răsadul din straturile reci se plantează în iunie sau în octombrie (în funcție de perioada producerii răsadului), la 50 cm între rânduri și 20 - 25 cm pe rând (câte 1 - 2 fire la cuib în funcție de vigoarea răsadului) în funcție de vigoarea răsadului (E. Păun, 1988, C. Barbu, 2000). În condițiile de la Fundulea s-au obținut cele mai bune rezultate prin plantarea cimbrului de cultură la 50 cm între rânduri și 20 cm între plante pe rând (tabelul 4.19.9.1., după E. Scoreico, 1992, media anilor 1986 - 1989).

Lucrările de îngrijire. Se fac prașile și pliviri pentru combaterea buruienilor, iar la culturile semănate, după răsărire, se

rădesc la 15 - 20 cm între plante pe rând. Ca erbicide se pot folosi înainte de plantare: Kerb (2 kg/ha), Prometrex (5 kg/ha), Afalon (2 kg/ha), iar în anii următori, primăvara, înainte de pornirea în vegetație a plantelor (C. Barbu, 2000). Buruienile monocotiledonate se combat cu Fusilade (3 l/ha) sau Furore (2 l/ha), aplicate când acestea au 4 - 6 frunze (E. Păun, 1995).

Tabelul 4.19.9.1.
Influența distanței între plante pe rând asupra producției de herba uscată la cimburl de cultură (*Thymus vulgaris*)

Distanța între plante pe rând	Producția (q/ha)		Diferența		Semnificația
	q/ha	Mt.	q/ha	%	
20 cm	28,2			100	
30 cm	23,9	-4,3		85	000
40 cm	21,1	-7,1		75	0

DL 5% = 2,5 q/ha; DL 1% = 3,3 q/ha; DL 0,1% = 4,2 q/ha

În culturile semincere se face purificarea biologică (lăsând plantele tipice), se menține lanul curat de buruieni, se combate cuscuta, iar pentru activarea polenizării prin albine, se amplacează 2 - 3 stupi la ha (F. Crăciun și colab., 1977).

Recoltarea. În primul an de cultură se obține o recoltă (în septembrie), iar din anul doi se recoltează de 2 - 3 ori pe an. După cum s-a arătat, cimburl cultivat asigură producții bune până prin anul V de cultură.

Momentul recoltării este de la butonizare până la deschiderea primelor flori, când conținutul de ulei volatil este cel mai ridicat. Dacă se întârzie, tulpinile se lignifică, frunzele îmbătrânesc, iar produsul scade în calitate. Prezentăm în tabelul 4.19.9.2. rezultatele de la SCPMA Fundulea (după R. Lupeanu, citat de E. Păun, 1988), privind influența epocii de recoltare asupra conținutului de ulei volatil la cimburl de cultură. Se constată că după faza de butonizare, conținutul de ulei volatil în herba scade în celelalte faze de vegetație.

Recoltarea se face pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua (orele 10 - 14). Se taie cu secera la 10 - 15 cm de la sol, fără partea lignificată și fără să se smulgă plantele, folosindu-se seceri bine ascuțite. Produsul destinat extragerii uleiului, se transportă în cel mai scurt timp la distilerii sau se usucă.

Culturile semincere se recoltează începând din anul doi de vegetație, când circa 70 % din inflorescențe au ajuns la maturitate (dacă se întârzie, semințele se scutură ușor). După tăiere, plantele se usucă, apoi se treieră, iar sămânța se condiționează cu site speciale.




Fig. 4.19.10. *Satureja hortensis* L.

Frunzele dispuse opus, sunt înguste, linear - lanceolate, sesile, glabre și cu marginile întregi (lungime 10 - 30 mm, lățime 2 - 5 mm). Florile sunt grupate câte 3 - 6 în verticile dispuse la subsuara frunzelor de la nodurile superioare ale ramurilor. Corola este bilabiată, lungă de 5 - 7 mm, violacee sau alburi, cu macule roșii. Înfloreste în iulie - octombrie. Fructele, nucule, grupate (câte patru în calicil persistent, sunt brune, ovoidale, trunchiate, netede și lucioase; MMB este de cca 0,25 g. Planta are un miros și gust plăcut, arom.

Cerințele față de climă și sol. Plantă de origine mediteraneană, cimbriul de grădină are cerințe ridicate față de temperatură. Este sensibil față de înghețurile de primăvară, care pot compromite cultura. Temperaturile scăzute primăvara influențează negativ vegetația. Este plantă heliofilă, sensibilă la umbră. Cerințele față de apă sunt mai mari la răsărire și în prima parte a vegetației. Reușește pe soluri cu textură mijlocie, afânate și drenate, calde, cu expoziție sudică. Nu suportă solurile reci, cu apă freatică sus și cele cu textură argiloasă.

Zonarea. Este recomandat să se cultive în Câmpia Bărăganului, Câmpia Burnazului (M. Mircea, 1986), precum și în județele Bihor, Bacău și Neamț (E. Păun și colab. 1983). Prin grădini se cultivă și în alte zone agricole ale țării.

4.19.10.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Cimbriul de grădină se cultivă după leguminoase, prășitoare fertilizate și cereale de toamnă bine întreținute (E. Păun, 1995).

Pentru producerea de semințe se aleg parcele cu plante tipice, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea se face cu 50 - 60 kg/ha P_2O_5 și 35 - 60 kg/ha K_2O (toamna) și 50 - 80 kg/ha N (primăvara) (N. Ungureanu, 2000).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 25 - 28 cm adâncime. Pretinde o bună măruntire și nivelare a patului germinativ. Lucrarea se execută cu combinatorul în preajma semănăturii.

Sămânța și semănatul. Cimbriul de grădină se înmulțește prin semănat direct în câmp. Sămânța trebuie să aibă o bună valoare culturală, cu puritatea de 85 % (minimum 70 %), germinația de 70 % (minimum 50 %) și să fie lipsită de semințe de cuscă. Semănatul se face cu semănătorile universale (SUP-21 și SUP-29, prevăzute cu distribuitori speciali și limitatori de adâncime) în prima decadă a lunii aprilie (când pericolul înghețurilor a trecut), asigurând densitatea de 100 - 110 plante/ m^2 . Se însămânțează la 50 cm între rânduri și la

adâncimea de 1 - 2 cm, folosindu-se circa 4 - 5 kg sămânță la ha. În tabelul 4.19.10.1. (după I. Constantin și M. Mircea, citat de A. Dumitrescu, 1988) se prezintă influența distanței de semănat asupra producției la cimbrul de grădină (în perioada 1978 - 1980 la SCPMA Fundulea). Se constată că cele mai bune rezultate s-au obținut când s-a semănat la 50 cm între rânduri.

Tabelul 4.19.10.1.
Influența distanței de semănat asupra producției la cimbrul de grădină

Distanța de semănat (cm)	Producția de herba uscată	
	q/ha	%
25	1,8	100
37,5	2,1	116
50	2,7	150

Lucrările de îngrijire. Buruienile se combat prin prașile și pliviri. Se pot folosi erbicidele: Triflurex (3 l/ha), încorporat la pregătirea patului germinativ Gesagard (3 kg/ha) sau Afalon (2 kg/ha) aplicate imediat după semănat (N. Ungureanu, 2000). Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate (costrei, mohor, pir) se folosesc erbicidele Furore (2 l/ha) sau Fusilade (3 l/ha), aplicate când acestea au 4 - 6 frunze (E. Păun, 1995). Contra ruginii se recomandă tratamente cu Plantavax 75 WP sau Dithane M 45 în concentrație de 0,2 % (M. Mircea, 1986). Această boală este foarte păgubitoare, putând reduce producția (cu 40 - 50 %) și calitatea materiei prime. Cuscuta se previne prin folosirea seminței decuscutate și distrugerea vetrelor (cosire și ardere), care apar în lan.

În culturile semincere se face purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. Se recoltează herba când 40 - 50 % din plante sunt înflorite. Se taie plantele la 5 - 7 cm de la sol, manual (cu seceră), sau mecanic cu cositori.

Culturile semincere se recoltează când peste 70 % din inflorescențe au ajuns la maturitate, iar semințele au culoarea specifică.

Condiționare. După recoltare se înlătură tulpinile groase și toate impuritățile apoi produsul se trece la uscat. Se poate usca pe cale naturală la umbră, în încăperi uscate și aerisite, sau artificial, la maximum 35 °C. Rândamentul la uscare este de 4 - 5:1.

Condițiile tehnice de recepție sunt în funcție de produs (în stare proaspătă sau uscată).

În stare uscată, produsul trebuie să fie format din ramuri tinere, fără parte lignificată la bază. Se admit: ca impurități maximum 2 % tulpini ramificate cu frunze brunificate și maximum 1 % frunze scuturate; corpuri străine organice și minerale, maximum 0,5 % pentru fiecare; umiditatea maxim 13 %. Nu se admit fructificații.

În stare proaspătă, la produsul destinat extracției de ulei se admit: maximum 10 %, frunze brunificate și maximum 1 % alte impurități; corpuri străine organice, maximum 2 %, minerale, maximum 1 %; umiditatea normală a produsului în stare proaspătă.

Produsul sitat trebuie să aibă sub 2 % impurități (fragmente de tulpini lignificate, frunze brunificate); corpuri străine organice și minerale, maximum 0,5 % pentru fiecare; umiditatea de maximum 13 %. Nu se admit fructificații în produs.

Producția de herba proaspătă este de 100 - 150q/ha, respectiv 20 - 30 q/ha herba uscată.

În culturile semincere de cimbru de grădină, se pot obține 300 - 500 kg/ha nucule.

4.19.11. BUSUIOCUL (*Ocimum basilicum* L.)

Fr: Basilic, Basilic de Jardins; E: Basil;

G: Basilienkraut, Basilic

4.19.11.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Busuiocul este cunoscut și utilizat din antichitate. Numele genului *Ocimum* vine de la grecescul „okimon” (I. Grințescu, 1961), numele plantei la vechii greci.

Materia primă și compoziția chimică. De la busuioc se folosește partea aeriană (*Basilici herba*) în stare uscată sau proaspătă.

Conținutul de ulei volatil în herba este de 0,04 - 0,7 % (U. Stănescu și colab., 2004) sau de la 0,2 până la 1 % ulei volatil și alți constituenți % (V. Istudor, 2001, J. Purkayastha și colab., 2006). Uleiul volatil, în funcție de biotip, conține estragol (metilchavicol), linalool, eugenol, citral, camfor, cineol etc. La un produs autohton (herba uscată), V. Hodișan și colab., 1983, au determinat un conținut de ulei volatil de 0,28 - 0,38 ml/100 g, identificând 20 de componente, principale fiind metilchavicolul (33,76 %) și linaloolul (24,76 %), urmate de α -pinen, camfen, β -pinen, limonen, ocimen etc.

Utilizări. Compușii din părțile aeriene au efect antiseptic intestinal, carminativ, stimulent al digestiei și expectorant. S-a constatat că uleiul volatil de busuioc are acțiune antibacteriană și antimicotică (M. Tănaș și colab., 1975). Produsul vegetal se folosește ca infuzie. Este apreciat mult în medicina populară, având variate utilizări tradiționale. Uleiul are utilizări în industria alimentară, a parfumurilor și în cosmetică.

Răspândire. Plantă considerată ca originară din sudul continentului Asiatic, probabil India (E. Păun, 1995) și China (Al. Buia, 1944), întâlnită și în Africa și în regiunile subtropicale ale Americii (E. Coicui, 1967), este răspândită în cultură în multe zone pe glob. La noi în țară se cultivă mult prin grădini, având variate utilizări tradiționale.

Sistematică. **Soiuri.** Specia cultivată este *Ocimum basilicum* L. (fig. 4.19.11., după Flora României, vol VIII, 1961 și 4.19.11.a., original). *O. basilicum* are $2n = 48$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). În alte țări se cultivă și speciile *O. canum* Sims, *O. gratissimum* L., *O. sanctum* L. și alte specii tropicale (E. Coicui și G. Răcz, 1962). Este amintită și specia *Ocimum carnosum* Lk. et Otto (S.N. Sobti, 1981).

La noi în țară se cultivă din specia *O. basilicum* L., soiul local (populația „De Radovanu” (din anul 1975) și soiurile Basilica (din anul 2000) și Geea (din anul 2005). În scop legumicol se cultivă soiul de busuioc Aromat de Buzău (din anul 2005).

Particularități biologice. Busuiocul este o plantă anuală, erbacee, cu perioadă de vegetație scurtă (cca. 100 zile). Rădăcina este ramificată, fibroasă, de culoare brună. Tulpina este de 30 - 60 cm înălțime, ramificată, tetramuchiată, păroasă mai ales spre vârf. Frunzele sunt dispuse opus, pețiolate, cu limbul ovat, ascuțit la vârf, distanțat dințat, glabru și lucios, cu lungimea de 3 - 5 cm și lățimea de 2 - 2,5 cm. Florile sunt grupate câte 5 - 6 în pseudoverficile în partea superioară a ramurilor, formând inflorescențe spiciforme. Florile au caliciu bilabiat (labul superior reniform și mare), corola are labiul superior cu 4 dinți, de culoare albă sau roză, androceul este format din patru stamine, iar gineceul are stigmațul ieșit afară din corolă. Înflorirea are loc din iulie până în septembrie. Fructele sunt nucule, grupate câte 4 în caliciul persistent, de formă ovoidală, de 1,5 - 2 mm lungime și 1 mm lățime, de culoare brun - închis (negricioase), MMB de cca 1.2 - 1.7 g; în mediu umed devin mucilaginoase. Planta are un miros aromatic, specific.



Fig. 4.19.11. *Ocimum basilicum* L.

Cerințele față de climă și sol. Busuiocul este o plantă cu cerințe ridicate față de căldură și lumină. Este sensibil la înghețurile târzii de primăvară. Față de umiditate, cerințele nu sunt prea mari, având și o bună rezistență la secetă. Pretinde soluri fertile, mijlocii spre ușoare, permeabile, care nu fac crustă. Sunt potrivite solurile cu expoziție sudică, ferite de vânturi. Nu merge pe soluri reci, grele, cu apă stagnantă, nici pe nisipuri sau sărături.

Zonare. Busuiocul este recomandat să se cultive în Câmpia Bărăganului, Câmpia Burnazului, Câmpia Olteniei, Câmpia Mureșului, Câmpia Crișurilor și în jud. Neamț (E. Păun și colab., 1983). Prin grădini se cultivă și în alte zone agricole, pentru necesități locale.

4.19.11.2. Tehnologia de cultivare

rotația. Busuiocul se amplasează după leguminoase pentru boabe, trifoi (fără cuscută), cereale de toamnă și prășitoare fertilizate și bine întreținute. Pe același teren poate reveni numai după 4 - 5 ani.

Pentru obținerea semințelor se aleg parcele cu plante tipice, sănătoase, bine dezvoltate și bogate în înflorire.

Fertilizarea se face cu 40 - 50 kg/ha P_2O_5 și 30 - 40 kg/ha K_2O (sub arătură) și 70 - 90 kg/ha N (incorporat la pregătirea patului germinativ sau în două reprize) (E. Scoreico, 1986, V. Plugaru, 2000).

Lucrările solului. Arătura se execută la 25 - 28 cm adâncime și se întreține curată de buruieni, prin lucrări cu discul în agregat cu grapa. Dacă semănatul se face direct în câmp, patul germinativ trebuie să fie mărunțit și nivelat, folosindu-se în acest scop combinatorul. Înainte de semănat se face o tăvălugire cu tăvălugul inelar pe solurile prea afânate.

Sămânța și semănatul. Busuiocul se înmulțește prin semănat direct în câmp sau prin răsăd (E. Păun, 1995). Sămânța trebuie să aibă puritatea de 90 % (minimum 80 %), iar germinația de 70 % (minimum 50 %).

Semănatul direct în câmp se face la mijlocul lunii aprilie (după brume), asigurând o densitate de 30 - 40 plante/ m^2 . Când temperaturile medii zilnice depășesc 15 °C, se asigură o germinație rapidă și uniformă (V. Plugaru, 2000). În două zone reprezentative pentru vestul țării, perioada optimă de semănat s-a dovedit a fi 1 - 10 mai (tabelul 4.19.11.1, după N. Bocorean, 2006). În aceleași condiții densitatea de 20 pl/ m^2 a asigurat sporuri semnificative de producție față de 10 pl/ m^2 , pe diferitele agrofonduri (N. Bocorean, 2006). Se

însămânțează cu semănători universale, la distanța de 50 cm între rânduri și la adâncimea de 1,5 - 2 cm. Cantitatea de sămânță la 1 ha este de 4 - 6 kg (amestecată cu 3 - 4 părți de material inert) (R. Bondrescu, 1982, V. Plugaru, 2000).

Rezultatele privind semănatul busuiocului obținute de R. Bondrescu la SCMA Fundulea în perioada 1977 - 1979 (citată după A. Dumitrescu, 1988) se prezintă în tabelele 4.19.11.2. (densitatea optimă de semănat) și 4.19.11.3. (norma de semănat). Cele mai bune rezultate s-au obținut în cazul semănatului la 50 cm între rânduri și cu 6 - 7,5 kg/ha sămânță.

Tabelul 4.19.11.1.

Influența perioadei de semănat asupra producției de herba proaspătă de busuioc în condițiile din vestul țării (ciclul experimental 2004 - 2006)

Perioada de semănat	Câmpia înaltă a Vîngăi				Lunca Bărăavei			
	Kg/ha	%	Dif.	Semnif	Kg/ha	%	Dif.	Semnif
10-20 aprilie (Mt.)	9580	100	-	-	9135	100	-	-
20-30 aprilie	9766	102	186	-	9850	109	715	xx
1-10 mai	10267	107	687	xx	11945	131	2810	xxx
10-20 mai	8097	84	-1483	000	10343	113	1208	xxx
DL 5%			423				313	
DL 1%			641				474	
DL 0,1 %			1030				1030	

Tabelul 4.19.11.2.

Distanța optimă de semănat la busuioc

Distanța între rânduri (cm)	Herba proaspătă	
	q/ha	%
40	43	100
50	45	105

Tabelul 4.19.11.3.

Studiul normei de sămânță la busuioc

Norma de sămânță, kg/ha	Herba proaspătă	
	q/ha	%
3	44	100
4,5	41	93
6	46	105
7,5	47	107

La înmulțirea prin răsăd, necesarul de material de plantare pentru 1 ha se obține pe circa 60 m^2 răsădnițe calde sau semicalde (însămânțate cu circa 300 g sămânță), iar plantarea răsădului (de 6 - 7 cm înălțime) se face la sfârșitul lunii aprilie, la 50 cm între rânduri și 20 cm pe rând (L.S. Muntean, 1990). În condițiile de la Cluj-Napoca s-au obținut rezultate bune cu răsăd de busuioc produs în pahare de plastic și plantat la 50/25 cm (D. Vârbă și colab., 2005)

Lucrările de îngrijire. În cursul vegetației se fac prașile și pliviri, pentru a menține solul curat de buruieni. Combaterea chimică a buruienilor se face preemergent cu Devrinol (4 kg/ha) și Triflurex (3 l/ha), iar postemergent cu Basagran (2 l/ha) și Furore (2 l/ha) (V. Plugaru, 2000). Cercosporioza se poate combate cu Dithane M-45 (0,3 %), iar contra vieniilor - sârmă se aplică Lindatox 3 PP (40 kg/ha) înainte de semănat (E. Scoreico, 1986). În culturile pentru extragerea uleiului se fac tratamente chimice, însă pentru cele de la care plantele se folosesc direct în terapeutică sau pentru ceaiuri nu se fac tratamente chimice, ci plantele bolnave se smulg și se ard.

În culturile semincere se efectuează purificarea biologică înlăturând-se plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. Busuiocul se recoltează când 25 - 30 % din plante au înflorit, prin tăierea părții aeriene la 8 - 12 cm de la sol. Se pot obține până la 2 - 3 recolte pe an. După recoltare, plantele se usucă sau se predau în stare proaspătă, pentru extragerea uleiului.

Loturile semincere se recoltează când 50 - 60 % din inflorescențe au ajuns la maturitate, iar semințele au culoarea brună, caracteristice speciei (A. Dumitrescu, 1988). Se recomandă ca inflorescențele să se taie (cu secera) dimineața pe rouă, iar după uscare la soare în strat subțire, se treieră. Semințele se condiționează să întrunească indicii de calitate

Condiționarea. Uscarea se face fie pe cale naturală, la umbră, în încăperi adecvate (curate și aerisite), fie artificial, la maximum 35 °C. Produsul nu se întoarce în cursul uscării. Rândamentul la uscare al herbei este de cca 6 : 1.

Condițiile tehnice de recepție sunt în funcție de produs (în stare proaspătă sau uscată).

Produsul sub formă uscată poate avea ca impurități maximum 5 % frunze brunificate și maximum 1 % tulpini brunificate, cu fructificații, ramuri fără frunze; corpuri străine organice și minerale maximum 0,5 % pentru fiecare; umiditatea maximă de 13 %; nu trebuie să conțină tulpini lignificate cu semințe peste limita admisă.

Produsul sitat poate avea ca impurități maximum 5 % frunze și flori brunificate, decolorate și maximum 2 % tulpini brunificate, cu fructificații, ramuri fără frunze; corpuri străine organice și minerale, maximum 0,5 % pentru fiecare; umiditatea maximum 13 %.

În stare proaspătă, se admit ca impurități maximum 5 % frunze galbene, decolorate și maximum 1 %, tulpini și ramuri fără frunze; corpuri străine organice și minerale, maximum 0,1 % pentru fiecare;

ulei volatil, minimum 0,04 %; umiditatea normală a produsului proaspăt la recoltare, fără urme de apă.

Producția totală de herba proaspătă pe an este de 80 - 100 q/ha, respectiv 20 - 30 q/ha herba uscată.

În loturile semincere de busuioc se obțin circa 400 kg/ha nucule.

4.19.12. ROSMARINUL

(*Rosmarinus officinalis* L.)

Fr: Romarin; E: Rosemary; G: Rosmarin

4.19.12.1. Importanță. Biologie. Ecologie

În antichitate, apoi în evul mediu, rosmarinul era cunoscut și apreciat ca plantă medicinală, frunzele sale fiind folosite în tratamentul diferitelor boli. În trecut era larg întrebuințat în farmacii, astăzi utilizările sale medicinale sunt mai reduse. Rosmarinul se crede că vine de la cuvintele grecești "rhops" (arbust mic) și "myrinos" (mirositor), fie de la cele latinești - "ros" (roua) și "marinus" (de mare) (I. Grințescu, 1961).

Materia primă și compoziția chimică. Rosmarinul se cultivă pentru partea aeriană (*Rosmarini herba*) sau frunze (*Rosmarini folium*).

Întreaga plantă conține ulei volatil, însă numai cel din frunze este considerat de calitate mai bună, având un miros mai plăcut. Produsul vegetal are un conținut de ulei volatil cuprins între 1 - 2,5 % (V. Istudor, 2001, U. Stănescu și colab., 2004). Conținutul în ulei volatil diferă în funcție de organul plantei, fiind în herba proaspătă și frunze de 0,22 - 1,2 %, în cele uscate de 1 - 2 %, iar în flori cca. 1,4 % (V. Cucu și colab., 1982, J. Sanchez-Blanco și colab., 2004). Uleiul volatil conține hidrocarburi terpenice (α -pinen, β -pinen, camfen, limonen, mircen etc.), cetone (canfor), alcooli esterificați (acetat de bornil, acetat de linalil), alcooli (borneol, α și β -terpineol, linalool etc.) etc., în proporții diferite în funcție de proveniența plantelor. După componentul care predomină se disting trei tipuri de ulei volatil de rosmarin: tipul cineol (Italia, Maroc, Tunisia), tipul canfor - borneol (Spania) și tipul α -pinen - verbenonă (originar din Corsica). În frunzele de rosmarin se găsește acid rosmarinic (acid labiatic), izolat întâi din această plantă, apoi găsit și în alte labiate, care se pare

că determină acțiunea antioxidantă a acestui produs vegetal, alături de acidul carnosic. Planta mai conține: flavonoide; flavone; acidul carnosic, o diterpenoidă, derivat al feruginolului (care imprimă acțiunea antioxidantă a frunzelor); rosmarinica; izorosmaricina; o serie de triterpene; tanin; vitamine etc. (V. Cucu și colab., 1982).

Utilizări. Frunzele de rosmarin au avut o largă utilizare în medicina empirică, fiind folosite în boli de stomac și intestine, stimulent aromatic, diuretic, vermifug, condiment etc. Extern ca parizicid (îndepărtarea moliiilor etc.), în obținerea spiritului camforat, ca analgezic în dureri reumatice și nevralgii. Este component al „Balsamului Opodeldoch”, utilizat în trecut în tratamentul reumatismului. Azi este confirmată acțiunea colagogă - coleretică, stimulent aromatic, bacteriostatic, având însă utilizări terapeutice mai reduse. Frunzele sunt apreciate mult ca și condiment. Uleiul volatil, extras din întreaga plantă sau frunze, este mult folosit în cosmetică și parfumerie.

Răspândire. Planta are origine mediteraneană, crescând spontan ca subarbust (veșnic verde) mai ales în Spania, sudul Franței, Italia, coasta Dalmată, Grecia, nordul Africii, unde se cultivă. Ca plantă ornamentală, în grădini sau în interior, este cunoscut în Europa centrală, Marea Britanie și America de Nord.

La noi în țară, este cultivat în scop ornamental în grădini țărănești (iarna fiind ocrotit în încăperi), iar cultura pe suprafețe mari se pretează în zonele sudice.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Rosmarinus officinalis* L. (fig. 4.19.12., după E. Coiciu și G. Rácz, 1962 și 4.19.12.a., original). Rosmarinul are $2n = 24$ (A. Laza și G. Rácz, 1975). În cadrul speciei se cunosc mai multe varietăți, dintre care mai importante sunt: var. *angustifolius* Guss., care este răspândită în sudul Franței, Italia, Corsica și var. *latifolius* Beg., în sudul Franței, Italia și în insulele din vecinătatea coastei Dalmate (V. Cucu și colab., 1982).

La noi în țară, se cultivă din specia *Rosmarinus officinalis* L. diferite proveniențe (importate) sau populații locale.

Particularități biologice. Rosmarinul este un subarbust sempervirescent, cu miros aromatic. Crește spontan în zona mediteraneană, la noi în țară existând ca plantă cultivată. Tulpina erectă de 50 - 150 (200) cm înălțime, la bază cu scoarța exfoliată, iar în partea superioară tetramuchiată și păroasă. Frunze sesile, lineare, persistente, până la 20 - 30 mm lungime și 2 - 3 mm lățime, pe față glabre și lucioase, pe dos tomentoase și cu nervura mediană evidentă.



Fig. 4.19.12. *Rosmarinus officinalis* L.

Florile sunt grupate în pseudoverticile, dispuse la subțioara frunzelor superioare, de forma unui spic lax. Florile au caliclu bilabiat, campanulat; corola bilabiată (labul superior - 2 petale, cel inferior - 3 petale, cea mediană mai dezvoltată), culoarea albastră sau albastră-violetee, rar albă; androcetul este format din 4 stamine (din care cele 2 posterioare sunt rudimentare sau hipsec), iar gineceul are ovar superior, la baza ovarului se află un disc nectarifer. Înfloarește din aprilie în iunie. Fructele sunt nucule grupate câte 4 în caliclu persistent. Sunt ovoidale, netede, de culoare cafenie, cu lungimea de 1,5 - 2,5 mm, iar lățimea de până la 1,5 mm.

Cerințe față de climă și sol. Plantă de origine mediteraneană, rosmarinul are cerințe foarte ridicate față de căldură. Este plantă perenă însă nu suportă iernarea decât în condițiile în care temperatura nu scade sub -2°C , -3°C , protejată de zăpadă și de un strat de mulci (F. Crăciun și colab., 1977). Planta are pretenții ridicate și față de lumină. Față de umiditate nu are cerințe ridicate, suportând bine și perioadele secetoase. Reușește pe soluri ușoare, profunde, drenate, care se încălzesc ușor, cu expoziție sudică și ferite de curenți reci.

Zonare. Rosmarinul este zonat în sud - vestul țării (Câmpia Timișului), unde iernile nu sunt prea aspre, însă se poate încerca și în zonele ferite de curenți reci din județul Constanța (F. Crăciun și colab., 1977).

4.19.12.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Cultura rosmarinului durează mai mulți ani, pe același teren putând reveni numai după 7 - 8 ani.

Fertilizarea. La înființarea culturii, se aplică 20 - 30 t/ha gunoi de grajd, 60 kg/ha P_2O_5 și 40 kg/ha K_2O (toamna) și 60 kg/ha N primăvara. Apoi, anual se fertilizează cu același doze de îngrășăminte chimice.

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 28 - 30 cm adâncime și se întreține curată de buruieni, prin lucrări cu discul în agregat cu grapa, până la plantare.

Plantarea. Rosmarinul se înmulțește prin răsad (produs de preferință în ghivece nutritive). Răsadul necesar pentru un ha, se produce pe circa 70 m^2 răsadnițe calde, folosind 600g sămânță. Dacă răsadul se produce în ghivece nutritive, necesită 150 m^2 răsadnițe și 300 g sămânță (înt-un ghiveci se seamănă 4 semințe și se lasă 1 - 2 plante). Înmulțirea prin răsad produs în ghivece nutritive dă rezultate mai bune. Plantarea se face în prima decadă a lunii mai (după brume târzii) la distanța de 1,2 m între rânduri și 1 m pe rând.

Lucrările de îngrijire. În cursul vegetației se fac prașile mecanice și manuale pentru a menține solul curat de buruieni și afănat. Se urmărește să se obțină tufe bine dezvoltate. Toamna plantele se mușuroiesc cu pământ, iar în primii 5 ani și cu un strat de paie (10 - 20 cm), când pământul începe să înghețe. Primăvara următoare, după dezgheț, se descoperă tufe de paie, se scurtează crenguțele (la 3 - 4 noduri) din care vor porni lăstari puternici, care vor constitui scheletul tufei. La 6 - 7 ani trebuie să se facă întinerirea tufelor prin tăierea plantelor la 7 - 8 cm de la colet.

Recoltarea. Începe din anul III de cultură, tăindu-se (cu secera sau foarfeca de vie) vârfurile florale, când plantele sunt în plină floare (F. Crăciun și colab., 1977). Anual se fac două recoltări. Imediat după recoltare, produsul se transportă la stațiile de distilare, pentru extragerea uleiului. Livrarea produsului se face în stare proaspătă.

Condiționarea. Din produs se înlătură părțile lignificate și alte impurități înainte de livrare

Condițiile tehnice de recepție prevăd ca acestea să fie format din tulpini foliate nelignificate (de maximum 1 - 2 ani), cu maximum 10 cm mai jos de ultima ramificație. Ca impurități se admit: maximum 5%: tulpini lignificate, care trec peste 10 cm, corpuri străine organice și minerale, maximum 1% pentru fiecare, umiditatea trebuie să fie cea prevăzută pentru materialul proaspăt, fără urme de apă.

Producția de materie primă cu vârfuri florale realizată anual este de 25 - 30 q/ha, în stare proaspătă.

4.19.13. CĂTUȘNICA

(*Nepeta cataria* L.)

Fr: Herbe-aux-chats, Cataire; E: Catmint; G: Katzenmelisse

4.19.13.1 Importanță. Biologie. Ecologie

Cătușnica este cunoscută și sub numele de cătușnică, iarba mărei, poala Sfintei Mării etc.

În țara noastră, cercetările pentru luarea în cultură a acestei plante s-au inițiat la începutul secolului trecut, în cadrul stațiunii de plante medicinale din Cluj (B. Pater, 1923).

Materia primă și compoziția chimică. De la cătușnică se folosește partea aeriană a plantei (*Nepeta herba*) în stare uscată sau proaspătă.

Materia primă conține ulei volatil (0,2 - 0,7 %) (format din carvacrol, nepetol etc.), flavone, acizi triterpenici și polifenol - carboxilici (V. Istudor, 2001; R. St. Hilarie și colab., 2004 etc.).

Utilizări. Are acțiune sedativă și tonic - amară, fiind utilizată în tusea spastică (sub formă de tinctură sau sirop).

Răspândire. *Nepeta cataria* L. este originară din Eurasia, planta fiind răspândită și în flora spontană a țării noastre. Se întâlnește prin păloage, pe lângă garduri, pe marginea drumurilor etc.

Sistematică. Soluri. Specia cultivată este *Nepeta cataria* L. (fig. 4.19.13., după Flora României, vol VIII, 1961 și 4.19.13.a., original).

La noi în țară din specia *Nepeta cataria* L., se cultivă soiul local (populația „De Băneasa” (din anul 1977).

Particularități biologice. Cătușnica este plantă perenă, erbacee, cu miros asemănător cu cel de lămâie. Are în sol un rizom lignificat, de pe care pornesc rădăcinile fibroase. Tulpina, tetramuchiată, are 40 - 100 cm, este ramificată și păroasă. Frunzele sunt dispuse opus, pețiolate (1 - 3 cm), ovate, la bază cordate, marginea crenată, cu fața inferioară tomentosă. Florile sunt grupate în verticile și dispuse la subsuara frunzelor din partea terminală a tulpinii. Corola este bilabiata de culoare alb - roșietică. Fructele sunt nucule elipsoidale, brune, netede (MMB cca 0,5 g), grupate câte patru în caliciul persistent.

Cerințele față de climă și sol. Are cerințe ridicate față de căldură și lumină. La temperaturi mai scăzute și în condiții de luminozitate mai slabe, acumularea uleiului volatil este mai redus. Față de umiditate este mai pretențioasă în prima parte a vegetației, până când crește masa vegetativă, ulterior excesul de ploi împiedică acumularea uleiului. Are cerințe deosebite față de sol. Reușește pe soluri mijlocii spre ușoare, permeabile și bogate în humus.

Zonarea. Se recomandă cultivarea în județele Brăila, Ialomița și Călărași.

4.19.13.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Cătușnica se cultivă după leguminoase și prășitoare bine întreținute (nu se cultivă după plante producătoare de uleiuri volatile). Cultura se menține mai mulți ani, pe aceeași solă putând reveni după 6 - 7 ani.

Pentru obținerea seminței se aleg parcele cu plante tipice, sănătoase și bine dezvoltate.




Fig. 4.19.13. *Nepeta cataria* L.

Fertilizarea se face cu 30 - 40 kg/ha P_2O_5 și 20 kg/ha K_2O , încorporate cu arătura adâncă, iar primăvara la pregătirea patului germinativ 40 - 50 kg/ha N. Din anul doi de cultură se aplică anual 20 kg/ha P_2O_5 .

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 25 - 28 cm adâncime și se menține curată de buruieni prin lucrări cu discul, iar patul germinativ se pregătește cu combinatorul în preajma semănăturii.

Sămânța și semănatul. Cătușnica se înmulțește prin semănat direct în câmp. Sămânța trebuie să aibă puritatea de 95 %, germinația de 70 %, iar MMB de circa 0,5 g. Semănatul se face între 20 martie și 10 aprilie, cu senători universale (echipate cu cutii pentru semințe mici), la 50 cm între rânduri și la 0,5 - 1 cm adâncime (folosind limitatoare de adâncime la brăzdare). Se folosește circa 2,5 kg sămânță la hectar, amestecată cu balast și cu sămânță de plantă indicatoare (cca. 100 g sămânță de salată) (L.S. Muntean, 1990). După semănat se tăvăluște pentru a pune în contact sămânța cu solul, favorizându-se imbibitia cu apă și rășărirea.

Lucrările de îngrijire. Prășitul între rânduri se începe imediat ce răsar plantele indicatoare. Apoi se menține solul curat de buruieni și afânat prin prășile și pliviri, de câte ori este nevoie. Rărirea se face după ce plantele au răsărit bine și au 4 - 5 frunze, la distanța de 15 cm pe rând. Și în anii următori, cultura se menține curată de buruieni prin prășile și pliviri.

În culturile semincere se face purificarea biologică, înlăturând plantele netipice, slab dezvoltate și bolnave.

Recoltarea. De la cătușnică se recoltează herba, a cărei conținut în ulei volatil depinde de faza de vegetație și ora recoltării. Prezentăm, după S. Radu și M. Toma, 1997, variația conținutului în ulei volatil la *Nepeta cataria* L., în funcție de organ și faza fenologică (tabelul 4.19.13.1.) și ora de recoltare (tabelul 4.19.13.2.). Herba se cosește la începutul înbobocirii, tăindu-se zilnic cât se poate prelucra (usca sau distila), la cca. 15 - 20 cm de la sol. După prima recoltare se prășește, iar la cca. 45 - 50 zile, se poate face recoltarea a doua (F. Crișciu și colab., 1977). Recoltările se fac pe timp frumos, numai după ce s-a ridicat roua.

Culturile semincere se recoltează când peste 60 % din plante au ajuns la maturitatea fiziologică. Plantele se taie cu secera, se usucă 3 - 5 zile la soare, apoi se treieră, iar semințele se condiționează.

Condiționarea. Uscarea materiei prime (herbei) se face pe cale naturală la umbră (în încăperi adecvate) sau pe cale artificială, la

temperatură de maximum 33 °C. Randalmentul la uscare este de 4 - 5 : 1.

Tabelul 4.19.13.1.
Variația conținutului în ulei volatil în funcție de organ și faza fenologică la *Nepeta cataria* L.

Faza fenologică	Conținutul în ulei volatil (ml %)		
	Herba	Tulpini	Frunze
Înbobocire	0,13	urne fine	0,3
Începutul înfloririi	0,12	urne fine	0,14
Înflorire deplină	0,11	urne fine	0,11
Sfârșitul înfloririi	0,07	urne fine	0,11
			0,08

Tabelul 4.19.13.2.
Variația diurnă a conținutului în ulei volatil la *Nepeta cataria* L.

Ora de recoltare	ml % ulei volatil	
	9	11
	0,09	0,11
	13	15
	0,08	0,08
	17	0,08

Condițiile tehnice de recepție sunt în funcție de produs (în stare proaspătă sau uscată).

Produsul uscat trebuie să fie format din partea aeriană recoltată înainte de înflorirea deplină, admitându-se ca impurități: maximum 3 % frunze brunificate și maximum 1 % resturi de tulpini nefoliate; corpuri străine organice și minerale, maximum 0,5 % pentru fiecare; umiditatea maximă 13 %; nu se admit fructificații.

Pentru produsul în stare proaspătă se admit ca impurități: maximum 2 % frunze îngălbenite și maximum 1 % resturi de tulpini; corpuri străine organice maximum 0,5 %, iar cele minerale, maximum 0,25 %; umiditatea normală a produsului proaspăt la recoltare; nu se admit fructificații.

Producția de herba uscată este de 25 - 30 g/ha.

În loturile semincere de cătușnică se obțin 300 - 500 kg/ha nucule.

4.19.14. TALPA GÂȘTII (*Leonorus cardiaca* L.)

Fr: Agripaune, patte de moche; E: Mother wort;

G: Gänsefuss, Löwenschwanz

4.19.14.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Planta se recoltează din flora spontană, însă având în vedere importanța ei, s-a impus introducerea acesteia în cultură (E. Păun, 1995). Planta se mai numește și cicone, coada leului, somnișor, creasta cocoșului etc.

Materia primă și compoziția Se utilizează părțile aeriene ale plantei (*Leonuri herba*), care conține principii amare (iridoide), alcaloizi (leunucardina), heterozide (glicozide) cardiotonice (cu acțiune similară strofantidinei), diptene, saponine, taninuri, flavonoide, corpuri fenilpropanici, ulei volatil, vitamine A, C și E (în uleiul de semințe), acizi organici, substanțe minerale etc. (F. Crăciun și colab., 1977, E. Păun 1995, E. Grigorescu și colab., 2001, M. Tămaș și colab., 2005).

Utilizări. Principiile active din *Leonuri herba* produc relaxarea cordului și a musculaturii netede care alimentează cordul. Are utilizări ca sedativ nervos și cardiac, stomahic, antispastic, vasoconstrictor periferic, antihipertensiv. Se recomandă în tulburări vegetative funcționale ale cordului. Se pare că acționează în mod analog cu valeriana, dar cu efect depresiv de circa 3 - 4 ori mai mare ca al acesteia (E Grigorescu și colab., 2001). Are utilizări în nevroze cardiace, în scăderea tensiunii arteriale (în hipertensiune), în liniștirea stărilor de sufocare în astm, în tulburări de menopauză, în hipertiroidism etc. *Leonuri herba* intră în produsele farmaceutice: **Ceai antiasmatic, Ceai calmant, Ceai calmant împotriva tulburărilor cardiace, Ceai sedativ.**

Răspândirea. Specie eurasică, este răspândită în țara noastră din zona de câmpie și până în cea de dealuri (până la 500 - 600 m). Crește în locuri ruderale, pe marginea drumurilor, a căilor ferate, pe terenuri necultivate, prin poieni și pe marginea pădurilor.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Leonorus cardiaca* L. (fig. 4.19.4., după E. Coiciu și G. Racz, 1962 și 4.19.4.a., original).




Fig. 4.19.14. *Leonorus cardiaca* L.

În scop medicinal se recoltează herba de la specia *Leonorus quinquelobatus* Gilib. (considerată în prezent o subspecie (*L. cardiaca* ssp. *villosus* Hyl.) cu peri pe toată tulpina. Se poate confunda ca pot cu *Chaiturus marrubiastrum* (L.) Rech. (sin. *L. marrubiastrum*), (coada măței) care crește în zone ceva mai umede (poieni umede și văle apelor), are frunze eliptice, iar acțiunea sedativă similară cu a speciei *L. cardiaca* L.

În cultură se pot folosi diferite populații locale, de *Leonorus cardiaca* L. productive și cu un conținut ridicat în principii active.

Particularități biologice. *Leonorus cardiaca* L. este o plantă ierboasă, perenă, erectă, viguroasă. În sol are un rizom, scurt de 1 - 2 cm grosime, de pe care pornesc anual tulpini aeriene și rădăcini de 20 - 30 cm lungime și subțiri (1 - 2 mm grosime). Tulpinile de 1 - 1,5 m, pornesc mai multe de pe rizom, sunt tetranuchiate, goale în interior, cu peri pe muchii (*L. cardiaca*) și cu peri de jur împrejur (*L. quinquelobatus*). Frunzele sunt dispuse opus, palmat - lobate, cu 3 - 5 lobi dințiți (cele superioare au trei lobi), cu aspect de labă de găscă, au 6 - 12 cm lungime și 4 - 10 cm lățime, cu peri aspri, iar petiolul de 1 - 3 cm lungime. Florile sunt grupate câte 10 - 20 în verticile (pseudo - verticile) strânse, dispuse la subsuara frunzelor din partea superioară a plantei (ultimele 10 - 15 noduri), cu corola de culoare roz și lungă de circa 1 cm. Fructele sunt nucule ovoidale, lungi de circa 2 mm și grupate câte patru la baza calicului persistent. Înfloarește din iunie până în august.

Cerințe față de climă și sol. *L. cardiaca* L. este mai puțin pretențioasă față de climă și sol. Vegetează bine în condiții de lumină și semiumbă. Nu are pretenții deosebite față de umiditate. Valorifică diferite tipuri de soluri.

Zonare. Se poate cultiva în diferite zone agricole ale țării. Recomandabil în arealele de răspândire naturală.

4.19.14.2. Tehnologie de cultivare

Rotăția. *Leonorus cardiaca* L., fiind o plantă perenă (cultura durează mai mulți ani) se amplasează în afara asolamentului. Se recomandă să se cultive după borcaguri, leguminoase pentru boabe, sau alte plante care lasă terenul curat de buruieni.

Fertilizarea. La înființarea culturii, sub arătura adâncă se aplică circa 25 t/ha gunoi de grajd bine fermentat. Anual se aplică îngrășăminte chimice în doze dependente de fertilitatea solului (N₃₀₋₅₀, P₃₀₋₄₀ K₄₀).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 28 - 30 cm adâncime, imediat după eliberarea terenului de către plantele premergătoare și se menține curată de buruieni, prin lucrări cu discul. Patul germinativ se pregătește cu combinatorul, urmând ca înainte de semănat terenul să se tăvălugească cu tăvălugul inelar.

Sămânța și semănatul. Cultura se poate realiza prin semănat direct în câmp, iar pe suprafețe mici prin producerea de răsad în pământ de plastic, sau chiar pe cale vegetativă, prin transplantarea unor plante recoltate din flora spontană (E. Păun, 1995). Sămânța trebuie să aibă valoare biologică și culturală corespunzătoare.

Semănatul direct în câmp se face toamna târziu (când se obțin rezultate mai bune) sau primăvara devreme (în prima urgență), la 62,5 - 75 cm între noduri, 1 - 1,5 cm adâncime, folosind 3 - 4 kg/ha sămânță, la care se adaugă 50 - 100 g salată, ca plantă indicatoare (E. Păun, 1995).

Lucrările de îngrijire. În tot timpul cât durează cultura, se va menține terenul curat de buruieni prin prașile între rânduri și pliviri pe rând, de câte ori este nevoie.

Recoltare. Herba se recoltează cu coasa sau cu cositoarea mecanică, iar pe suprafețe mici cu secera, de la înflorire, până când începe fructificarea (iunie - iulie), tăind numai tulpina nelignificată (la 25 - 30 cm de la suprafața solului).

Condiționarea. După recoltare, din herba se înlătură impuritățile și se usucă pe cale naturală, în strat subțire, la umbră, în spații bine aerisite, sau pe cale artificială la 35 - 40 °C. Randamentul la uscare este de 3,5 - 4; 1.

Condițiile tehnice de recepție prevăd ca herba să nu aibă ramuri lignificate, plante brunificate și fructificații maronii - max. 5 %, tulpini cu diametrul mai mare de 5 mm (dar nu mai groase de 6 mm) - max. 5 %, corpuri străine organice - max. 0,5 % și minerale - max. 1 %, iar umiditatea - max 13 %.

Producția de herba uscată este de circa 2000 - 3000 kg/ha.

Observație. Din flora spontană, alături de *Leonorus cardiaca* L., se admite sa se recolteze în scop medicinal și specia *Leonorus quinquelobatus* Gilib. Modul de recoltare, condiționarea și condițiile tehnice de recepție a produsului (herba) sunt similare cu cele prezentate la forma cultivată.

4.20. FAMILIA PLANTAGINACEAE

4.20.1. PĂTLAGINA ÎNGUSTĂ

(*Plantago lanceolata* L.)

Fr: Plantain, Plantaine lancéolé; E: Plantain, SpitzRibwort;

G: Wegerich, Spitzwegerich

4.20.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Materia primă și compoziția chimică. De la pătlagina îngustă se folosesc frunzele (*Plantaginis lanceolatae folium*). Din flora spontană, se admite ca materie primă *Plantaginis species folium* (*Plantaginis folium*), formată din frunze de pătlagină îngustă, pătlagină moale și pătlagină lată. În cultură este extinsă pătlagina îngustă. Frunzele de pătlagină îngustă conțin: aucubozida (aucubină, rinianină) în proporție de 1 - 3 %, catalpozidă (catalpol), poliglucide, mucilagii (arabogalactani și xilani), pectine (5 - 10 %), acizi organici (fenolici etc.), flavonoide, carotenoide, taninuri, ceruri, aminoacizi, vitamine (A, C, K), săruri minerale etc. (V. Cucu și colab., 1982, E.P. Lacy și colab., 2003, M. Tămaș și colab., 2005). Compuși din produsul vegetal au proprietăți emoliente, antiinflamatoare, astringente, diuretice, hepatoprotectoare și imunostimulatoare (U. Stănescu și colab., 2004).

Utilizări. Aucubozida și taninul dau efectul antibacterian, cicatrizant și astringent, iar mucilagiile și alți compuși pe cel emolient și laxativ. Acestea au și acțiune de calmare a tusei, de fluidificarea secrețiilor bronhice, ajutând la eliminarea lor. Se indică în tuse cu expectorație. Intră în compoziția medicamentelor **Tusinum**, **Calunofluid**, **Bronchostud**, **Ceaiului antibronșitic nr. 2** și a **Siroplului de pătlagină** (care conține extract fluid de pătlagină). Frunzele proaspete se folosesc în obținerea unui suc folosit în tratarea ulcerărilor gastrointestinale și a unor unguente. Vitamina K din frunze conferă produsului proprietăți hemostatice.

Răspândire. Originea plantei este eurasiatică, dar este răspândită azi în flora spontană din toate continentele (E. Păun, 1995). Furnizorii principali de produs vegetal sunt Rusia, Bulgaria, România, Polonia, Ungaria, Germania, Olanda. La noi în țară, pătlagina îngustă are o largă răspândire în flora spontană din zona de câmpie până în cea

montană, împreună cu celelalte două specii înrudite (pătlagina moale și pătlagina mare).

Sistematică. Soiuri. În genul *Plantago* se cunosc mai multe specii. Numele genului vine de la cuvintele latinești "planta" (talpă de picior) și „agere” (a aduce), deoarece la unele specii frunzele bazale se aseamănă cu talpa piciorului (A. Păucă, 1961). Mai răspândite sunt speciile *Plantago lanceolata* L. (pătlagina îngustă (fig 4.20.1., după E. Coiciu și G. Răcz, 1962 și 4.20.1.a., original), *Plantago media* L. (pătlagina moale) și *Plantago major* L. (pătlagina mare), de la toate trei folosindu-se frunzele. De la speciile cu tulpina ramificată, *Plantago indica* L. (sin. *P. arenaria* W et K) și *Plantago psyllium* L., se folosesc semințele, care au o acțiune laxativă (ca și semințele de in). La *P. media* L., $2n = 12,24$; la *P. major* L. $2n = 12, 18, 24$. După A. Laza și G. Răcz, 1975, la *Plantago lanceolata* L. $2n = 12$ (24, 96), la *P. psyllium* L. $2n = 12$, iar la *P. indica* L. $2n = 12$.

Din specia *P. lanceolata* L., în țara noastră se cultivă soiul local (populația „De Cluj”, (din anul 1975).

Particularități biologice. *Plantago lanceolata* L. este o plantă perenă, ierboasă. În sol are un rizom scurt și gros, cu numeroase rădăcini fasciculate. Tulpinile sunt nefoliolate, cilindrice, brăzdate, de 30 - 50 cm înălțime și terminate cu inflorescențe. Frunzele pornesc din rizom, sunt lanceolate și lungi de cca. 20 cm și late de cca 4 cm, cu nervuri paralele și marginea întreagă. Florile sunt dispuse în inflorescențe spiciforme în vârful tulpinii, și lungi de 4 - 5 cm. Floarea are caliciul format din 4 sepal concrescute la bază, corola tubuloasă din 4 petale, lungă de 3 - 4 mm, androceul din 4 stamine, gineceul cu ovar superior. Fructele sunt capsule (pixide) ovoidale, lungi de 3 - 4 mm, conținând câte două semințe. Semințele sunt eliptice, de cca. 2 mm lungime, de culoare negricioasă, în contact cu apa devin mucilaginoase. MMB este de cca. 1 g.

Cerințele față de climă și sol. *P. lanceolata* L. nu are pretenții deosebite față de climă. Crește spontan din zona de câmpie până în zona montană. Are cerințe pedoclimatice reduse, crescând pe toate tipurile de sol și în condiții climatice diferite. Nu se recomandă cultivarea pe soluri prea grele, cu apa stagnantă. Cele mai bune rezultate se obțin pe soluri cernoziomice și pe cele de luncă.

Zonare. Se poate cultiva în toată țara (excepție zonele montane), însă condițiile cele mai potrivite le întâlnește în zona de silvostepă, pe soluri fertile. Județul Cluj are o bună experiență în cultura acestei plante.

Fig. 4.20.1. *Plantago lanceolata* L.

4.20.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Pătlagina îngustă nu are pretenții deosebite față de planta premergătoare. Se cultivă în afara asolamentului (cultura durează 3 - 4 ani), după plante care lasă solul curat de buruieni. Pe același teren se poate cultiva numai după circa 5 ani.

Pentru obținerea de sămânță se aleg parcele cu plante tipice, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea. Pătlagina reacționează la fertilizare, mai ales la cea cu azot. Anual se aplică 50 - 60 kg/ha P_2O_5 și 30 - 40 kg/ha K_2O (toamna) și 60 - 80 kg/ha N (primăvara) (A. Apostol, 1986, R. Stoianov, 2000).

Lucrările solului. Arătura se execută la 25 - 30 cm adâncime. Până la semănat, arătura se întreține curată de buruieni, prin lucrări cu discul urmat de grapa cu colți. Înainte de semănat, patul germinativ se pregătește cu combinatorul și tăvălugul inelar.

Sămânța și semănatul. Pătlagina se înmulțește prin semănat direct în câmp. Se folosește material de semănat sănătos, cu puritate de 95 % (minimum 85 %) și germinația de 85 % (minimum 75 %). Perioada de semănat este în pragul iernii (în cazuri extreme, în fereștele iernii sau primăvara devreme), asigurând densitatea la răsărire de 60 - 70 plante la m^2 (A. Apostol, 1986, R. Stoianov, 2000). Semănatul se face cu semănători universale (SUP-21, SUP-29), adaptate pentru semințe mici, la distanța de 50 cm între rânduri și la o adâncime cât se poate de mică (circa 1 cm). Se folosesc circa 5 - 6 kg sămânță la ha, amestecată cu material inert în proporție (volum) de 3 ori mai mare (R. Stoianov, 2000). După semănat terenul se tăvăluiește pentru a pune sămânța în contact cu solul.

Lucrările de îngrijire. În cursul vegetației se fac prașile și pliviri ori de câte ori este nevoie, pentru a menține solul curat de buruieni și afânat. Pentru combaterea buruienilor se pot folosi erbicidele Prometrex (4 kg/ha) înainte de semănat, iar combinația Bassgran (2 l/ha) + Fusilade (2 l/ha) sau Furore (2 l/ha) pe vegetație, când buruienile au 4 - 6 frunze (R. Stoianov, 2000). Cu ultima lucrare de toamnă se face și o ușoară mușuroire a rândurilor. Tijele florale se recomandă să se înlăture, în culturile pentru frunze, pentru a favoriza creșterea și dezvoltarea acestora în număr cât mai mare.

În culturile semincere se face purificarea biologică, îndepărtând plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. Frunzele se recoltează înainte de apariția tulpinilor florifere, când au ajuns la maturitatea tehnică (având

ca anual să se obțină 3 - 4 recolte de frunze. Recoltarea se face cu secera, pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua.

După recoltare, frunzele se recoltează în al doilea an de vegetație,

Culturile semincere se recoltează în al doilea an de vegetație, când 70 % din inflorescențe s-au brunificat și semințele au culoarea caracteristică speciei (A. Dumitrescu, 1988). Inflorescențele se taie cu secera, se usucă pe platforme betonate, se treieră, iar sămânța se condiționează.

Condiționarea. Uscarea frunzelor se poate face pe cale naturală, în încăperi curate și aerisite, anenajate în acest scop, așezându-se în strat subțire și întorcându-se mai des în primele zile. Uscarea artificială se face la 40 - 50 °C. Randalmentul la uscare este de 6 : 1. La o uscare corectă, frunzele trebuie să-și mențină culoarea verde. După uscare, frunzele se ambalează în saltele și se păstrează în încăperi curate și aerisite.

Condițiile tehnice pentru produsul uscat admit ca impurități: frunze brunificate, maximum 3 %, resturi de inflorescențe, maximum 1 %; corpuri străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 0,5 %, iar umiditatea maximum 13 %.

La produsul proaspăt se admit ca impurități: frunze îngălbenite, maximum 3 %, resturi de inflorescențe, maximum 1 %; corpuri străine organice, maximum 0,1 %, cele minerale, maximum 0,1 %, iar umiditatea normală a produsului proaspăt la recoltare, fără urne de apă.

Producția. În cei 3 - 4 ani cât durează cultura, se pot obține, anual, 10 - 12 tone frunze proaspete la ha (respectiv 1,5 - 2 tone frunze uscate la ha).

În culturile semincere se pot obține 300 - 400 kg/ha sămânță de bună calitate.

Observație. Frunzele de *Plantago lanceolata* L. se aseamănă cu cele de *Digitalis lanata* Ehrh. (care sunt foarte toxice). Se recomandă evitarea cultivării în aceeași unitate a celor două plante, pentru a nu se produce amestecuri mecanice. Nu se admite uscarea, ambalarea sau păstrarea celor două plante în același loc. *D. lanata* Ehrh. se păstrează în magazine separate, pentru plante toxice. Loturile cu *P. lanceolata* L. în care apar chiar în proporție redusă *D. lanata* Ehrh. se resping la recepție.

P. lanceolata L. are frunze cu pețiol și nervațiuni paralele, iar *D. lanata* Ehrh. are frunze sesile și cu nervațiunea penată.

4.21. FAMILIA GENTIANACEAE

4.21.1. GHINȚURA (*Gentiana lutea* L.)

Fr: Gentiane jaune, Gentiane; E: Yellow gentian;
G: Gelber Enzian, Enzian

4.21.1.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Gentiana (după Dioscorides) este nume dedicat unui rege al Iliriei, Gentios (m. 167 î.e.n.) care s-a tratat cu *G. lutea* împotriva ciumei (A. Păucă, 1961). Specia *G. lutea* este monument al naturii și sunt restricții în recoltarea ei din flora spontană. Asigurarea necesarului de materie primă vegetală se poate realiza prin cultivarea ei în zone favorabile. *G. lutea* L., fiind un monument al naturii, s-a impus înlocuirea ei cu alte specii (*G. punctata* L., *G. asclepiadea*, *G. panonica* Scop., *G. purpurea* L.) (V. Istudor, 2001).

Materia primă și compoziția chimică. Ghințura, Gențiana (Entura) se cultivă pentru rădăcini și rizomi (*Gentianae radix*). Materia primă conține heterozide (glicozide) amare (gențiopicrozidul sau gențiopictina cca 1 - 3 %, gențianarina, amarogenina de 5000 de ori mai amară decât gențiopicrozidul etc.), alcaloidul gențianina, glucide (gențianoza, gențiobioza), substanțe colorante (gențizina sau dimetoxiantona), tanoizi, lipide, steroli, substanțe minerale etc. (F. Craciun și colab., 1977; D.Gr. Constantinescu, E.M. Hațieganu, 1979; B. Alesandro și A. Nicola, 1993 etc.).

Utilizări. Gențiana se folosește sub formă de tinctură, decoct sau extract moale (U. Stănescu și colab., 2004). Heterozidele (glicozidele) amare au proprietăți tonic - aperitive, stimulează secrețiile gastrice (mărind apetitul) și stimulează funcția ficatului. Se folosește în anorexii și dispepsii, în ceaiul tonic aperitiv și tinctura amară. Principala utilizare este ca tonic - amar eupeptic. În *Farmacopeea Română* figurează: *Gentianae radix* rădăcina și rizomi de ghințură (gențiană), cu un indice de amăreală de cel puțin 10.000 și *Tinctura Gentianae* (tinctură de gențiana).

Răspândire. Planta europeană, alpină - carpatică, gențiana este răspândită în zonele muntoase (până la 2500 m altitudine). În flora spontană a țării noastre crește la altitudine de 1000 - 2000 m. Luarea

în cultură a acestei plante în țara noastră este determinată de cerințele tot mai mari de materie primă și de faptul că, fiind monument al naturii, se interzice recoltarea din flora spontană.

Sistematică. Soiuri. În cultură s-a luat specia *Gentiana lutea* L. (Ghințura, Ghințura galbenă, Ențură, Ghentură) (fig. 4.21.1., după E. Coiciu și G. Răcz, 1962 și 4.21.1.a., original). *G. lutea* L. are $2n = 34 - 36, 40 (42)$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). În flora spontană, în condiții ecologice apropiate cu *G. lutea* L. apare și specia *Gentiana punctata* L. (*Ghințura pătată*), de la care, se recoltează tot rădăcinile și rizomii, având compoziția chimică și utilizări similare. Aceste două specii sunt asemănătoare, *G. punctata* L. are însă frunze ceva mai mici, flori sesile, corola gălbuie cu puncte purpuri foarte dese. Altă specie din genul *Gentiana*, în flora spontană, care prezintă interes medicinal, este *Gentiana asclepiadea* L. (Lumânărica pământului), care crește prin păduri umbroase și umede din zona montană, coborând mai jos decât precedentele (400 - 500 m). Are frunze ovate-lanceolate și corola albastruie (azurie). Rădăcina acestei specii are acțiune coleretic - colagogă fiind indicată în afecțiuni hepatice (M. Tămaș și colab., 2005). Alături de *G. lutea* L. se pot folosi, în cantități apreciabile, și speciile *G. punctata* L. și *G. asclepiadea* L. Posibilitatea valorificării speciilor *G. punctata* L. și *G. asclepiadea* L. a fost arătată încă în urmă cu mai bine de 100 de ani de marele botanist Brîndza, 1869 (cit. de E. Coiciu și G. Răcz, 1962). În medicina umană și veterinară populară se mai folosesc și alte specii din genul *Gentiana*: *G. cruciata* L. (Ochincea) (în tratamentul bolilor de stomac și a rănilor); *G. pneumonanthe* L. (în bolile de plămân); *G. utriculosa* L. (boli în țene la vite) (E. Coiciu, 1967, F. Crăciun și colab., 1977). Unele însușiri biochimice ale speciilor din genul *Gentiana* au fost evidențiate de P. Lebreton și M.P. Dangy-Caye, 1973. În cadrul speciei *G. lutea* L. Ch. Franz și D. Fritz, 1975, au studiat variabilitatea unor ecotipuri europene (între care și din țara noastră), stabilind însușirile lor morfologice, chimice și introducerea în cultură.

Din specia *Gentiana lutea* L., la noi în țară s-a luat în cultură soiul local (populația) „De Săcele” (din anul 1977).

Particularități biologice. *G. lutea* L. este o plantă perennă erbacee. E. Coiciu și G. Răcz, 1962, arată că în primii 10 - 20 ani, planta se află în stadiu de rozetă. În sol se formează un rizom gros, din care pornesc, rădăcină cilindrică, brun - gălbuie la exterior și gălbuie la interior. Tulpina aeriană ajunge până la 1,5 m înălțime și până la 1 cm grosime, este simplă, glabră, cilindrică, fistuloasă.



Fig. 4.21.1. *Gentiana lutea* L.

Frunzele din rozetă sunt eliptice, cu marginea întregă, îngustate spre pețiol, având lungimea de 20 - 30 cm, iar lățimea de 6 - 12 cm. Frunzele tulpinale sunt dispuse opus, sunt sesile, cu vagine concrescute; la două noduri succesive așezate în cruce. Frunzele sunt glabre, cu 5 - 7 nervuri proeminente, arcuite. Florile sunt dispuse în cime la subsuara frunzelor tulpinale, având un pedicel de cca. 3 cm. Caliciul este inegal divizat, albicios, persistent. Corola divizată până aproape de bază în 5 (rar 6) lacinii, îngust lanceolate (2 - 3 cm lungime), de culoare galbenă (apar și pete brune pe suprafață), androceul cu filamentele staminale concrescute cu baza corolei; gineceul, situat pe un nectar 5 - 6 lobat, cu stigmat de 2,5 - 3 (5) mm, după înflorire răscut în spirală. Înfloarește în iulie - august. Fructul este o capsulă conică, cu 2 valve, uniloculară, de 5 - 6 cm lungime, conținând până la 100 de semințe. Semințele sunt comprimate, cu marginea membranoasă (lat aripate), cu 3 - 4 mm lungime și 2 - 3 mm lățime; MMB este de cca. 1 g.

Cerînțele față de climă și sol. Are cerințe reduse față de temperatură. Planta rezistă bine la iernare. Crește bine în condiții de lumină. Ghințura are cerințe ridicate față de umiditate. Preferă soluri ceva mai bogate în calciu. Spontan crește la altitudine pe soluri sărace (pietroase). În cultură, se recomandă să se amplaseze pe soluri profunde, ușoare, fertile bogate în calciu, condiții în care se pot obține producții mai bune.

Zonare. Se recomandă să se cultive în județele Brașov, Prahova, Neamț și în alte zone subcarpatice din țară (F. Crăciun și colab., 1977). A. Mihalea, 1986, recomandă înființarea culturilor de ghințură în zonele de răspândire naturală a speciei, pe solurile profunde, ușoare și bogate în calciu din județele Brașov, Sibiu și Covasna.

4.21.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Ghințura se amplasează în afara asolamentului (fiind plantă perenă), după plante care lasă terenul curat de buruieni. Pe același teren se poate cultiva numai după cel puțin cinci ani.

Pentru obținerea semințelor, se aleg parcele cu plante tipice, sănătoase și bine dezvoltate.

Fertilizarea. La înființarea culturii se aplică 60 - 70 kg/ha P_2O_5 , 40 - 50 kg/ha K_2O și 4 - 5 t/ha calcar măcinat (sub arătură) și 40 - 50 kg/ha N (primăvara). Doze similare de NKP se folosesc și în ceilalți ani de cultură (M. Alexan și colab., 1986).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 25 - 30 cm adâncime și menține curată de buruieni, prin lucrări cu discul urmat de grapă. În cazul semănăturii direct în câmp, patul germinativ se pregătește cu combinatorul.

Sămânța și semănatul. Gențiana se poate înmulți prin semănat direct în câmp, prin răsad produs în straturi reci (A. Mihalea, 1986), sau prin rizomi fasonați (F. Crăciun și colab., 1977). Reușita culturii este mai bună prin producerea de răsad și transplantarea acestuia în câmp (E. Păun, 1995). Sămânța trebuie să aibă puritatea de 85 % (minimum 80 %), iar germinația de 50 %.

Semănatul direct în câmp se face cu semănători universale (SUP-21, SUP-29) în pragul iernii sau în iulie - august. Densitatea după răsărire trebuie să fie de 10 - 14 plante/m² (A. Mihalea, 1986). Semănatul se face în rânduri la distanța de 50 cm și la adâncimea de 1 - 2 cm, folosindu-se 4 - 6 kg de sămânță la hectar.

La înmulțirea prin răsad, necesarul de material de plantat pentru 1 ha se produce pe 200 m² (strat rece) semănat în august, eventual irigat. Se recomandă și producerea răsadului în straturi reci (sau lădițe) în care se adaugă un amestec de mrană cu pământ din locurile unde planta crește spontan (deoarece partea subterană a ghințurii trăiește în simbioză cu o ciupercă, formând o micoriză). Pentru cele 200 - 250 m² straturi reci (lădițe), se folosesc 0,4 - 0,5 kg de sămânță, asigurând răsadul pentru 1 ha. Plantarea răsadului se face primăvara anului următor (uneori după 2 ani) la 50 cm între rânduri și la 15 - 20 cm pe rând (A. Mihalea, 1986), până la 25 cm pe rând (E. Păun, 1995).

Rizomii formați (5 - 10 cm lungime) se pot folosi pentru plantare la distanța de 50/50 cm (circa 1 - 1,2 t/ha rizomi fasonați) (F. Crăciun și colab., 1976).

Lucrările de îngrijire. În cursul vegetației se fac prașile și pliviri ori de câte ori este nevoie, pentru combaterea buruienilor și afânarea solului, iar la culturile semănate se rădesc plantele la 15 - 20 cm între ele pe rând.

În culturile semincere, se face purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. Se recomandă ca recoltarea rădăcinilor de gențiana să se facă atunci când plantele au vârsta de 3 ani (A. Mihalea, 1986) sau în anul 4 - 5 de vegetație (F. Crăciun și colab., 1977), toamna, la sfârșitul perioadei de vegetație, în octombrie (A. Mihalea, 1986). Dislocarea rizomilor și rădăcinilor se face cu plugul fără cormană sau cu dislocatorul de sfeclă.

În cazul lăturilor semincere, tijele fructifere se recoltează când 60 - 75 % din semințe au culoarea galben - brună (A. Mihalea, 1986). Tijele fructifere se taie cu secera sub ultimul verticil de fructe, se usucă pe platforme betonate și se treieră când semințele au culoarea specifică, apoi semințele se trec prin selector.

Condiționarea. După dislocare, rădăcinile se scutură de pământ, se strâng în grămezi și se decoltează, apoi se spală și se lasă să se zvânte. Rădăcinile și rizomii se fasonază, înălțându-se rădăcinile prea subțiri sau bolnave, se secționază în bucăți de 10 - 15 cm, iar cele mai groase se despică. Uscarea pe cale naturală fiind mai greu de realizat toamna, se recomandă uscarea pe cale artificială la temperatura de 40 - 45 °C. Rândamentul la uscare este de 4 - 5 : 1.

Condițiile tehnice de recepție la produsul uscat prevăd ca impurități: rădăcini seci sau mai subțiri de 0,5 cm, maximum 2 %, rădăcini cu interiorul de culoare roșie - brună, cu miros plăcut, puternic aromat, maximum 5 %; corpuri străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 1 %, iar umiditatea maximum 13 %.

La produsul proaspăt se prevăd ca impurități: rădăcini seci, sau mai subțiri de 1 cm, maximum 2 %, rădăcini cu interiorul de culoare roșie - brună, cu miros plăcut, puternic aromat, maximum 5 %; corpuri străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 0,3 %, iar umiditatea normală a produsului la recoltare (fără urme de apă).

Producția de rădăcini care se obține la ha de gențiană este de 7 - 9 tone produs proaspăt (cca. 2 tone la ha produs uscat).

4.22. Familia APOCYNACEAE

4.22.1. SASCHIUL

(*Vinca minor* L.)

Fr: Petite pervenche; E: Perwinkle, Common perwinkle;
G: Immergrün, Wintergrün, Gemeineisse Immergrün

4.22.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Saschiul este numit și saschiul mic, iar în popor are o serie de alte nume (barbinoc, băbănoc, cunună etc.) (I. Roventă și D. Roventă, 1987)

Însușirile terapeutice ale saschiului sunt cunoscute în medicina populară din vremuri străvechi. Dioscoride (sec I e.n.) menționează că maceratul de vin, frunze și tulpini de saschiu mic ajută la tratarea unor boli ca diareea și dizenteria etc. (I. Roventă și D. Roventă, 1987). Aceiași autori menționează că prezența alcaloizilor în această plantă a fost semnalată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (de farmacistul Lucaci), iar un secol mai târziu (1950) este izolat de E.S. Zaholotania primul alcaloid cristalizat (numit Vincamina și Minorina).

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă o constituie partea aeriană (*Vinca minoris herba*) în stare uscată.

Vinca minoris herba conține alcaloizi cu nucleu indolic, în proporție de 0,3 - 1 % (U. Stănescu și colab., 2004), frunzele fiind mai bogate decât tulpina. În proporție mai mare este vincamina (10 - 45 %), izovincamina (amestec de vincamină cu vincină, vincamină și vincinină) și alți alcaloizi (cca. 40) de structură indolică (V. Cucu și colab., 1982, V. H. Heywood, 1993, M. Tămaș și colab., 2005). Herba mai conține aminoacizi liberi, flavone, carotenoide, săruri minerale etc.

Utilizări. Planta a fost folosită mult timp în medicina populară, atribuindu-i-se o acțiune ușor astringentă și antiagalagogă. După anul 1954, s-a stabilit acțiunea simpatolitică, spasmolitică și hipotensivă a alcaloizilor săi (V. Cucu și colab., 1982), devenind o importantă plantă medicinală, a căror produși se folosesc în tratamentul bolii hipertensive și ateroscleroză. În terapeutică nu se folosește produsul vegetal ca atare, ci este utilizat numai pentru extracția vincaminei (U. Stănescu și colab., 2004). Acești compuși și

derivații lor de semisinteză se folosesc în diferite preparate medicamentoase (care îmbunătățesc circulația cerebrală în arealele ischemice etc.), între care pe bază de vincamină (**Vincamina**, **Oxibral**, **Vincapront**, **Cetal** etc.) și vinpocetina (**Vinpocetina**, **Cavinton**).

Răspândire. Saschiul este originar din centrul și sudul Europei și Asia Mică, unde este cultivat și în scop ornamental (rămâne verde tot timpul anului). Cercetări privind introducerea în cultură s-au efectuat în Germania, Polonia, Ungaria, Rusia, Bulgaria, Cehia etc. precum și la noi în țară (I. Roventă și D. Roventă, 1987). La noi formează covoare prin pădurile din zona deluroasă și se cultivă ca plantă ornamentală și medicinală.

Sistematică. Soiuri. Genul *Vinca* cuprinde circa cinci specii, unele utilizate în scop medicinal sau ornamental (I. Roventă și D. Roventă, 1987). Specia cultivată în scop medicinal este *Vinca minor* L. (fig. 4.22.1., după G. Rácz și colab., 1970 și 4.22.1.a., original). Această specie are $2n = 46$ (32) (A. Laza și G. Rácz, 1975). În cadrul genului *Vinca* se mai întâlnesc *V. herbacea* W. et K. (cu frunze moi fără luciu și caduce) și *V. major* L. (cu frunze mai mari: 5 - 7 cm lungime și 2 - 3 cm lățime). A. Chatterjee și colab., 1975, au evidențiat conținutul în alcaloizi (monoterpeneoid piridine) a părților aeriene de *V. major* L. Specia exotică *Vinca rosea* L. (sin. *Chataranthus roseus* G. Don., *Lochnera rosea* Reichb.), este folosită în unele țări la obținerea unor medicamente cu acțiune citostatică - anticanceră, apreciate mai mult în unele forme ale leucemiei (E. Coiciu 1967, G. Rácz și colab., 1970). E. Coiciu, 1967, arată că *V. rosea* L. este o specie de perspectivă. În stare spontană, în zonele de origine (tropicale și subtropicale) este perenă, iar în zonele temperate este o plantă anuală. La noi a fost adusă din Vietnam, dovedindu-se posibilă cultivarea ei. Conținutul în alcaloizi totali a fost de 0,85 g % în rădăcini și 0,37 g % în frunze (în Vietnam se obțin 0,83 g % alcaloizi în rădăcini) (I. Ciulci și colab., 1965). Din *V. rosea* L. s-au izolat numeroși alcaloizi dintre care vincalucoblastina, leucocristina, leurozina și leurosindina, cu acțiune citostatică (I. Ciulci și colab., 1965), constituind mijloace terapeuice în leucemie și în diverse tumori maligne. Vincalucoblastina (din *V. rosea* L.) s-a dovedit că are acțiune citostatică (deranjamente mitotice) și antitumorale, similară cu a colchicinei și podofilinei (I. Palyi și colab. 1966, citați de E. Coiciu, 1967).

Din *V. minor* L. la noi în țară s-a introdus în cultură soiul „Azur” (din anul 1996).

Fig. 4.22.1. *Vinca minor* L.

Particularități biologice. Saschiul este plantă perenă (subarbut mic), cu tulpini repente (până la 100 cm), lignificate la bază și aeriene (până la 20 cm), cu frunze persistente. Rădăcinile se formează de la nodurile tulpinii târâtoare (rădăcini adventive fasciculate). Frunzele sunt persistente, dispuse opus, lanceolat - eliptice, cu margine întreagă. Florile sunt solitare, la subsuara frunzelor. Caliciul cu cinci lăcni glabre, corola gamopetală lungă de 2 - 2,5 cm și de 2,5 - 3 cm diametru, cu cinci diviziuni asimetrice romboideale, de culoare albastră. Androceul este format din cinci stamine, iar gineceul cu ovar superior și un stil lung. Înfloarește din luna aprilie în mai (iunie). Fructele sunt foliole (de 1,5 - 2 cm lungime), acuminate, conținând 2 - 3 semințe. Semințele sunt de 6 - 9 mm lungime, de culoare brună, cu MMB de cca 1 g. În cultură se menține cca. 6 ani.

Cerințele față de climă și sol. Saschiul crește în flora spontană în locuri umbroase în zona stejarului și fagului. Peste iarnă rezistă la temperaturi scăzute (până la -30 °C) iar în cursul vegetației preținde temperaturi moderate. În condiții de câmp deschis are cerințe mai mari față de umiditate în perioada de creștere (aprilie - octombrie), însă nu suportă bălțirea apei. Reușește pe soluri fertile, ușoare (luto - nisipoase), suficient de umede și permeabile. Sunt improprii solurile grele, argiloase.

Zonare. Cultura se recomandă în toată zona colinară și de podiș (excepție Dobrogea), în Câmpia Moldovei, Țara Bâsei (E. Păun și colab., 1983). Adaptarea plantei din condiții de semiumbra în condiții de câmp deschis este abia la început, fapt pentru care se recomandă să se cultive în cadrul zonelor de răspândire naturală (în județele Sibiu, Brașov, Hunedoara și Neamț) (A. Mihalcea, 1986). Saschiul este o apreciată plantă decorativă. Se poate cultiva și în parcuri sub arbori. În zone umbrite, poate înlocui suprafețele înierbate, în scop ornamental și medicinal.

4.22.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Saschiul este o plantă cu un grad mare de perenitate și de aceea se cultivă în afara asolamentului, după plante care lasă solul curat de buruieni (E. Păun, 1995). Pe același teren poate reveni numai după 6 - 8 ani.

Fertilizarea. La înființarea culturii se aplică 25 - 30 t/ha gunoi de grajd (sub arătură adâncă) (A. Mihalcea, 1986). Anual se folosesc 60 - 65 kg/ha P_2O_5 și 35 - 45 kg/ha K_2O (toamna) și 65 - 75 kg/ha N (primăvara) (M.D. Bobiț, 2000).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 25 - 30 cm adâncime și menține curată de buruieni, prin lucrări cu discul în agregat cu grapa cu colți, până la plantare.

Plantarea. Saschiul se poate înmulți pe cale vegetativă (prin diferite metode) sau pe cale generativă (prin semințe). Procedeele sau metodele de înmulțire vegetativă, după I. Roventța și D. Roventța, 1987 sunt: despărțirea sau divizarea tufelor; fragmentarea tulpinilor repente (stoloni); înmulțirea prin drajoni; înmulțirea prin butași realizați din tulpini florifere mature. Saschiul se înmulțește obișnuit vegetativ prin stoloni sau butași. Pentru plantare se folosesc stoloni (de 7 - 8 cm lungime, 2 - 3 mm grosime, 3 - 4 ochi viabili, sănătoși și cu 2 - 3 fire de rădăcini) sau butași (8 - 9 cm lungime, 1 - 2 ramificații cu frunze și cu 4 - 6 fire de rădăcini). Se plantează toamna (septembrie) sau primăvara devreme, asigurând densitatea de 20 - 30 plante la m^2 , la 50 cm între rânduri și 6 - 8 (10) cm pe rând, în rigole de 7 - 9 cm adâncime (în care se așează stoloni sau butași) (A. Mihalcea, 1986). Se folosesc circa 550 - 600 kg stoloni sau 500 - 550 kg butași (până la 1.200 - 1.500 rădăcini - stoloni). În tabelul 4.22.1.1. (după A. Mihalcea 1979 și 1988) prezentăm influența desimii și vârsta plantației asupra producției de herba la sashi. Cele mai bune rezultate în primii ani s-au obținut la varianta plantată la 30 cm între rânduri. Autorul constată că în ani umători diferențele sunt anulate, recomandând din motive economice și tehnologice plantarea sashiului la 50 cm între rânduri (pentru a permite efectuarea lucrărilor mecanice între rânduri) și 10 cm pe rând (A. Mihalcea, 1988).

Influența desimii și vârstei plantelor asupra producției de herba la sashi. (V. Vinca minor L.)

Tabelul 4.22.1.1.

Varianta	Anul I de recoltă				Anul II de recoltă			
	Producția de herba proaspătă			Seminif	Producția de herba proaspătă			Seminif
	g/ha	d	%		g/ha	D	%	
Plantat la 30 cm între rânduri (333 000 plante/ha)	37,1	-	100	-	61,9	-	100	-
Plantat la 40 cm între rânduri (250 000 plante/ha)	32,5	-4,6	87,6	000	56,2	-5,7	90,7	-
Plantat la 50/25 cm (200 000 plante/ha)	31,5	-5,6	84,9	000	55,2	-6,7	89,1	-
Plantat la 50/25 cm (80 000 plante/ha)	28,1	-9	75,7	000	50,2	-11,7	81,1	00

În scop ornamental, în parcuri sau zone verzi, sashiul se plantează la 30/30 cm, în chinconz.

La înmulțirea prin sămânță (mai rar), se însămânțează toamna la 50 cm între rânduri, folosind 3 - 4 kg/ha.

Lucrările de îngrijire. Se menține solul curat de buruieni prin prașile și pliviri ori de câte ori este nevoie. În primul an de vegetație, pentru a preveni îmburuienarea (plantele de saschiu cresc încet), la începutul vegetației, se recomandă o erbicidare totală cu Reglone în doză de 3 - 5 l/ha (E. Păun, 1995). Bolile, fomoza (*Phoma vincae minoris*), pătarea frunzelor (*Septoria vincae*) etc., se combat prin stropiri cu Dithane M-45 și Polyram combi (0,2 %) sau Topsin (0,2 %), repetate de 2 - 3 ori, la 7 - 10 zile între tratamente (M.D. Bobiț, 2000).

Recoltarea. Începe din anul al doilea de vegetație, cultura menținându-se până în anul al șaselea. Se cunosc două maxime în dinamica formării principiilor active, în luna iunie și în septembrie. Acestea sunt considerate ca perioade optime de recoltare (A. Mihalea, 1986). Se taie plantele cu seceră (bine ascuțită să nu smulgă plantele) la 6 - 7 cm de la sol, pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua.

Condiționarea. După recoltare, se înlătură impuritățile, iar plantele se duc în scurt timp la uscat. Uscarea se poate face pe cale naturală în încăperi uscate și aerisite, în strat subțire de cca. 10 cm. Uscarea durează cca. 8 - 10 zile, când se întoarce stratul de câteva ori. Artificial se usucă la 40 - 45 °C. Randalmentul la uscare este de cca. 3,5 : 1.

Condițiile tehnice de recepție admit ca impurități: frunze parțial atacate de viroze, îngălbenite sau brunificate, maximum 5 %; corpuri străine organice, maximum 4 %, cele minerale, maximum 1 %, iar umiditatea maximum 13 %.

Producția în anul al doilea este de 2 - 3 tone/ha produs proaspăt, în anii următori crescând la 4 - 5 tone/ha produs proaspăt anual (cca. o tonă produs uscat). A. Mihalea, 1988, arată că în anii V și VI de vegetație recolta poate ajunge la 6 - 7 tone/ha herba proaspătă (până la 1,5 t/ha produs uscat).

4.23. Familia VALERIANACEAE

4.23.1. VALERIANA (*Valeriana officinalis* L.)

Fr: Valériane, Valériane off; E: Valerian; G: Baldrian

4.23.1.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Valeriana (odoleanul) este una din cele mai vechi și mai importante plante medicinale. Numele genului derivă de la latinescul „valere” (a fi puternic, a fi sănătos), arătând însușirile sale terapeutice (I. Morariu, 1961). Valeriana a fost folosită din antichitate de greci și romani ca diuretic și spasmolitic, iar băștinașii din Peru o foloseau (extract hidroalcoolic de valeriană) ca analgetic, în tratamentul durerilor reumatice (U. Stănescu și colab., 2004). Este menționată în mai multe lucrări din antichitate, iar din evul mediu este foarte mult apreciată (V. Velican, 1965), însă doar în sec. al XVIII-lea i s-a recunoscut acțiunea sedativă centrală (V. Cucu și colab., 1982). În zilele noastre, utilizarea valerianei (ca sedativ nervos și antispasmodic) cunoaște o tot mai mare extindere.

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă o constituie rizomul și rădăcina (*Valerianae rhizoma cum radicibus*, *Valerianae rhizoma et radicibus*).

Întreaga plantă conține ulei volatil însă mai bogate sunt părțile subterane. Conținutul în ulei volatil al rădăcinilor proaspete este de 0,05 - 0,22 %, iar în cele uscate 0,2 - 2,43 % în funcție de specie, soi și de condițiile de cultură. Uleiul volatil de valeriană conține ester ai borneolului, în proporție mai mare (9,54 %) fiind izovalerianat de borneol (care imprimă mirosul specific materiei prime), precum și formiat, acetat și butirat de borneol; precum și pinen, camfen, dipenten, citren etc. Dintre ceilalți compuși ai materiei prime sunt: valepotriai (0,1 %), acidul izovalerianic, acidul valerenic (cu acțiune antispastică, similară cu a papaverinei), alți acizi organici (formic, acetic, butiric, malic), alcaloizi, rezine, alcoolii, antibiotice, tanin, enzime, săruri minerale etc. (M. Bobiț, 1997, S. Muntean, 2002, I. Oniga și colab., 2002).

Compoziția chimică a valerianei este foarte complexă, iar acțiunea terapeutică a diverșilor compuși a format obiectul multor cercetări.

Utilizări. Compușii activi (uleiul volatil, acizii, alcaloizii etc.) din rizomii și rădăcinile de valeriană au acțiune sedativă a sistemului nervos și cardiac, antispastică etc. Acțiunea terapeutică este condiționată de un complex de principii active. Este cunoscută ca una din cele mai bune calmante a întregului sistem nervos. Se folosește ca sedativ nervos, calmant cardiac, hipotensiv, în insomnii, nevroze cardiace etc. Intră în compoziția *Extraveralului* și a altor produse, precum și a **Ceaiurilor: Calmant, Gastric, Sedativ și Calmant împotriva tulburărilor cardiace.** Folosirea valerianei fără întrerupere duce la obișnuință, iar depășirea anumitor doze are efecte negative asupra tubului digestiv, provoacă dureri de cap și greață. În *Farmacopeea Română* figurează: *Valerianae rhizoma cum radicibus* (rădăcină de odolean, rădăcină de valeriană) cu un conținut de cel puțin 25 % substanțe solubile și cel puțin 0,3 % (v/g) ulei volatil; *Extractum Valerianae spissum* (extract moale de valeriană); *Tinctura Valerianae* (tinctură de valeriană); *Tinctura Valerianae aetherica* (tinctură eterată de valeriană).

Răspândire. Valeriana este răspândită în flora spontană din Europa (în Alpi ajunge până la 2.400 m), în Caucaz, Asia Mică, sudul Siberiei, precum și în Anzii sudamericiani (Fischer, 1941, citat de V. Velican, 1965). Spontan apare în zone mai umede și umbroase, în păduri, depresii, pășiți umede etc., mai ales din zona de deal și montană. Având în vedere cerințele tot mai mari de materie primă, această plantă s-a luat și s-a extins în cultură în vestul Europei (Belgia, Olanda, Franța, Germania), estul Europei, Japonia și SUA. Astfel că, în prezent materia primă de la valeriană provine aproape numai din cultură.

Sistematică. Soiuri. Sistematica genului *Valeriana* a fost mult discutată, nefiind pe deplin elucidată, existând autori care consideră specia *Valeriana officinalis* L. (fig. 4.23.1, după E. Coicui și G. Răcz, 1962 și 4.23.1.a., original) ca o specie polimorfă (foarte variabilă), iar alții care au propus fărâmișarea în mai multe (zeci) de specii de sine stătătoare. După unii autori, cele mai cunoscute și cultivate specii din genul *Valeriana* sunt: *V. sambucifolia* Mikan. *V. officinalis* var. *sambucifolia* Neil.), *V. collina* Waltr. (*V. officinalis* var. *tennifolia* Vahl.), *V. exaltata* Mikan. (*V. officinalis* var. *latifolia* Vahl.), *V. procurrens* Walt., *V. pratensis* Dietb. și *V. officinalis* var. *angustifolia* Miq (valeriana japoneză). (V. Cucu și colab., 1982).




Fig. 4.23.1. *Valeriana officinalis* L.

Ca număr de cromozomi, diploidă ($2n = 14$) este *V. exaltata* Mikan, tetraploide ($2n = 28$) sunt *V. collina* Wallr și *V. pratensis* Dierb., iar octoploide ($2n = 56$) sunt *V. sambucifolia* Mikan și *V. procurrens* Vallr. A. Laza și G. Răcz, 1975, arată că *Valeriana officinalis* L. are $2n = 14$, 16, 18, 56, 64. După cum arată E. Coiciu și G. Răcz, 1962, din punct de vedere practic mai util este a se deosebi două specii (*V. officinalis* L. și *V. sambucifolia* Mikan), a căror caracter distinctiv sunt redată în tabelul 4.23.1.1.

Tabelul 4.23.1.1.

Caracterele de recunoaștere a speciilor din genul <i>Valeriana</i>		
Organul plantei	<i>V. officinalis</i> L.	<i>V. sambucifolia</i> Mikan
Stoloni	în general fără stoloni aerenți	întotdeauna cu stoloni aerenți
Frunze bazale:		
- numărul foliolelor	7-11	3-5
- lățimea foliolelor (cm)	1-3,5	peste 5
Frunzele tulpinale:		
- lățimea foliolelor	1-2	4-6
Fructul:		
- lungimea (mm)	1,8-4	(3) 4-5
- lățimea (mm)	0,8-1,5	1,5-1,8
- MMB (g)	0,49-0,78	0,88-0,9

Borza, 1949, E. Coiciu și G. Răcz, 1962, arată că în flora spontană a țării noastre cresc cele două specii, *V. officinalis* L., var. *atifolia* Vahl. (*V. exaltata* Mikan), var. *tenuifolia* Vahl. (*V. collina* Wallr), precum și *V. sambucifolia* Mikan. Se întâlnesc și alte specii care nu aparțin secției *officinalis* (*V. dioica* L., *V. tripteris* L., *V. montana* L. etc.). La noi în țară se valorifică alături de *V. officinalis* L. și rădăcinile de la *V. sambucifolia* Mikan.

Din genul *Valeriana* s-au studiat și s-au încercat în cultură în țara noastră și alte specii (*V. collina*, *V. rossica*, *V. wolgensis* etc.) (M. Bobiț, 1977, S. Muntean, 2002).

La noi în țară, din specia *V. officinalis* L., a fost omologat soiul românesc „Măgurele 100” (în anul 1981), superior populației locale „De Diosig” sub aspectul producției și calității (A. Mihalea, 1983).

Particularități biologice. *Valeriana* este plantă perenă, formând la început o rozetă de frunze, apoi (vara sau din anul al doilea) tulpinile florifere. Cultura pentru producția de rădăcini se menține numai un an. În sol formează un rizom tronconic (lung de 2 - 4 cm, gros de 1 - 3 cm, de culoare brunie la exterior și albicioasă la interior), prevăzut cu stoloni scurți și un sistem radicular (adventiv) format din 60 - 70 rădăcini de ordinul întâi cu numeroase ramificații.

După D. Bobiț, 1997, prezentăm variația raportul între masa de rizomi și rădăcini (tabelul 4.23.1.2.) și variabilitatea principalelor caracteristici morfologice ale rădăcinilor (tabelul 4.23.1.3.) (Brașov, 1996). Rădăcinile după uscare au un miros caracteristic, după cum s-a arătat. Tulpina are înălțimea de 50 - 150 cm sau chiar 200 cm, ramificată în partea terminală. Este erectă, cilindrică, brăzdată la suprafață și fistuloasă. Frunzele sunt imparipenate, cele bazale petiolate, cele tulpinale sesile, cu 11 - 23 foliole linear lanceolate, întregi sau serat - dințate. Florile sunt mici, de culoare roz sau albă, grupate în inflorescențe, raceme corimbiforme terminale. Caliciul este redus, corola simpetală (3 - 7 mm), androceul este format din 3 stamine care depășesc în lungime corola, gineceul este tricarpelar, cu stigma trilobat. Înfloresc din luna mai până în septembrie. Numărul de flori în inflorescențe diferă în funcție de specie și soi, fiind la soiurile de *V. officinalis* L. cuprins între 512 - 782 (L. Muntean și colab., 2002). Fructele sunt achene ovoidale de cca. 3 mm lungime, cu o nervură pe față și trei nervuri pe dos, de culoare galben - brunie, prevăzute cu o mică egretă de peri; MMB de cca. 0,5 g.

Tabelul 4.14.23.1.2.

Variația raportului dintre masa de rizomi și masa de rădăcini la genotipurile de *Valeriana officinalis* L., în funcție de modul de înmulțire, destinația și vârsta culturii

Genotipul	Modul de înmulțire	Destinația și vârstă	S.U. (kg)/din 1 kg proaspăt			Valoare raport riz/fărăd	Dif.	Consum specific
			total	rizomi	rădăcini			
Măgurele 100 România (Mt)	vegetativ	rădăcina 3 ani	0,28	0,109	0,171	0,641	-	3,5
<i>V. wolgensis</i> Germania	vegetativ	rădăcină 3 ani	0,317	0,136	0,181	0,751	+0,110*	3,1
<i>V. officinalis</i> L. 35- Moscova	vegetativ	rădăcină 3 ani	0,286	0,109	0,177	0,615	-0,021	3,4
<i>V. officinalis</i> L. - 1102 Moscova	vegetativ	rădăcină 3 ani	0,305	0,136	0,169	0,804	+0,163*	3,2
Măgurele 100 România	germinativ	sămânță 3 ani	0,236	0,077	0,156	0,493	-0,148*	4,2
Măgurele 100 România	germinativ	rădăcină 1 an	0,209	0,079	0,13	0,607	-0,034	4,7

Cerințele față de climă și sol. Are cerințe termice mai reduse. Germinează la 4 - 5 °C și suportă bine geruri până la -20 °C peste iarnă, fără strat de zăpadă. Primăvara pornește în vegetație timpuriu (la 1 - 2 °C). Plantele suportă mai bine temperaturile scăzute, decât cele ridicate. Are cerințe mai ridicate față de umiditate, cele mai bune rezultate obținându-se în zonele cu precipitații de 650 mm anual (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Sensibilitate mai mare la secetă o prezintă în primul an de vegetație și în prima parte a vegetației

(V. Velican, 1965). Planta crește în condiții diferite de lumină, însă s-a constatat că cele crescute în plin soare au producția de rădăcini mai mare. Se pare că altitudinea are efect favorabil asupra acumulării uleiului volatil, dar nu și asupra producției de rădăcini (V. Cucu și colab., 1982). Cele mai bune rezultate se obțin pe soluri profunde, bogate în humus, cu un regim hidric favorabil, însă drenate, precum și pe terenurile desecate, turbatoase. Nu dă rezultate bune pe soluri grele, argiloase, care reduc dezvoltarea sistemului radical și îngreunează scosul și curățirea rădăcinilor recoltate.

Tabelul 4.23.1.3.

Variabilitatea principalelor caracteristici morfologice ale rădăcinilor la genotipurile de *Valeriana officinalis* L. înmulțite vegetativ

Genotipul/proveniența	Număr rădăcină/plantă		Diametrul rădăcinii (mm)		Lungimea rădăcinii (cm)	
	Medie	S %	Medie	S %	Medie	S %
Munka- Polonia	47,67	39,4	1,5	55,3	13,8	21,6
Polka- Polonia	100,3	24,5	1,6	49,1	10,5	36
Măgurele 100- România	133,3*	19,9	1,6	49,1	9,5	39,8
Grupa soluri	93,7	45,3	1,6	48,3	11,2	34
<i>V. rossica</i> - Germania	84,8	28,9	1,5	36,5	8,5	54
<i>V. wolgensis</i> -Germania	54,7	33,1	1,5	36,5	10,1	38
<i>V. collina</i> - Stuttgart	111,7	20,4	1	50	9,1	36,1
Grupa varietăți	83,7	37,7	1,3	41,2	9,2	40,8
<i>V. officinalis</i> L.-613 - Moscova	62,7	39	1,7	24,3	13,1	43,8
<i>V. officinalis</i> L.-833-Moscova	112,2	26,4	1,6	31,8	12	34,1
<i>V. officinalis</i> L.-958-București	64,3	42,2	1,6	31,8	12,5	38,7
<i>V. officinalis</i> L.-1 102-Moscova	80,8	40,9	1,7	24,3	8	25
<i>V. officinalis</i> L.-Moscova	67,5	42,7	1,4	41,9	9,3	25
Grupa clone	77,5	42,2	1,6	29,2	11	39
Medie (M)	83,6	30,2	1,58	40,2	10,6	32,5
DI 5 %	29,26	-	0,71	-	3,99	-

Zonare. E. Păun și colab., 1983, recomandă cultivarea valerianei în Podișul Transilvaniei, depresiunile marginale, Câmpia Moldovei și Subcarpații răsăriteni. A. Mihailea, 1986, recomandă organizarea culturilor de valeriană în zonele de răspândire naturală a plantei, suficient de umede și cu temperaturi moderate în timpul verii.

4.23.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Valeriana se cultivă ca plantă anuală pentru producția de rădăcini. Se amplasează după cereale de toamnă și culturi pentru masă verde, care eliberează terenul devreme. Pe același teren poate reveni numai după 5 ani.

Loturile semincere se amplasează separat de alte culturi de valeriană, urmând să continue vegetația și în anul al doilea pentru obținerea de sămânță.

Fertilizarea se face cu doze de 60 - 70 kg/ha P_2O_5 și 50 - 65 kg/ha K_2O (toamna) și 35 - 40 kg/ha N (primăvara) (V. Mircioiu, 1982, M.D. Bobiț, 2000). În tabelul 4.23.1.4. (după A. Mihailea, 1988) prezentăm influența îngrășămintelor asupra producției de rădăcini și a conținutului de ulei volatil la valeriană. Rezultate bune (economice) s-au înregistrat la varianta cu îngrășăminte minerale (în raport 1:1,3:1).

Tabelul 4.23.1.4.

Influența îngrășămintelor asupra producției de rădăcini și a conținutului de ulei volatil la valeriană

Nr. crt.	Varianta	Producția de rădăcini uscate			Producția de ulei volatil		
		q/ha	Semnificația		kg/ha	Semnificația	
			craie	intercraie		craie	intercraie
1	Neîngrășat (M)	11,5	c	b	6,3	d	C
2	30 t gunoi + P ₆₀ N ₃₀	14,3	a	a	9,6	a	A
3	N ₆₀ P ₆₀ K ₃₀	13,9	b	a	9	b	A
DS 5 %		1,34-1,58			DS 5 % 0,81-0,99		
		1,68-1,96			1,18-1,43		
Notă: a, b, c = grupe de semnificații; a= semnificația maximă							

Gunoii de grajd (30 - 40 t/ha), bine fermentat, asigură rezultate bune la valeriană, aplicat direct plantei (incorporat cu arătura), sau plantei premergătoare (M.D. Bobiț, 2000)

Lucrările solului. Arătura se execută la 25 - 30 cm adâncime și se întreține curată de buruieni prin lucrări cu discul în agregat cu grapa. Patul germinativ trebuie să fie bine mărunțit și nivelat, folosindu-se în acest scop combinatorul.

Sămânța și semănatul. Valeriana se poate înmulți prin semănat direct în câmp sau prin răsăd. În ambele cazuri sămânța trebuie să aibă puritatea de 90 % (minimum 80 %), iar germinația de 70 % (minimum 50 %). Sămânța de valeriană prin păstrare mai mult de doi ani își pierde repede facultatea germinativă (S. Muntean, 2002).

Se seamănă direct în câmp se face în august, toamna târziu sau primăvara (în ordinea descreșcând a perioadei de favorabilitate), asigurând densitatea de 20 - 30 plante/ m^2 . Se însămânțează în rânduri la distanța de 50 de cm și la adâncimea de 1 - 2 cm, folosind 3 - 6 kg sămânță/ha (amestecată cu material inert, pentru o distribuție mai uniformă) (A. Mihailea, 1988, M.D. Bobiț, 2000, S. Muntean, 2002).

Valeriana se poate înmulți prin răsad, produs în straturi reci (răsadul pentru 1 ha se produce pe circa 150 - 200 m², cu circa 1 kg sămânță, semănat în august), răsadnițe calde (circa 60 m², cu 0,4 kg sămânță, semănat în februarie) sau răsadnițe reci. Răsadul (cu 4 - 5 frunze) se plantează la sfârșitul lunii aprilie - începutul lunii mai, la 50 cm între rânduri și 20 - 25 cm pe rând, asigurând 9 - 10 plante/m² (A. Mihalea, 1988; M.D. Bobiț, 2000; S. Muntean, 2002).

În tabelul 4.23.1.5. (după S. Muntean, 2002) prezentăm producția de rădăcini - rizomi și ulei volatil la *Valeriana officinalis* L. în funcție de perioada de semănat sau de plantat la Cluj-Napoca. Dintre variantele luate în studiu, producția cea mai mare de materie primă și ulei volatil s-a înregistrat la plantatul în luna aprilie.

Lucrările de îngrijire. Se fac prașile și pliviri ori de câte ori este nevoie. Pentru combaterea buruienilor, pe baza unor cercetări efectuate în Germania se recomandă erbicidele: Patoran (2 kg/ha) aplicat primăvara la reluarea vegetației; Tenoran (6 - 8 kg/ha), Aresin (1,2 - 2 kg/ha) sau Gesagard (1 - 2 kg/ha), aplicate imediat după semănat, înaintea răsării plantelor (E. Păun, 1995). În țara noastră, s-au obținut rezultate bune cu Afalon (2 kg/ha) sau Prometrex (2 kg/ha) aplicat imediat după semănat, iar pe vegetație, combinația DMA-6 (1 l/ha) + Furore (2 l/ha), diluate în 400 - 600 l/ha apă (M.D. Bobiț, 2000). La culturile semănate, răirea la 10 - 12 cm pe rând, când plantele au 2 - 3 perechi de frunze. Fânarea (*Erisiphe valerianae*) se combate cu Topsin 40 PU (0,07 %), Thiovit (0,3 %), Karathane (0,1 %) sau Zineb (0,3 %), iar împotriva manei (*Plasmopara valerianae*) și ruginii (*Uromyces valerianae*) se folosește Dithane M-45 (0,2 %); dăunătorii se combat cu Lindatox 3 sau Duplitox 5+3 (25 - 30 kg/ha) (V. Mircioiu, 1982, M.D. Bobiț, 2000).

În loturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturând-se plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. După cum s-a arătat, pentru producerea materiei prime vegetale (rădăcini și rizomi), valeriana se menține în cultură un an. Recoltarea se face toamna (octombrie) sau primăvara foarte devreme, prin dislocarea plantelor când procesele de creștere se reduc sau încetează. Pentru dislocare se utilizează mijloace folosite pentru rădăcinoase: plugul fără cormană, dislocatorul de sfeclă sau cu mașina de recoltat cartofi (MRC-1).

Semințele de valeriană se formează în anul al doilea de vegetație, se maturizează eșalonat și se scutură foarte ușor din inflorescență. Recoltarea loturilor semincere trebuie să se facă în mai multe etape, pe măsură ce semințele ajung la maturitate (când la 20 %

din semințe a apărut puful și au culoarea galben - brună). Se recomandă scuturarea inflorescențelor în coșuri căpușite cu tifon sau hârtie, de câteva ori, apoi tăierea inflorescențelor cu seceră, dimineața, pe rouă, așezarea lor pe platforme acoperite, pentru maturizarea restului semințelor și treierarea cu batoza sau combina (reglarea vântului trebuie să se facă cu atenție) (A. Mihalea, 1988).

Tabelul 4.23.1.5.
Producția de rădăcini-rizomi și ulei volatil la *Valeriana officinalis* L. (soiul Măgurele 100) în funcție de perioada de semănat sau de plantat, la Cluj-Napoca

Nr. crt.	Perioada de semănat sau plantat	Producția de rădăcini și rizomi (în stare uscată)			Conținutul în ulei volatil (% din s.u.)	Producția de ulei volatil	
		kg/ha	%	Dif. (kg/ha)		l/ha	%
1.	Semănat între 15-20 august	1266	100	-	0,83	10,5	100
2.	Semănat între 15-20 octombrie	1141	90,1	-125	0,78	8,9	84,7
3.	Semănat între 15-20 martie	857	67,7	-409	0,75	6,43	61,2
4.	Plantat între 5-10 aprilie	1787	141,2	521	0,93	16,62	158,2
5.	Plantat între 20-25 aprilie	1756	138,7	490	0,91	15,98	152,2
6.	Plantat între 5-10 mai	1631	128,8	365	0,85	13,86	132
		DL 5 %			310		
		1 %			446		
		0,1 %			629		

Notă: Semănatul s-a făcut la 50 cm între rânduri, iar plantația la 50 cm între rânduri și 20 cm pe rând (100 mii pl./ha)

Condiționarea. După recoltarea organelor subterane, se face decolectarea frunzelor, separarea de impurități și spălarea rădăcinilor, imediat după recoltare (operație obligatorie și pretențioasă), apoi se așează în straturi de 8 - 12 cm grosime pentru zvântare. Pentru spălare, rădăcinile se pun în coșuri de nuiele și se trec scurt timp (5 - 10 minute) sub un jet de apă sau se agită cu totul într-o apă curgătoare. Spălarea se poate face și mecanizat cu utilaje de spălat morcovi sau sfeclă furajeră, rădăcinile fiind puse în coșuri sau pe grătare special amenajate (M.D. Bobiț, 2000). Uscarea se poate face pe cale naturală sau artificială. Uscarea pe cale naturală se face în încăperi curate și bine aerisite în strat subțire (cca. 5 cm), însă durează mult (toamna temperaturile fiind scăzute și umiditatea relativă mare). În timpul uscării produsul nu se întoarce, rădăcinile fiind foarte fragile. La soare, uscarea se realizează în cca. 20 zile (F. Crăciun și colab., 1977). Uscarea artificială se face la 35 - 40 °C, și durează 4 - 6 zile, în funcție de umiditatea produsului. Randamentul la uscare este de 3 - 4,5 : 1.

Condițiile tehnice de recepție prevăd ca produsul să fie constituit din rizomi și rădăcini, admitându-se limitele prevăzute în tabelul 4.23.1.6.

Tabelul 4.23.1.6.

Condițiile tehnice de recepție la rădăcini și rizomi de <i>V. officinalis</i> L.		
Specificare	La produsul în stare proaspătă	La produsul în stare uscată
Impurități:		
- rizomi cu resturi de tulpini (% max.)	5	5
- rădăcini subțiri sub 1 mm (radiclele) (% maximum)	5	5
Corpurii străine:		
- organice (% maximum)	0,5	0,5
- minerale (% maximum)	1	4
Unitățile:	normală a produsului la recoltare	Maximum 14 %
Principii active:		
- ulei volatili (% minimum)	0,08	0,3
- substanțe extractive (% minimum)	8	25

Producția medie de rizomi și rădăcini uscate la *V. officinalis* L. este de circa 10 -15 q/ha. Limitele sunt mult mai largi în cadrul genului *Valeriana*, în funcție de specie, după cum rezultă din tabelul 4.21.1.7., după S. Muntean, 2002 și 2003.

Tabelul 4.23.1.7.

Producția de rizomi și rădăcini, conținutul și producția de ulei la specii de *Valeriana* cultivate în condițiile ecologice de la Cluj-Napoca

Nr. crt.	Speciile de <i>Valeriana</i>	Producția de rădăcini și rizomi (uscată)		Dif. (kg/ha)	Semnif.	Conținut de ulei volatili (%)	Producția de ulei volatili	
		kg/ha	%				l/ha	%
1.	<i>V. officinalis</i> L. (M1)	1705	100	-	-	0,87	14,83	100
2.	<i>V. sambucifolia</i> Mikan	1592	93,4	-113	-	0,84	13,37	90,2
3.	<i>C. collina</i> Wallr	520	30,5	-1185	000	1,05	5,46	36,8
4.	<i>V. rossica</i> Titz	510	29,9	-1195	000	0,61	3,87	26,1
5.	<i>V. wolgensis</i> Titz	450	26,4	-1255	000	0,76	3,42	23,1
		DL 5 % 495,2						
		1 % 694,5						
		0,1 % 981,6						

În loturile semincere de valeriană se obțin 300 - 500 kg/ha achene.

4.24. Familia CUCURBITACEAE

4.24.1. LUFA (Buretele vegetal)

(*Luffa cylindrica* (L.) Roem.)

Fr: Eponge vegetale, Loufa; E: Loofah sponge; G: Luffa

4.24.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Numele genului provine de la cuvântul „*luff*”, numele plantei la arabi (I. Prodan și E. I. Nyárády, 1964). Lufa este originară din India de est și se cultivă pe suprafețe mari în Japonia, de unde fructele (bureții vegetali) se exportă în toată lumea (I. Roventța și colab., 1985).

Materia primă și compoziția chimică. De la lufă (burete vegetal) se folosește ca materie primă mezocarpiul fibros (spălat și uscat) al fructului, fără semințe (*Luffae fructus*), format din fibre celulozice, compacte și elastice de culoare gălbuie, fără miros și gust.

Planta întreagă conține substanțe amare (cucurbitacin B), fructele proaspete sunt bogate în mucilagii, semințele conțin: ulei comestibil (22 %), proteină (24 %), saponozide, galactoză, arabinoză, xiloză etc. (I. Roventța și colab., 1985; M. Alexan și colab., 1999, M. Ibrahim și colab., 1999).

Utilizările medicinale sunt restrânse, acțiunea specifică fiind puțin studiată. Empriric s-a folosit rădăcina ca purgativ, fructele proaspete ca emolient, iar (în trecut) cele uscate ca absorbant (în chirurgie). Actualmente, fructul (buretele vegetal) este apreciat ca obiect de toaletă (burete de baie), prezentând calități superioare produselor similare din mase plastice. Lufa este și o apreciată plantă decorativă, alimentară și meliferă. Fructele în primele fenofaze, se consumă (în Japonia, China etc.) sub formă de salată cu alte legume, iar uleiul din semințe este utilizat direct sau ca margarină.

Sistematică. Soiuri. Genul *Luffa* cuprinde 6 specii, răspândite în zonele tropicale ale Europei, Asiei și Africii (I. Roventța și colab., 1985). Specia cultivată este *Luffa cylindrica* (L.) Roem. (fig. 4.24.1., după M. Alexan și colab., 1991 și 4.24.1.a.).

La noi în țară, din această specie, se cultivă soiul local (populația „De Arad” (din anul 1980).

Particularități biologice. *Luffa cylindrica* (L.) Roem. este plantă anuală, unisexuală monoică. Rădăcina este pivotantă, tulpina volubilă, de 3 - 6 m (în condiții optime de vegetație, până la 12 m), cu cârcei, frunzele sunt palmat-lobate (5 - 7 lobi). Florile sunt mari gamopetale, de culoare galbenă, cele masculine cu caliciu campanulat, corola din 5 petale libere, stamine 3 (rar 5), cele femele solitare, cu tubul calicului mai lung decât ovarul. Fructul este o peponidă cilindrică, netedă, cu lungimea până la 50 (70) cm, deschizându-se printr-un capac, pe unde (prin scuturare) sunt extrase semințele. Mezocarpul fructului constituie materia primă, prezentată mai sus.

Cerințe față de climă și sol. Lufa este plantă termofilă (răsare la 10 - 12 °C), sensibilă la înghețuri de primăvară și la temperaturi scăzute în perioada fructificării (fructele rămân mici). Este pretențioasă și față de regimul hidric. Are cerințe ridicate față de sol, pretinzând soluri ușoare, permeabile și structurate, reușind pe cernoziomuri și aluviuni fertile.

Zonare. Având în vedere cerințele plantei, se recomandă cultura ei în Câmpia de Vest, Câmpia Olteniei și Câmpia Burnazului.

4.24.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotatie. Lufa se cultivă după cereale de toamnă și prășitoare bine întreținute, pe același teren putând reveni numai după cca. 5 ani.

Fertilizarea se face cu cca. 30 t/ha gunoi de grajd descompus, 40 - 50 kg/ha P_2O_5 și 20 - 30 kg/ha K_2O (sub arătură) și 50 - 60 kg/ha N (primăvara).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 25 - 30 adâncime și se menține curată de buruieni, prin lucrări cu discul urmat de grapă, iar patul germinativ se pregătește cu combinatorul în preajma semănăturii sau plantatului.

Înmulțirea. Lufa se poate înmulți și prin *semănat direct în câmp* (în zone cu primăveri timpurii și toamne lungi și călduroase), însă mai sigură este realizarea culturii prin *plantarea răsadului*, având în vedere cerințele termice ridicate din cursul vegetației (I. Roventă și colab., 1985; M. Alexan și colab., 1991).

Răsadul necesar pentru plantarea unui ha se produce pe cca. 70 m² răsadniță caldă. Semănatul în răsadniță se face în 1 - 10 martie, în ghivece nutritive, folosindu-se cca. 3 kg sămânță (pentru obținerea răsadului necesar plantării unui ha).

Plantarea răsadurilor (sau a ghivecelor cu răsad) se face după înghețurile târzii de primăvară, între 15 - 20 mai, la 1,5 m între rânduri




Fig. 4.24.1. *Luffa cylindrica* (L.) Roem.

și 70 cm pe rând. I. Roventă și colab., 1985, recomandă efectuarea gropilor pentru plantare în chinconz, la cca. 25 cm pe rând.

Semnățul direct în câmp (în zone cu climă mai dulce) se face în cuiburi, la aceeași distanțe, punându-se într-un cuib 3 - 4 semințe la 1,5 - 2 cm adâncime (M. Alexan și colab., 1991).

Lucrările de îngrijire. Constrau în combaterea buruienilor și ațănarea solului (prin prașile de câte ori este nevoie), instalarea spalierului (suficient de robust, pentru a susține planta până la maturitate), irigarea până la înflorire și cîmpirea vîrfurilor florale (lăsând câte 5 fructe pe plantă).

Recoltarea. Fructele se recoltează cu mîna, la maturitate (când s-a veștejit codița, iar vîrfurile inferioare s-a îngălbenit), înainte de primul îngheț, pe timp frumos.

Condiționare. După cules, fructele se pun la uscat la soare sau în încăperi amenajate.

Condițiile tehnice de recepție. Se cere că produsul să nu conțină corpuri străine sau pete, lungimea să fie peste 16 cm, iar lățimea la mijloc peste 4 cm. Calibrarea și clasarea prevede pentru clasa I lungimea - minimă 20 cm, grosimea, minimum 5 cm, iar pentru clasa a II-a, lungimea minimă 16 cm, grosimea, minimum 4 cm; produsul trebuind să fie bine uscat.

Semințele trebuie să se usuce la umiditatea de păstrare (sub 12 %), putînd fi utilizate pentru extragerea uleiului gras (comestibil). O atenție deosebită se acordă conservării semințelor destinate semănăturii, în vederea păstrării capacității de germinare.

Producția. Se obține la ha între 100 - 200 mii bucăți (fructe) și respectiv 500 - 900 kg sămânță. I. Roventă și colab., 1985, arată că, în condiții optime de cultură, se pot obține până la 800 mii bureți / ha și până la 10 t / ha sămânță.

Observație. Pentru obținerea buretelui de baie se procedează astfel: se scot semințele din fruct prin despicarea căpăcelului din vîrfurile fructului și scuturarea lui; urmează înălțurarea substanțelor mucilaginoase și a cojilor, ținându-se fructele în apă fierbinte 10 minute, apoi se storc, repetîndu-se operația de câteva ori; după înălțurarea mucilaginelor se introduc în apă rece și se înălțură ultimele porțiuni de coji. Urmează apoi ca bureții să se înșiruie pe sfoară pentru uscare. Cinci mii bucăți de bureți vegetali au cca. 100 kg (M. Alexan, și colab., 1991).

4.25. Familia ASTERACEAE (COMPOSITAE)

4.25.1. MUȘTELUL

(*Matricaria chamomilla* L.)

Fr: Camomille, Camomile commune; E: Chamomile, German chamomile; G: Echte Kamille, Kamille

4.25.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Muștelul (romanița) este o plantă cunoscută și folosită în medicina populară încă din antichitate. Muștelul este menționat în lucrările unor autori din antichitate greci (Hippocrate, Dioscorides) și romani (Plinius etc.). Grecii și romanii utilizau inflorescențele de muștel în medicina tradițională și în cosmetică. În Germania s-a obținut „*aqua chamomillae*”, prin distilarea inflorescențelor în vapori de apă (sfîrșitul sec. al XV-lea) și ulterior (sec. al XVI-lea) s-a menționat că uleiul de muștel are culoarea albăstră (A. Dumitrescu, 1988). Uleiul de muștel a fost distilat și descris în anul 1588 (H.P. Dörfler și G. Roselt, 1984). Muștelul a rămas și astăzi o foarte importantă plantă medicinală.

Materia primă și compoziția chimică. De la muștel se recoltează inflorescențele (*Chamomillae flos*, *Matricariae flos*). Pentru extragerea uleiului volatil uneori se folosește partea aeriană în faza de înflorire (*Chamomillae herba*).

Conținutul produsului în ulei volatil și compușii acestuia variază în funcție de proveniență, fiind cuprins între 0,2 - 1,5 % (U. Stănescu și colab., 2004, V. Istrudor, 2001 etc.). După diferenți autori, citați de V. Cucu și colab., 1982, conținutul inflorescențelor în ulei volatil, în diferite țări este următorul: Argentina, 0,52 - 0,83 %; Cehoslovacia, 0,6 - 1 %; Egipt, 0,6 - 1,6 %; Franța, 0,31 - 0,78 %; Germania, 0,45 - 1,5 %; Grecia, 0,44 - 0,56 %, Iugoslavia, 0,37 - 1,2 %; Ungaria, 0,16 - 0,84 %, iar în România 0,38 - 0,81 %. Uleiul volatil de muștel conține hidrocarburi sesquiterpenice (chamazulenă, farnesen, cadinen, calamenen etc.), hidrocarburi monoterpene (terpinen, mircen, caren), alcooli sesquiterpenici (α -bisabolol), spatulenol, diferiți derivați polimerici, xantoxilină (cetona aromatică) etc. Inflorescențele mai conțin flavonoide (5,7 - 7,2 %), cumarine

(umeliferonă, herniarină), acizi organici, vitamine (acid nicotinic, B₁, C), săruri minerale etc. (V. Cucu și colab., 1982, C. Ohe și colab., 1995). Chamazulena nu preexistă în plantă, identificându-se doar urme în inflorescențele uscate sau proaspete. Se găsește sub formă de prohamazulene. Prin antrenare cu vapori, prohamazulenele se transformă (prin deschiderea inelului lactonic, pierderea restului acetil și deshidratare) în acid prin chamazulencarboxilic (E. Szahl, citat de V. Cucu și colab., 1982), care prin decarboxilare trece în chamazulenă de culoare albastră. Au fost izolate și descrise 2 prohamazulene (matricina, matricarina), localizate în perii glandulari de pe flori (tubuloase și ligulate). Factorii ecologici influențează conținutul și compoziția uleiului volatil al mușetelului (L. Hölzl, G. Demuth, 1975, Ch. Franz și colab., 1975 etc.). E. Păun și A. Mihalea, 1966 au constatat că spațiul de nutriție și îngrășămintele organo - minerale nu influențează conținutul de ulei volatil și de azulene.

Utilizări. *Chamomillae flos* are acțiune antispastică, anestezică, carminativă, dezinfectantă, antiinflamatoare etc. Acțiunea antiflogistică și antispastică a uleiului volatil se datorează chamazulenei, precum și bisabololului (V. Cucu și colab., 1982). Flavonoidele și cumarinele dau inflorescențelor acțiunea spasmolitică. Mușetelul este folosit intern (ceai sau produse farmaceutice) în inflamațiile mucoaselor tubului digestiv, cât și extern (comprese în inflamații ale organului vizual, ceai în inflamații ale cavității bucale, cataplasme și băi medicinale). Infuzia de mușetel se recomandă în toate afecțiunile stomacului și intestinelor, în afecțiunile otorinolaringologice, inflamații, dermatoze, ulcer varicos etc. Ceaiul de mușetel provoacă transpirația, făcând să scadă febra, fiind indicat în răceli și gripă. Intră în compoziția ceaiurilor: **Anticolicic, Gastric Contra Colicilor nr. 2, Contra Colicilor pentru copii, pentru gargară și sudorific.** Uleiul volatil intră în compoziția unor produse farmaceutice antiflogistice gastrointestinale (**Kamillosan, Perkamillon, Eucamillat**) și în afecțiuni ale pielii sau a căilor respiratorii (**Romazulan**). În *Farmacopeea Română* figurează *Chamomillae flos*, cu un conținut de cel puțin 0,4 % (v/g) ulei volatil de culoare albastră. Mușetelul are și variate utilizări în industria cosmetică.

Răspândire. Mușetelul este originar din sudul și estul Europei și vestul Asiei. Este răspândit în Europa Centrală și Meridională, nordul Africii, Asia. A fost importat în America și Australia. Mai mari producătoare și exportatoare a produsului vegetal sunt Argentina,


Egipt, Bulgaria, România, Ungaria, fosta Cehoslovacie, Germania, Spania. Astăzi crește spontan sau se cultivă pe toate continentele.

La noi în țară este răspândit în flora spontană din locuri însorite, pajiști și lanuri, pe lângă drumuri etc. Cele mai importante bazine se găsesc în Câmpia de Vest, (jud. Arad, Bihor, Satu Mare, Timiș), Muntenia (Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Brăila, Teleorman), Moldova (Galați, Iași, Vrancea, Botoșani) Oltenia (Mehedinți, Dolj, Olt). Dobrogea mai ales în Delata Dunării (F. Crăciun și colab., 1977). În unele zone de câmpie pe locuri sărăturoase apare în masiv. Mușetelul este și o importantă plantă medicinală cultivată.

Sistematică. **Soluri.** Specia cultivată este *Matricaria chamomillae* L. (*Chamomilla recutita* L. Rauschert; *Chamamomilla vulgaris* Koch) (fig. 4.25.1 după E. Coiciu și G. Răcz, 1962 și 4.25.1.a., original). Specia are $2n = 18$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). Denumirea genului provine de la cuvântul latinesc *mater* = mamă, arătând folosirea plantelor contra bolilor la femei (E.I. Náyrády, 1964). Această specie apare în flora spontană împreună cu alte specii din genul *Matricaria* și *Anthemis* care au mirosul specific al mușetelului cum sunt (după E. Coiciu și G. Răcz, 1962): *M. inodora* L. (*M. maritima* L., ssp. *inodora* (L.) Soo), cu flori mai mari și receptacul plin la interior; *M. matricarioides* (Less) Porter, (*M. discoidea* D.C., *M. suaveolens*, *Buchenau non* L.), care nu are florile marginale ligulate, iar culoarea capitulelor este galben verzuie. Speciile din genul *Anthemis* au receptaculul plan, semiglobulos (rar conic), plin în interior, cu câte o palee scumiforă de fiecare floare. Din acest gen. *A. nobilis* L., este plantă medicinală. Mai apare *A. arvensis* L. și *A. tinctoria* L. (ambele cu capitule mai mari 2,5 - 3 și 4 cm), *A. cotula* L. (1 - 3,5 cm diametrul inflorescenței, peduncul scurt și miros neplăcut). Inflorescența speciei *M. chamomilla* L., este diferită de a altor specii medicinale.

Solurile de *M. chamomilla* L. cultivate la noi în țară sunt Mărgăritar (din anul 1982) și Flora (din anul 1989), care s-au remarcat prin producții ridicate de inflorescențe și ulei volatil (A. Dumitrescu, 1983, 1988 și 1997).

Particularități biologice. Mușetelul este o plantă ierboasă anuală sau hibernantă. Rădăcina este pivotantă, cu axul principal dezvoltat până la 50 cm adâncime, însă masa rădăcinilor se formează în straturile superioare ale solului (până la 30 cm). Tulpina este erectă cu înălțimea de 10 - 50 cm, în cultură ajunge până la 80 cm, mai mult sau mai puțin ramificată. În locuri bătorite are între 10 - 20 cm înălțime și este neramificată, iar în pajiști și culturi ajunge la 50 cm înălțime sau chiar mai mult și este foarte ramificată.

Fig. 4.25.1. *Matricaria chamomilla* L.

Tulpina este de 3 - 4 mm grosime, de formă cilindrică, striată, glabră, sau foarte fin păroasă. Frunzele sunt sesile, de 2 - 3 ori penat sectate, cu 6 - 10 perechi de secțiuni distanțate, liniare (până la 0,5 mm lățime), scurt mucronate și glabre. Florile sunt de 2 feluri ligulate și tubuloase. Ele sunt grupate în capitule (antodii), cu diametrul de cca. 2 cm, dispuse în capătul ramificațiilor tulpinii pe un peduncul lung de 5 - 10 cm. Involverul se compune din 20 - 30 bractee eliptice, cu lungimea până la 3 mm. În jurul receptaculului sunt 12 - 18 flori ligulate de culoare albă, unisexuate, femele și sterile. Florile tubuloase (cca. 500) hermafrodite, dispuse central de culoare galben aurie, au corola gamopetală, cu 5 dinți, androceul format din 5 stamine, gineceul cu ovar inferior. Receptaculul la început este plan sau semiglobulos, apoi treptat se alungește, devenind conic. Până la înflorire receptaculul este plin cu măduvă, iar la înflorire, devine gol în interior. Înflorirea are loc din aprilie în august (uneori a 2-a oară înfloarește în septembrie). Florile au miros plăcut, specific, datorită uleiului volatil. Acesta este localizat în glandele oleifere aflate pe flori și pe receptacul, florile tubuloase sunt mai bogate în glande decât cele ligulate (V. Cucu și colab., 1982). Fructul este o achenă de 1 - 1,5 mm lungime și cca. 0,3 mm lățime, cu 3 - 5 coaste longitudinale alburii, pe fond cenușiu până la galben cenușiu. O plantă poate produce cca. 45.000 de fructe (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). MMB este de 0,03 - 0,05 g (V. Velican, 1965). Într-un g intră cca. 25 - 35 mii de semințe.

Cerințe față de climă și sol. Mușetele nu are pretenții deosebite față de căldură. Semințele încep să încolțească la 6 °C (V. Velican, 1965), însă are răsărire bună la temperaturi mai ridicate, (în laborator au încolțit după 18 ore la 28 °C și după 6 ore la 30 °C) (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Dă rezultate bune la semănatul în august - septembrie, tinerele plante suportă gerul de peste iarnă, (până la -30 °C), putând ierna în faza de rozetă. Sensibile la ger sunt plantele la care sunt pornite tulpinile florifere și mai ales cele în faza de butonizare (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). S-a constatat că după o perioadă foarte umedă (pe soluri ușoare sau ușor sărăturate, în Delta și în jud. Brăila), dacă temperatura crește brusc, apare o brunificare rapidă a plantelor devenind inapte pentru recoltat (F. Crăciun și colab., 1977). Se recomandă în acest caz recoltarea la începutul înfloririi și în cel mai scurt timp. Pentru dezvoltarea plantei și acumularea uleiului volatil, temperatura cea mai potrivită este de 20 - 25 °C. Aria lui de răspândire ajunge în N până la latitudinea de 63° 45', datorită rezistenței la temperaturi scăzute. Mușetele este considerat o plantă de zi lungă (V. Cucu și colab., 1982). Condițiile de iluminare bună

asigură dezvoltarea plantelor și acumularea uleiului volatil. Are nevoie de lumină de la răsărire. Insolăția puternică primăvara s-a constatat că este dăunătoare plantelor (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Față de umiditate are cerințe mai mari în prima parte a vegetației, de la semănat la înrădăcinare (V. Velican, 1965). La germinat pretinde o umiditate bună în sol, având semințe mici. Seceta în perioada răsării reduce numărul plantelor. Rădăcina plantelor fiind firavă, pretinde umiditate suficientă în straturile superficiale ale solului. Plantele se dezvoltă bine la cca 70 % din capacitatea solului pentru apă.

Mușetelul nu este pretențios față de sol. Reușește pe diferite tipuri de sol, fiind răspândit în toate zonele agricole ale țării. Crește pe soluri ușoare, pe cele turboase, mlăștinoase. Mușetelul poate fi cultivat pe solurile alcaline din Câmpia de Vest a țării (I. Vlas și I. Bonțău 1988). Este o plantă a solurilor alcaline de stepă, însă crește și pe soluri acide (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Preferă pH-ul cuprins între 7,3 - 8,1 (E.F. Heeger, 1956, citat de V. Cucu și colab., 1982). Această plantă valorifică bine sărăturile, însă dă rezultate bune pe cernoziomuri. Fenomenul de "periodicitate" constatat în bazinele naturale (2 - 3 ani între goale, apoi apar din nou plante), se explică prin faptul că prin putrezirea plantelor de muștel, în sol se acumulează unele substanțe organice (formând un mediu toxic), care, după mineralizare și levigare, permit din nou dezvoltarea normală a plantelor (F. Crăciun și colab 1977).

Zonarea. Pentru cultură, zona foarte favorabilă este Câmpia Crișurilor și Câmpia Timișului, iar ca zonă favorabilă Câmpia Burnazului, Câmpia Bărăganului și Câmpia Moldovei, pe variate condiții de sol (F. Crăciun și colab., 1977, A. Dumitrescu, 1986).

4.25.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Deși este plantă anuală, cultura se poate menține pe același teren 2 - 3 ani, astfel că se recomandă să se amplaseze în afara asolamentului (E. Păun, 1995). Mușetelul pretinde premergătoare care eliberează terenul devreme (borceag, cereale de toamnă etc.). După unele cercetări rezultate bune s-au obținut prin cultivarea mușetelului după degețelul lănos (V. Niță, 1992). Pe același teren poate reveni numai după 4 - 5 ani.

Pentru producerea seminței, se aleg parcelele cu plante tipice, bine dezvoltate și cu proveniență cunoscută. Loturile seminciare vor fi izolate la 1000 - 1500 m de alte culturi de muștel.

Fertilizarea. În cultura mușetelului se folosesc îngrășăminte chimice, în doze dependente de fertilitatea solului, de plantele

premergătoare etc. Se recomandă doze de 40 - 50 kg/ha P_2O_5 și K_2O (toamna) și 40 - 50 kg/ha N (primăvara) (E. Păun și A. Mihalea, 1966, R. Stoianov, 2000). Azotul condiționează dezvoltarea plantelor, însă în doze prea mari determină căderea plantelor și favorizează înmulțirea bolilor. Fosforul și potasiul conduc la sporirea conținutului de ulei volatil (A. Dumitrescu, 1988).

Lucrările solului. Mușetelul este pretențios la modul de pregătire a solului. Arătura se face la 23 - 25 cm adâncime imediat după eliberarea terenului. Patul germinativ trebuie să fie cât mai bine mărunțit și nivelat, mușetelul având semințe foarte mici. Se folosește în acest scop combinatorul. Terenul trebuie tăvălugit înainte și după semănat.

Sămânța și semănatul. Mușetelul se înmulțește prin semănat direct în câmp. Sămânța trebuie să fie proaspătă, cu puritatea de 70 % (minimum 50 %), iar germinația 65 % (minimum 45 %). Semințele cu vechime de un an pierd 50 % din germinație, iar cele de patru ani sunt practic negerminabile (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Epoca optimă de semănat este din luna august până la începutul lunii septembrie (E. Păun, 1995), însă se poate semăna și primăvara devreme (martie). Densitatea la răsărire trebuie să fie de 300 - 350 plante/m² (R. Stoianov, 2000). Semănatul se face cu semănători universale (adaptate pentru semințe mici) la 15 sau 25 cm (pe terenuri îmburuienate la 40 cm) între rânduri și la adâncimea de 0,3 - 0,5 cm, folosindu-se 3 - 4 kg sămânță/ha (în amestec 1 : 1 cu material inert - rumeguș, nisip fin etc.) (A. Dumitrescu, 1988). R. Stoianov, 2000, arată că mai potrivită este distanța de 25 cm între rânduri, deoarece spațiile mai mari conduc la eşalonarea înfloriturii și îngreunarea recoltatului.

În solele curate de buruieni, cultura se poate menține doi (eventual trei) ani pe același loc. În acest caz, după recoltarea inflorescențelor principale, se lasă inflorescențele secundare până se maturizează și se scutură semințele. Apoi se cosesc și se îndepărtează tulpinile, se încorporează semințele (cu grapa sau cu sapa rotativă) în stratul superficial al solului (A. Dumitrescu, 1986, R. Stoianov, 2000).

Lucrările de îngrijire. În anii fără precipitații după semănat, se recomandă irigarea culturii pentru răsărire și formarea rozetei folosindu-se norme reduse de apă. Culturile semănate la 25 (40) cm se prășesc de 1 - 2 ori cu săpăligi înguste, apoi se fac 1 - 2 pliviri. Se pot folosi erbicidele: Balan (5 l/ha), Dual (4 l/ha) sau Lasso (6 l/ha), aplicate înainte de semănat și încorporate în sol. Erbicidul Afalon (1, 5 kg/ha) se aplică în faza de 6 - 8 frunze a mușetelului, iar DMA-6 (1 l/ha), Prometrex (4 kg/ha), sau Iloxan (3 l/ha), în faza de

8 - 10 frunze, asociate cu produsul antiinflamatoric, Furor (2 l/ha) (R. Stoianov, 2000). Erticidale se aplică în 400 - 600 l apă la ha.

În loturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturând plantele netipice, cu puține ramificații terminate cu flori și pe cele brune.

Recoltare. Mușetelul se recoltează când, la majoritatea inflorescențelor, florile ligulate s-au desfăcut și sunt dispuse orizontal (după ora 9 dimineața), iar cele tubuloase sunt în curs de înflorire, având o culoare galbenă (cele înflorite) și galben - verzui (cele ne înflorite). În această fază, conținutul în ulei volatil este cel mai ridicat. Dacă se recoltează mai devreme, inflorescențele nu se usucă bine și se brunifică ușor, iar dacă se întârzie, o parte din florile tubuloase se scutură. La culturile semănate toamna, înflorirea începe în luna mai și continuă până spre sfârșitul lunii iunie. În anul doi de cultură, înflorirea începe ceva mai devreme. Dacă înfloresc primăvara timpuriu plantele mai înfloresc încă o dată toamna.

Mușetelul se recoltează în mai multe etape, pe măsura ajungerii inflorescențelor în faza optimă de recoltare. Înflorirea durează cca. o lună, sau chiar mai mult, timp în care se fac 2 - 4 recoltări, la un interval de 3 - 6 zile. În zone ceva mai umede, sunt posibile mai multe recoltări. Recoltarea se face pe timp frumos după ce s-a ridicat roua. Se poate recolta cu mâna sau cu recoltatorul metalic cu pieptene. Recoltatorul pentru mușetel este format dintr-o cutie cu latura inferioară dințată, fiind prevăzut cu un mâner de 50 - 60 cm. Recoltarea se face prin balansarea recoltatorului la nivelul florilor, care se rup, se strâng și se recoltează în cutie. Inflorescențele nu trebuie să aibă codițe mai lungi de 1 cm și să nu fie impurificate cu ramuri sau frunze. Recoltarea se face și cu mașina de recolat, cu recoltători mecanici cu pieptene (F. Crăciun și colab., 1977). După recoltare, produsul se predă imediat la centrul de prelucrare sau se păstrează în strat subțire. Transportul la centrul de prelucrare se recomandă să se facă seara, noaptea sau dimineața (nu pe timp însorit, în coșuri (cca. 10 cm grosime).

Herba se recoltează prin cosire după ce s-au recolat de 2 - 3 ori florile.

Loturile semincere se recoltează când florile ligulate au început să cadă, iar florile tubuloase au culoarea galben murdar. Plantele în această fază de vegetație se taie cu secera sau cu coasa dimineața sau pe rouă, se duc pe platforme betonate pentru uscare, apoi se treieră, iar semințele se condiționează. S-a constatat că

expunerea semințelor la soare, duce la creșterea germinației acestora (A. Dumitrescu, 1988).

Condiționarea. Uscarea inflorescențelor și herbei se face pe cale naturală sau artificială. Uscarea naturală se face la umbră în încăperi curate și aerisite, în strat subțire pe hârtie, rame, prelate. Se așează cca. 1 kg produs proaspăt la m², care nu se întoarce până la uscare (5 - 7 zile). Uscarea artificială se face la 30 - 35 °C. Randamentul la uscare al inflorescențelor este de cca. 5 : 1, iar al herbei de 3 - 4 : 1.

Condițiile tehnice de recepție pentru *Chamomilla flos* în stare proaspătă prevăd un conținut de ulei volatil de minimum 0,08 %; ca impurități: maximum 5 % tulpini și frunze de mușetel și maximum 5 % flori cu peduncul mai lung de 2 cm; corpuri străine organice, maximum 2 % și cele minerale, maximum 0,3 %; umiditate normală a produsului la recoltare, fără urme de apă pe plante.

Condițiile tehnice de recepție pentru *Chamomilla flos* în stare uscată, prevăd trei clase de calitate, redată în tabelul 4.25.1.1.

Condițiile tehnice de recepție pentru *Chamomilla herba* în stare proaspătă prevăd ca impurități: maximum 1 % (resturi de rădăcină; corpuri străine organice, maximum 1 %, iar cele minerale, maximum 0,1 %; umiditatea normală a produsului proaspăt la recoltare, fără urme de apă pe plante.

Tabelul 4.25.1.1.

Condițiile de recepție pentru <i>Chamomilla flos</i>		Specificare		
Principii active:	Extra	I	II	
- ulei volatil (% minimum)	0,4	0,4	-	
Impurități:				
- flori brunificate (% maximum)	5	5	10	
- resturi de frunze și tulpini (% maximum)	nu se admit	1	2	
- flori cu peduncul mai lung de 2 cm (% maximum)	3	5	7	
- flori sfărâmate ce trece prin sita cu ochiuri de 3 mm (% max.)	10	11	12	
Corpuri străine:				
- organice (% maximum)	1	2	2,5	
- minerale (% maximum)	0,25	0,25	0,3	
Umiditate:				
- (% maximum)	13	13	13	

Pentru *Chamomilla herba* în stare uscată, condițiile tehnice de recepție prevăd ca impurități: maximum 1 %, resturi de rădăcină; corpuri străine organice, maximum 1 %, iar cele minerale, maximum 0,5 %; umiditatea de maximum 13 %.

Producția medie este de 20 - 30 q/ha inflorescențe proaspete, dar în condiții bune de cultură și umiditate (irigare), se pot realiza și

40 - 60 q/ha inflorescențe proaspete sau 8 - 15 q/ha inflorescențe uscate.

În loturile semincere de mușețel se obțin 200 - 300 kg/ha achene.

4.25.2. COADA ȘORICELULUI (*Achillea millefolium* L.)

Fr: Milfefeuille, Achilée; E: Milfoil, Yarrow; G: Schafgarbe

4.25.2.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Coadă șoricelului este o veche plantă medicinală, utilizată de multe popoare sub formă de ceaturi, având proprietăți stomahice, hemostatice, antiidiareice și pentru uz extern, în tratamentul rănilor. La noi este menționată din 1863, în scrieri (E. Coiciu, 1967). Numele genului derivă de la Achilles, erou grec din luptele de la Troia (I. Prodan și E. Nyarady, 1964).

Materia primă și compoziția chimică. Coadă șoricelului se cultivă pentru partea aeriană - la înflorire (*Millefolii herba*), sau pentru inflorescențe (*Millefolii flos*).

Produsul conține ulei volatil și alți compuși în proporții diferite în funcție de proveniență. Conținutul cel mai ridicat de ulei volatil îl au inflorescențele, urmate de frunzele tulpinale, apoi cele din rozeta bazală, iar cele mai sărace sunt tulpinile. În inflorescențe, conținutul în ulei volatil este cuprins între 0,34 - 1,4 %, în faza de boboc verde fiind mai mică (0,337 - 0,45 %), apoi crește în faza înfloririi (0,767 - 1,4 %), după care scade la completa înflorire (0,31 - 0,311 %); în frunzele mature, conținutul de ulei volatil este de 0,051 - 0,274 % (V. Cucu și colab., 1982, A. Julzentiene și D. Mockute, 2005). H. Popescu și H. Winand, 1977, au determinat în inflorescențele acestei plante provenite din județul Cluj, între 0,09 - 0,45 % ulei volatil, H. Popescu și E. Katz, 1978, au găsit în inflorescențe provenite din județul Sălaj între 0,18 - 0,37 % ulei volatil și au semnalat o proporționalitate inversă între conținutul de ulei volatil și concentrația azulenică în ulei. H. Popescu și I. Pop Hakkell, 1980, au determinat, în inflorescențe din județul Sibiu, între 0,18 - 0,59 % (medie 0,34 %) ulei volatil, semnalând, de asemenea, corelația invers proporțională ce există între conținutul de ulei și cel de azulene. Aceiași autori arată că în probele analizate s-a identificat pentru prima oară acetatul de linalil,

linaloolul și geranionul în uleiul volatil al acestei plante. Din materia primă uscată, randamentul de ulei volatil în producția curentă este de cca. 0,2 % (F. Crăciun și colab., 1977). În uleiul volatil de coada șoricelului, s-au identificat azulene, caryophyllene, eucalyptol, borneol, bornil, acetat, α -pinen, β -pinen, limonen și tuionă (M.Y. Haggag și colab., 1975). Dintre compușii uleiului volatil prezintă importanță farmacologică sesquiterpenele azulenice, aflate în plantă sub formă de proazulene. Acestea, în cursul izolării uleiului volatil (antrenare cu vapori de apă), se transformă în azulene, predominantă fiind chamazulena. Conținutul în azulene la plante din flora spontană este de 20 - 29 % din uleiul volatil, iar la cele cultivate, peste 50 % din uleiul volatil (V. Cucu și colab., 1982). În țara noastră s-au obținut, prin selecție, plante care au în inflorescențe 0,52 % ulei volatil, cu 81 % chamazulen, iar în părțile aeriene 0,23 - 0,25 % ulei volatil cu 20,8 - 30,7 % chamazulen (F. Crăciun și colab., 1977). În uleiul volatil s-au identificat încă un număr mare de terpenoide (0,27 % triclen, 9,4 % α -pinen, 7,13 % β -pinen, 6 % camfen, 12,35 % sabinen, 0,22 % mircen, 1,7 - 10 % limonen, 1,3 % α -terpinen, cca. 20 % camfor, 0,22 % humulen, cca 2 % acetat de bornil, 2,55 % borneol etc.); acizi organici (formic, acetic, butiric, izovalerianic, salicilic), alcool metilic și etilic, formaldehidă, acetona etc.

Herba conține substanțe amare formate din diferite lactone sesquiterpenice, de tip guaianolidic (achilina, austricina etc.) și de tip germacran (millefolida etc.), precum și proteine, glucide, acizi grași, alcooli etc.

Inflorescențele mai conțin flavone (0,15 %) cumarine (0,35 %), taninuri hidrolizabile și condensate (3,78 %), glucide (3 %), vitamine, săruri minerale etc. S-a identificat un complex proteinglucidic, extractibil în apă, hidrolizantul conținând glucide (glucoză, xiloză, arabinoză, manoză, galactoză, ramnoză) și amonoacizi (glicina, acizii aspartic și glutamic), cu acțiune puternic antiinflamatoare (V. Cucu și colab., 1982).

Utilizări. Uleiul volatil fiind bogat în azulene are efecte antiinflamatoare, epitelizante, desensibilizante, antimicotice și antibacteriene (V. Ciocănelea și colab., 1981, M. Tămaș și colab., 2005). Inflorescențele de coada șoricelului constituie o importantă sursă de azulen, putând înlocui mușețelul. Acțiune puternic antiinflamatoare prezintă și complexul proteinglucidic.

Se recomandă în afecțiuni ale stomacului și intestinelor (enterocolite și gastrite), reducând aciditatea în cazul gastritelor. Datorită substanței amare achileina (achilina, achilleina), are

proprietăți tonice și stimulatorii asupra apetitului, mărește secreția bilei, reduce timpul de coagulare a sângelui. S-au obținut rezultate bune în afecțiuni hemoroidale, ca astringent, dezinfectant și calmant al fistulelor anale. Uleiul volatil are efect favorabil în boli de piele, eczeme, și în tratamentul unor plăgi. Intră în compoziția **ceaiurilor: Antiasmatic, Gastric nr. 2, Hepatic nr. 2, Anticolicic, Contra colicilor nr. 2, Diuretic nr. 3 și Laxativ Anthemoroid.** În medicina populară, se folosește contra durerilor de stomac și împotriva tusei (G. Răcz, 1960). În caz de abuz, apar fenomene de toxicitate, datorită achileinei care se hidrolizează (prin intermediul unor enzime) în ulei volatil și acid cianhidric (care este toxic). Intoxicarea se manifestă prin crampe însoțite de stări de apatie și se combate prin aplicarea de vomitive, laxative și control medical (A. Radu și E. Andronescu, 1984).

Răspândire. Coada șoricelului apare în flora spontană din Europa, Asia, America de Nord și Australia. Produsul vegetal este furnizat în special de țările din estul și sud - estul Europei, Anglia etc. Este răspândită în flora spontană, (pășuni și fânețe) din țara noastră, în variate condiții ecologice, din zona de câmpie până în cea montană. În flora spontană sunt plante care practic nu conțin chamazulen, iar în altele întrec conținutul maxim obținut la mușetel. De aceea s-a luat în cultură, obținându-se biotipuri cu conținut ridicat de azulene (chamazulen).

Sistematică. Soluri. Specia cultivată este *Achillea millefolium* L. (fig. 4.25.2., după Flora României, vol. IX, 1964 și 4.25.2.a., original). După A. Laza și G. Răcz, 1975 *A. millefolium* L. are $2n = 54$ (36, 45).

Alături de *A. millefolium* L. mai apar *A. collina* Becker, *A. pannonica* Scheele, *A. crimifolia* W. et K și *A. stricta* Sch. fiind recoltate de multe ori împreună (F. Crăciun și colab., 1977). *A. setacea* W. et K ($2n = 18$), nu conține proazulene (A. Laza și G. Răcz, 1975). Materialul vegetal recoltat din flora spontană a țării noastre este format în special din inflorescențele speciilor *Achillea millefolium* L. și *Achillea collina* Becker, iar în unele țări europene singura specie furnizoare admisă pe piața farmaceutică este *Achillea collina* Becker. (U. Stănescu și colab., 2004). În țara noastră *A. collina* Becker este cea mai răspândită în flora spontană din Transilvania (E. Grogorescu, 2004). În cadrul genului *Achillea* sunt specii și subspecii di-, tri-, tetra-, hexa-, hepta și octoploide, grupate în două biotipuri din punctul de vedere al capacității de a sintetiza azulene.




Fig. 4.25.2. *Achillea millefolium* L.

Unii autori consideră ca tipul azulenlic ar fi numai cel tetraploid ($2n = 36$) și neazulenlic di-, hexa- și octoploid, alții au găsit ca tip azulenlic tetra-, hexa-, și octoploid, iar neazulenlic, numai cel diploid ($2n = 18$), (V. Cucu și colab., 1982).

Achillea millefolium L. prezintă diferiți taxoni chimici, cu conținut diferit în azulene. *A. millefolium* ssp. *millefolium* cuprinde taxoni de tip azulenlic ($2n = 27$) și neazulenlic ($2n = 54$), iar *A. millefolium* ssp. *colina* Becker (Ehrendorfer) (*A. colina* Becker) este tetraploidă ($2n = 36$) și conține azulene (după V. Cucu și colab., 1982). Un studiu monografic al genului *Achillea* a făcut I. Prodan, 1931. Ulterior, Elisabeta Răcz-Kotilla 1962 a efectuat un studiu farmacognostic al speciilor din acest gen răspândite în țara noastră (E. Coiciu, 1967), la care se adaugă cercetările efectuate la Facultatea de Farmacie Cluj-Napoca de H. Popescu și colab., citate mai sus.

La noi în țară, din specia *Achillea millefolium* L. se cultivă soiul local (populația) "De Bujoreni" (din anul 1976).

Particularități biologice. Coadă șoricelului este o plantă ierboasă, perenă. O cultură se menține cca 4 - 5 ani (F. Crăciun și colab., 1977). În sol are un rizom lignificat, din care se dezvoltă stolonii subterani și tulpinile aeriene. Tulpinile sunt de 2 tipuri: tulpini florifere, cu internodii lungi, înalte de 20 - 80 cm și groase până la 0,5 cm, păroase, ramificate, terminate cu inflorescențe și tulpini cu internodii scurte care poartă numai frunze. Frunzele alterne, de 2 - 3 ori penat sectate. Cele inferioare au până la 35 cm lungime și 2 - 4 cm lățime, iar cele tulpinale de cca 8 cm lungime. Florile sunt dispuse în inflorescențe corimb compus, din peste 100 de capitule (antodii), ovoidale, lungi de 3 - 6 mm, cu involucrel format din bractee păroase. Fiecare capitul are 5 - 6 flori marginale, ligulate, femele cu corola tridentată și cca. 20 de flori interioare, tubuloase, hermafrodite, corola gamopetală cu 5 dinți, androceul din 5 stamine concrescute, gineceul cu ovar inferior. Planta înflorește din iunie până în septembrie octombrie. Fructul este o achenă, lungă de 2 - 3 mm, lată de 1 - 2 mm, groasă de 0,2 - 0,4 mm, cu MMB de cca. 0,14 g.

Cerințele față de climă și sol. Coadă șoricelului este o plantă care trăiește în condiții foarte variate de climă. Crește atât în zone însorite, cât și în cele umbrite. În condiții de lumină mai multă, realizează un conținut mai ridicat de ulei volatil și de proazulenă în plantă (E. Răcz-Kotilla, 1962, E. Coiciu 1967). S-a constatat că plantele care au crescut în condiții de climă caldă și umedă au avut conținutul de chamazulenă mai mare decât cele crescute în locuri uscate (I. Breinlch, 1970, V. Cucu și colab., 1982). În condiții de

umbră se reduce fotosinteza și scade conținutul de proazulene. Crește pe diferite tipuri de sol. S-a constatat că diferitele tipuri de soluri au influență asupra producției de materie primă, însă influențează mai puțin conținutul de azulene. Mai favorabile sunt solurile ușoare, drenate.

Zonare. Zone favorabile sunt: Câmpia Bărăganului, Câmpia Dobrogei, Câmpia Burnazului, Câmpia Olteniei (jud. Dolj și Olt) și Câmpia Timișului (F. Crăciun și colab., 1977).

4.25.2.2. Tehnologie de cultivare

Rotăția. Coadă șoricelului se amplacează în afara asolamentului, cultura durând 5 - 7 ani și chiar mai mult, în funcție de întreținerea și exploatarea plantației (E. Păun, 1995). Se cultivă după cereale și prășitoare bine întreținute. Pe același teren poate reveni numai după 4 - 5 ani.

Pentru obținerea de semințe, se aleg parcelele cu plante tipice, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea. Anual se aplică 30 - 40 kg/ha P_2O_5 și circa 40 kg/ha K_2O (toamna) și 60 kg/ha N (primăvara) (V. Plugaru, 2000). Dozele se stabilesc în funcție de fertilitatea solului. În tabelul 4.25.2.1. (după A. Dumitrescu, 1986) se prezintă influența îngrășămintelor pe solul de al Fundulea asupra producției de herba și ulei volatil, la această plantă. Se remarcă influența azotului în sporirea producției de herba și ulei volatil, în special în prezența fosforului. Potasiul nu a asigurat sporuri de producție în condițiile în care s-au experimentat însă pe soluri mai sărace se va aplica și acest element.

Tabelul 4.25.2.1.
Influența fertilizării asupra producției de herba și ulei volatil
la *Achillea millefolium* L.

Varianta	Producția de herba uscată		Producția de ulei volatil	
	q/ha	%	kg/ha	%
Maritor (nefertilizat)	18,9	100	5,1	100
$N_{50}P_{50}K_{50}$	21,8	115	5,1	100
$N_{100}P_{50}K_{50}$	25,8	136	6,5	128
$N_{50}P_{100}K_{50}$	33,5	177	8,7	170
$N_{100}P_{100}K_{50}$	30,2	159	7,9	154
$N_{50}P_{50}K_{100}$	30,8	162	7,7	153

Lucrările solului. Arătura se face la 25 - 30 cm și se menține curată de buruieni prin lucrări cu discul urmat de grapă. Patul germinativ se pregătește în preajma semănăturii cu combinatorul,

urmărindu-se o bună mărunțire și nivelare a terenului. Înainte de semănat, se recomandă să se facă o tăvălugire.

Sămânța și semănatul. Coada șoricelului se înmulțește în mod obișnuit prin sămânță. Se poate înmulți și pe cale vegetativă, însă această metodă se va aplica numai pe suprafețe mici (E. Păun, 1995). Semețele sunt foarte mici (circa 7 mii de semețe la un g). Ele trebuie să aibă puritatea de 70 % (minimum 50 %), iar germinația de 65 % (minimum 50 %).

Semănatul se face în lunile august - septembrie (ca plantele să intre în stadiul de rozetă), sau în pragul iernii (în zonele mai umede), realizându-se densitatea de 12 - 16 plante/m² (F. Ciăcui și colab., 1977, V. Plugaru, 2000). La semănatul în pragul iernii se realizează o răsărire timpurie și uniformă în primăvară (E. Păun, 1995). Se folosesc semănători universale, adaptate pentru semețe mici, la 62,5 cm între rânduri și la o adâncime cât se poate de mică (0,5 cm), folosindu-se circa 3 - 4 kg sămânță la hectar (V. Plugaru, 2000).

Lucrările de îngrijire. Se menține solul curat de buruieni și afănat prin prașile și pliviri, ori de câte ori este nevoie. Buruienile se pot combate cu erbicidele DMA-6 (1 l/ha), cu Furore (2 l/ha) sau Gallant (2 l/ha), pe vegetație, folosind 300 - 400 l apă la ha (V. Plugaru, 2000). Când plantele au 5 - 8 cm se face rădăria la 12 - 15 cm pe rând, pentru a realiza densitatea amintită.

În culturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. Momentul recoltării este între începutul înfloririi (A. Dumitrescu, 1986) și momentul în care se deschid majoritatea florilor, când conținutul de proazulene este maxim (E. Răcz-Kotilla, 1962, E. Coiciu, 1962 etc.). Se taie florile (*Millefolii flos*), de sub ultima ramificație a inflorescenței. Când se recoltează *Millefolii herba*, se taie maximum 20 cm din plantă (măsurat de la vârf în jos). Se pot face două recoltări pe an (ultima în septembrie). Recoltarea trebuie să se facă pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua, înainte de masă, între orele 10 - 14.

Culturile destinate producției de sămânță se recoltează în anul al doilea de vegetație, când majoritatea inflorescențelor au ajuns la maturitate. Plantele se taie cu secera sau cu coasa, se usucă, apoi se treieră.

Condiționarea. Înainte de uscare, se înlătură impuritățile din inflorescențe. Uscarea se poate face pe cale naturală, la umbră, în încăperi aerisite și curate, în strat subțire. Pe cale artificială, se usucă

la 33 - 35 °C. După uscare se păstrează la umbră în vrac sau ambalat în saci. Rândamentul la uscare este de 3,5 - 4:1.

Condițiile tehnice de recepție pentru *Millefolii flos*, prevăd ca florile să fie de culoare alb - crem, cu bractee verzi. Ca impurități se admit: maximum 5 % flori brunificate; corpuri străine organice, maximum 0,5 %, iar cele minerale, maximum 0,5 %, umiditatea, maximum 13 %.

Pentru *Millefolii herba*, lungimea tulpinii de la vârf trebuie să fie de maximum 20 cm; maximum 2 % plante cu flori brunificate și fructificații; corpuri străine organice, maximum 0,5 %, iar cele minerale, maximum 1 %; umiditatea, maximum 13 %.

Producția. Anual, producția la prima recoltare este de 600 - 700 kg/ha inflorescențe uscate (sau 1000 - 1500 kg/ha plante cu inflorescențe uscate), iar la a doua recoltare 300 - 350 kg/ha inflorescențe uscate (sau 500 - 700 kg/ha plante cu inflorescențe uscate).

În loturile semincere de coada șoricelului se obțin 200 - 300 de kg/ha achene.

4.25.3. PIRETRUL

(*Chrysanthemum cinerariifolium* [Trev] Vis.)

Fr: Pyréthre, Pyréthre de Dalmatie; E: Pyrethrum, Pellitory flower;

G: Dalmatiner Wucherblume, Insectenblume

4.25.3.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Piretrul (Piretrul de Dalmăția, Piretru, Floarea Raiului) plantă spontană pe coastele pietroase ale Dalmăției, în Albania, în Caucaz și în alte zone sudice, identificat ca foarte bun insecticid încă din secolul al XIX-lea, a fost luat în cultură de la începutul secolului al XX-lea (V. Velcan, 1965). În țara noastră este menționată cultivarea plantei în anul 1940 (A.S. Potlog, 1942).

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă o constituie florile (*Pyrethri flos*) în stare uscată. Conține piretrina I și piretrina II, cinerina I și cinerina II, esterii care se descompun, prin hidroliză în acizi carbonici și cetoalcooli ciclici (piretrolon și cinerolon). Preparatele cu conținut în piretrine nu se amestecă cu substanțe alcaline (var, săpun), pentru a preveni hidroliza.

Raportat la substanța uscată, conținutul în piretrine este de 0,5 - 1 % în capitule, 0,1 - 0,2 % în frunze și 0,05 - 0,1 % în tulpini (E. Coiciu și G. Răcz 1962, X. Chen și H. Li, 1995). Produsul mai conține ulei volatil (0,3 %), crizantemină (amestec de colină și stachidrină), etilene, alcooli, oleorezină, grăsimi etc. (F. Crăciun și colab., 1977). Piretrina I este de 2,5 ori mai toxică decât piretrina II. Cinerinele au acțiune asemănătoare cu a piretrinelor, însă au o toxicitate de 2 ori mai mică. (E. Coiciu, 1967). Piretrinele sunt insecticidele cele mai vechi însă se mențin actuale. Pentru om sunt de cca. 100 de ori mai puțin toxice decât parationul și de 12 ori mai puțin decât lindanul (A. Laza și G. Răcz, 1975). Piretrinele sunt foarte puțin toxice pentru animalele cu sânge cald (la contact sau ingerare, doza maximă de intoxicație acută pentru om fiind de 1,5 g/kg corp, iar pentru muște, doza mortală este de 17,6 mg/kg corp, cele mai sensibile fiind crustaceele, la 0,01 mg/kg) (E. Grigorescu și colab., 2001).

Utilizări. Pulberea de flori de piretru sau preparatele care conțin piretrine (extracte cu solvenți organici) au acțiune parazitică (la animale cu sânge rece și insecte), nevătămătoare pentru om și animale cu sânge cald. S-a folosit în combaterea paraziților intestinali și este un insecticid (de contact și ingestie) inofensiv pentru om. Se poate folosi în protejarea plantelor (legume, fructe) contra dăunătorilor, fără a fi dăunător consumatorilor. Este deci un pesticid nepoluant.

Răspândire. Piretrul este originar din Peninsula Balcanică (Dalmatia, țarmurile ilirice) unde crește spontan pe coastele pietroase. A fost descoperit în flora spontană de pe Coasta Dalmatiei (E. Păun, 1995). Renunțată în culturile de piretru sunt Japonia, Spania, Franța, fosta Iugoslavie și țări din centrul Africii (Tanzania, Kenya Ruwanda) (E. Grigorescu și colab., 2001). Sunt renumite culturile de piretru din Kenya. De asemenea, cantități însemnate de materie primă exportă fosta Iugoslavie, țara de origine a acestei plante (E. Coiciu, 1967). S-a introdus în cultură ca plantă care se poate folosi în scop insecticid și parțial cu utilizări medicinale. La noi în țară întâlnește condiții favorabile în zonele mai călduroase din sudul țării și Dobrogea.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Chrysanthemum cinerariifolium* (Trev) Vis, sin. *Pyrethrum cinerariifolium* Trev. (fig. 4.25.3. după F. Crăciun și colab., 1977 și 4.25.3.a.). Această specie are $2n = 18$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). În alte țări se cultivă încă 2 specii provenite din Caucaz: *Pyrethrum carneum* Bieb. (*Chrysanthemum carneum* Steud.) și *P. coccineum* (Wild) Worosch (*P. roseum* Bieb., *Chr. coccineum* Wild.), (E. Coiciu, 1967).




Fig. 4.25.3. *Chrysanthemum cinerariifolium* (Trev.) Vis.

La noi în țară din specia *Chrysanthemum cinerariifolium* (Trev) Vis, se cultivă soiul local (populația) "De Dobrogea" (din anul 1977).

Particularități biologice. Piretrul este o plantă perenă cu un rizom în sol (gros de cca. 1 cm), din care pornesc rădăcini adventive și tulpini aeriene. Tulpina are înălțimea de 30 - 70 cm, este cilindrică, păroasă, argintiu verzuie, striată, simplă sau ramificată, terminată cu inflorescențe. Frunzele sunt dispuse altern, cele bazale au lungimea de 8 - 10 cm și lățimea de 1,5 - 2 cm, iar cele superioare sunt mai înguste și scurt pețiolate. Sunt de 2 - 3 ori penat sectate, verzi lucioase pe partea superioară și păroase pe cea inferioară. Inflorescențele sunt capitule terminale (de 3,5 - 4 cm diametru) cu cca. 20 flori marginale ligulate femele, albe, de cca. 2 cm lungime, iar în interior numeroase flori tubulare, cu corola 5 - dințată, hermafrodite, de culoare gălbuie. Înflorește în mai - iulie. Fructul este o achenă mică (5mm lungime și 1 mm lățime), fără papus, cu MMB de cca. 1 g.

Cerințe față de climă și sol. Piretrul este o plantă iubitoare de căldură. Temperatura minimă de germinație este de 5 - 6 °C, plantele tinere suportând temperaturi de -5 °C (V. Velican, 1965). Pentru a ajunge la maturitate plantele au nevoie de mult soare. Cerințele față de apă nu sunt foarte mari, excesul de ploii este impropriu pentru o bună dezvoltare. Valorifică bine solurile calcaroase, însă destul de fertile, calde, profunde, drenate, cu expoziție sudică. Nu merge pe solurile prea grele care fac crustă, nici pe cele prea ușoare care nu mențin umiditatea.

Zonare. Piretrul întâlnește cele mai potrivite condiții de cultură în Dobrogea și Câmpia din sudul țării.

4.25.3.2. Tehnologia de cultivare

rotația. Piretrul se cultivă după prășitoare bine lucrate, cereale de toamnă și alte plante care eliberează terenul devreme. Cultura durează mai mulți ani, iar pe același teren poate reveni numai după 5 - 6 ani.

Pentru obținerea seminței se aleg parcelele cu plante tipice, bine dezvoltate, cu capitule mari și sănătoase.

Fertilizarea. La înființarea culturii se aplică 60 - 90 kg/ha P_2O_5 și 30 - 60 kg/ha K_2O (incorporate cu arătura) și 20 - 30 kg/ha N (primăvara) (E. Păun, 1995). Din anul doi se fertilizează cu 40 - 50 kg/ha N, 40 - 50 kg/ha P_2O_5 și circa 40 kg/ha K_2O , care se incorporează prin prașile.

Lucrările solului. Arătura se execută la adâncimea de 25 - 30 cm și se menține curată de buruieni prin lucrări cu discul cu grapă. Dacă se însămânțează direct în câmp, înainte de semănat terenul se tăvăluiește.

Sămânța și semănatul. Piretrul se poate înmulți prin semănat direct în câmp, prin răsăd sau prin despărțirea tufelor (E. Păun, 1995). Sămânța trebuie să aibă o puritate de 95 % (minimum 85 %), iar germinația 65 % (minimum 50 %).

Sămânțul direct în câmp se face în luna iulie (în situații extreme) și în pragul iernii (F. Crăciun și colab., 1977). Alți autori recomandă semănatul în pragul iernii (cu 10 - 12 zile înaintea înghețului), sau primăvara timpuriu (în zone cu precipitații sau în condiții de irigare) (E. Păun, 1995). Semănatul se face în rânduri la distanța de 62,5 cm și la 1 - 2 cm adâncime. Se folosesc 6 - 7 kg sămânță/ha amestecată cu 4 - 5 părți de material inert, pentru o distribuție mai uniformă.

Înmulțirea prin răsăd se practică în zone cu primăveri secetoase. Răsădul pentru un hectar se produce pe circa 150 m² straturi reci, însămânțate vara cu circa 400 g sămânță (4 - 5 g/m²), la circa 0,5 cm adâncime. Plantarea se face la sfârșitul lunii august (în zone ceva mai reci), până cel mai târziu la începutul lunii septembrie (în zone sudice), iar în anii secetoși în primăvara anului următor (cât mai devreme posibil), la 70 cm între rânduri și 30 cm pe rând (M. Verzea, 1988), punându-se 2 - 3 fire într-un cuib (F. Crăciun și colab., 1977).

La despărțirea tufelor, distanțele de plantare sunt ca și la plantarea răsădului.

Lucrările de îngrijire. Se fac prașile și pliviri pentru a menține terenul curat de buruieni și afânat. Combaterea buruienilor se poate face cu erbicidele Afalon (4 - 5 kg/ha), Maloran (4 - 5 kg/ha) sau Mercazin (5 - 6 kg/ha), aplicate imediat după semănat (E. Păun, 1995). După răsărirea completă a culturii se face răritul. Unde este cazul, se face completarea golurilor atât la culturile semănate cât și la cele plantate. Toamna se execută o acoperire a rândurilor cu rărita, pentru a proteja plantele de îngheț. Primăvara, se înlătură resturile culturii din anul precedent.

În culturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice, cu capitule mici și cele bolnave.

Recoltarea. Florile acestei plante se recoltează începând din anul al II-lea de cultură (M. Verzea, 1988), dar cele mai ridicate producții se obțin în anii III - V (F. Crăciun și colab., 1977). Se

recoltează inflorescențele când cca. jumătate din florile ligulate s-au deschis și încă nu au luat poziție orizontală. Dacă se recoltează mai devreme, producția este mai redusă, iar dacă se întârzie, scade conținutul în piretină. S-a constatat că dacă toate florile s-au deschis, conținutul de piretină în florile uscate s-a redus de la 0,72 % la 0,6 %, însă n-a scăzut producția totală, deoarece a sporit masa inflorescențelor (E. Coiciu și G. Rácz, 1962). Se recomandă ca recoltarea să se facă pe timp frumos, înainte de masă, succesiv, pe măsură ce inflorescențele ajung în faza optimă de cules. Inflorescențele se culeg cu mâna sau cu recoltator (piepten) similar cu cel de la recoltatul inflorescențelor de mușețel.

Culturile semincere se recoltează la începutul maturizării depline, dimineața, pentru a reduce pierderile prin scuturare. Plantele se cosesc, iar după uscare pe platforme se treieră și semințele se selectează.

Condiționarea. După recoltare, produsul se usucă în condiții naturale sub acoperiș sau la soare (noaptea și în caz de ploaie se adăpostește sub acoperiș). Temperatura de uscare nu trebuie să treacă de 30 °C, deoarece piretrinele se inactivează. Randalmentul la uscare este de 3,5 - 4,5 : 1.

Condițiile de recepție admit ca impurități: maximum 2,5 % flori brunificate, maximum 1,5 % frunze, tulpini, fructificații, maximum 5 % pedunculi mai lungi de 2 cm; corpuri străine organice și minerale nu se admit, iar umiditatea, maximum 12 %.

Producția de inflorescențe proaspete este în medie de 17 - 32 q/ha, dar se pot obține 45 - 60 q/ha sau chiar mai mult (M. Verzea, 1988). Producția de flori uscate este de 5 - 8 q/ha, putându-se ajunge la 15 - 18 q/ha.

În loturile semincere de piretru se obțin 200 - 500 kg/ha achene.

4.25.4. PELINUL

(*Artemisia absinthium* L.)

Fr: Absinthe; E: Absinth, Wormwood; G: Wermuth

4.25.4.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Pelinul (Pelinul alb, Pelinul bun), este cunoscut din antichitate, fiind descris în Papirusul Ebrs (1550 î.e.n.), în literatura greacă și romană (H.P. Dörfler și G. Roselt, 1984). Uleiul volatil din pelin a fost extras de prin secolul al XVI-lea (V. Cucu și colab., 1982). Numele genului derivă de la numele zeiței *Artemis* (Diana) la grecii antici (E. I. Nyárády, 1964).

Materia primă și compoziția chimică. Pelinul (pelinul alb, pelinul bun) este cultivat pentru partea aeriană (*Absinthii herba*). Produsul vegetal conține ulei volatil (0,2 - 1,5 %), principii amare (0,15 - 0,4), derivați flavonici, acizi polifenol carboxilici, compuși poliacetilenici, peroxizi ai unor homoditerpene (U. Stănescu și colab., 2004, K. Marteza-Semnai și M. Akbarzadeh, 2005).

Partea aeriană a pelinului (*Absinthii herba*) conține ulei volatil, mai bogate fiind frunzele și vârfurile înflorite. În frunze, conținutul ajunge la 1,71 %, în vârfurile înflorite 1,68 %, pe când în tulpină se găsesc doar urme (0,05 %) (V. Cucu și colab., 1982, E. Lemberkovics și colab., 1982 etc.). *Absinthii herba* (vârfurile înflorite) constituie o bună sursă de azulenă (E. Coiciu, 1967). Uleiul volatil conține tujonă (amestec de α și β - tujonă și izotujone), diferiți alcooli terpenici, hidrocarburi terpenice (felandren, α -pinen, β -pinen, mircen, azulene etc.). S-a constatat că azulenele nu preexistă în plantă și că ele provin din prochamazulene (sesquiterpene de tip guaianolidic, cum este artabsina) în timpul extragerii uleiului. Tujona este însoțită de alcool tujilic, în raporturi diferite în funcție de organul plantei și faza de vegetație.

Gustul amar este imprimat de diferite lactone sesquiterpenice (dimerii guaianolitici etc.) și alți compuși. Dintre lactonele sesquiterpenice mai importante sunt absintina, artabina, artabsina, matricina etc.

Utilizări. Guaianolidele (care imprimă gustul amar), dau acțiunea eupeptică, tujona, cea toxică, iar azulenele, cea antiinflamatoare.

Este folosită ca tonic amar, stomahic și vermifug. Se recomandă în inapetență, în boli ale aparatului digestiv și constipații.

Are acțiune antiinflamatoare a mucoasei gastrointestinale. Se administrează ca infuzie, tinctură sau vin tonic. Nu se recomandă femeilor gravide și celor care alăptează, deoarece dă gust amar, neplăcut, laptelui (copiii nu îl mai sug). Fiind excitant nervos, nu se recomandă persoanelor cu afecțiuni neuroase. Intră în compoziția **Ceaiului tonic aperitiv**. Se folosește și în industria alimentară, la prepararea unor băuturi amare (vermurilor), însă prin consumarea lor îndelungată dau fenomene toxice (tulburări psihice, insomnii, convulsii, greață etc.). În unele țări (Franța, Belgia, Elveția, Germania), s-a interzis fabricarea băuturilor cu conținut de pelin. Pelinul constituie o sursă importantă în obținerea pe scară industrială a uleiului volatil cu azulene.

Răspândire. Pelinul este răspândit în zone mai aride din flora spontană a Europei, Asiei, Nordului Africii și Americii de Nord. Se cultivă în unele state europene și din America de Nord. Produsul vegetal este furnizat de țările fostei Uniuni Sovietice și fostei Iugoslavii, Bulgaria, Ungaria, Polonia. În țara noastră, este o plantă caracteristică în zonele din sud, însorite și calde (pe coline și dealuri), unde întâlnește și condițiile cele mai bune de cultură.

Sistematică. Soluri. Specia cultivată este *Artemisia absinthium* L. (fig. 4.25.4. după Flora României, vol IX, 1964 și 4.25.4.a., original). Specia are $2n = 18$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). Din genul *Artemisia* se mai cultivă *A. dracunculoides* L. (tarhon), *A. abrotanum* L. (lemnul domnului), care sunt prezentate separat, în continuare. Se mai întâlnește spontan *A. vulgaris* L. (pelinăria sau pelinul negru) de la care se recoltează (uneori) în scop medicinal (limitat) părțile aeriene, în perioada înfloririi (*Artemisiae herba*) și rădăcinile, având proprietăți tonic amare, eupeptice etc. *Artemisiae herba* conține 0,1 - 0,61 % ulei volatil, având component principal cineolul (până la 35 %) (E. Coicui, 1967). În unele țări, se folosește în medicina populară, în boli de femei (amenoree, dismenoree), micșorează durerile și grăbește nașterile, precum și calmant în afecțiuni neuroase (neurastenii, epilepsie). Este citată și cu efecte contra cancerului (E. Coicui, 1967). Un studiu farmacognostic comparativ între *A. absinthium* L. și *A. vulgaris* L. a fost efectuat de E. Constantinescu și colab., 1963. Dintre speciile din genul *Artemisia*, E. Coicui, 1967 citează ca sursă xantonina speciile: *A. cina* Berg, originară din Asia mijlocie, crește spontan în Kazacstanul de sud și este introdusă în cultură; *A. transiliensis* Poljak (Kazacstan) sau *A. szovisiana* Bess (Transcaucazia).



Fig. 4.25.4. *Artemisia absinthium* L.
a - frunze de rozetă, b - inflorescență, c - floare

Ca sursă de xantonimă, în Bulgaria și Cehoslovacia, este folosită *A. maritima*, în Italia *A. coerulescens* L. etc. Mai poate fi amintit pelinul nemirosor (*Artemisia campestris* L.), ca sursă indigenă de ulei volatil, din acest gen, este menționată și specia *Artemisia annua* L. (tămăioară, năfurică, măturiică mirositoare), cunoscută ca plantă ruderală sau cultivată prin grădinile țărănești (H. Popescu și colab., 1980).

Din specia *Artemia absinthium* L. la noi în țară, se cultivă soiul local (populația "De Tulcea", din anul 1976).

Particularități biologice. Pelinul este o plantă perenă, cu un rizom în sol din care se dezvoltă tulpini scurte, sterile și tulpini florifere înalte. Tulpinile florifere sunt erecte, înalte de circa 1 m (1,5 m), lignificate la bază. Frunzele bazale de la tulpinile sterile sunt pețiolate, tripenat - sectate, iar a celor florifere sunt sesile simplificându-se spre vârf (la bază bipenatsectate, iar spre vârf sunt trilobate). Frunzele sunt păroase, verzui - cenușii pe față și argintiu - cenușiu pe dos. Florile sunt dispuse în capitule, (antodii) globuloase, mici (circa 4 mm în diametru) aplecate în jos, situate pe ramificațiile din vârful tulpinii (racem terminal). Pe receptaculul convex, la exterior sunt flori femele (tubuloase) și hermafrodite spre centru (corolă campanulată cu 5 lobi). Înflorirea are loc din iulie în septembrie. Fructele sunt achene mici (1,5 mm lungime și 0,3 mm lățime), de culoare brun - deschisă cu MMB de cca 0,08 g.

Cerințe față de climă și sol. Pelinul este o plantă cu cerințe ridicate față de lumină și căldură. Are transpirația redusă (datorită perozității), prezentând o bună rezistență la secetă. Zonele bine însorite cu temperaturi mai ridicate favorizează acumularea uleiului volatil. Zonele mai înalte influențează negativ formarea uleiului volatil. Are cerințe foarte reduse față de sol. Se poate cultiva pe toate tipurile de sol. Poate valorifica soluri nepotrivite pentru alte plante, cum sunt cele pietroase, aride.

Zonare. Se recomandă cultivarea în Câmpia Olteniei, Subcarpații meridionali, Câmpia Burnazului, Câmpia Dobrogei, Sudul Moldovei și Câmpia Crișurilor (E. Păun și colab., 1983).

4.25.4.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Pelinul se amplacează în afara asolamentului, fiind plantă perenă. Se cultivă după prășitoare timpurii bine întreținute și după leguminoase. Pe același teren poate reveni numai după 6 - 7 ani.

Pentru obținerea semințelor se aleg parcelele cu plante tipice, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea. La înființarea culturii se aplică 90 - 100 kg/ha P_2O_5 și 40 - 60 kg/ha K_2O (sub arătură) și 90 - 100 kg/ha N (primăvara devreme) (M. Mircea, 1986). Doze similare se recomandă și în anii următori de cultură.

Lucrările solului. Arătura se execută la 25 - 30 cm adâncime și se menține curată de buruieni, prin lucrări cu discul urmat de grapă, urmărindu-se și conservarea umidității. Patul germinativ trebuie să fie bune pregătit, folosindu-se în acest scop combinatorul. În prezua semănatului se trece cu tăvălugul inelar (limitând adâncimea de semănat).

Sămânța și semănatul. Pelinul se înmulțește prin semănat direct în câmp (E. Păun, 1995). Sămânța de pelin este foarte mică (MMB de 0,08 g). Trebuie să aibă puritatea de 70 % (minimum 50 %), iar germinația de 65 % (minimum 50 %).

Semănatul se face cu semănători universale (SUP-21, SUP-29) prevăzute cu distribuitori speciali și limitatori de adâncime. Epoca de semănat este în pragul iernii, răsarirea având loc primăvara. Densitatea trebuie să fie de 50 - 60 plante la m^2 (M. Mircea, 1986). Se seamănă la 62,5 cm între rânduri și la adâncimea de circa 0,5 cm (E. Păun, 1995). Cantitatea de sămânță la ha este de 2 - 3 kg, amestecată cu material inert (în raport de circa 1 : 5) și cu sămânță de plantă indicatoare (circa 50 - 60 g sămânță de salată).

Lucrările de îngrijire. După răsarirea plantei indicatoare se prășește printre rânduri. În continuare se menține solul curat de buruieni și afănat prin prașile și pliviri, ori de câte ori este nevoie. Din anul doi de cultură, primăvara, se taie și se îndepărtează tulpinile uscate.

În culturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave.

Recoltarea. În flora spontană, pentru extragerea de ulei volatil, recoltarea se face la începutul înfloriturii (iunie - iulie), iar când se urmărește ca masa vegetativă să aibă conținut mai ridicat de substanțe amare se recoltează la înflorirea deplină (iulie - august) (F. Crăciun și colab., 1977). În cultură, se recomandă recoltarea plantelor în cazul folosirii pentru distilare, când 50 - 70 % din plante sunt înflorite, iar pentru uscare la începutul înfloririi (A. Dumitrescu, 1986).

Recoltarea se face pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua, tăindu-se plantele manual (cu secera), sau mecanic (cu cositori) la cca. 20 cm de la sol. Zilnic se recoltează cât se poate distila sau usca.

Culturile semincere se recoltează când majoritatea fructelor au ajuns la maturitate, prin tăierea plantelor cu secera, urmând ca după uscarea lor să se treiere.

Condiționarea. După recoltare, din herba, se îndepărtează tulpinile lignificate și frunzele îngălbenite sau uscate. Uscarea se face pe cale naturală la umbră în încăperi curate și aerisite, în strat subțire, întorcându-se până la completa uscare. În cazul uscării artificiale, nu se depășește temperatura de 35 °C. Rândamentul la uscare este de 3 - 4:1.

Condițiile tehnice de recepție pentru produsul proaspăt prevăd ca acesta să fie format din vârfuri florale la începutul înfloririi. Ca impurități se admit: maximum 2 % frunze îngălbenite, maximum 2 % tulpini mai groase de 3 mm și maximum 1 % tulpini fără frunze și flori. Corpuri străine organice se admit: maximum 0,1 %, iar cele minerale, maximum 0,25 %. Conținutul de ulei volatil trebuie să fie de minimum 0,1 %, iar umiditatea normală a produsului proaspăt recoltat, fără urme de apă.

Pentru produsul uscat se cer aceleași limite pentru impurități: corpuri străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 1 %, iar umiditatea maximum 13 %.

Producția de materie primă vegetală care se obține anual la ha, este de 16 - 20 tone în stare proaspătă, sau 5 - 6 tone produs uscat. În loturile semincere de pelin se obțin circa 200 kg/ha achene.

4.25.5. LEMNUL-DOMNULUI (*Artemisia abrotanum* L.)

Fr: L'aurone; E: Southern wood; G: Eberante

4.25.5.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Lemnul Domnului (Lămâița) este cunoscută ca plantă medicinală din antichitate de romani și greci (A. Radu și colab., 1973).

Materia primă și compoziția chimică. Planta se cultivă pentru partea aeriană (*Abrotani herba*) în stare proaspătă sau uscată.

Produsul vegetal conține substanțe flavonoide, acizi polifenol - carboxilici, cumarine etc. (E. Grigorescu și colab., 2001), precum și ulei volatil (1 - 2 %), în care s-au identificat 29 de componente, principalul fiind eucaliptolul (A. Radu și colab., 1973); taninuri și un

alcaloid, cristalizabil, toxic (F. Crăciun și colab., 1977). S-a constatat că uleiul volatil din această plantă are acțiune antibacteriană și antimicotică (M. Tămaș și colab., 1975).

Utilizări. Produsul se recomandă în afecțiuni hepato - biliare, ca vermifug, stomahic, diuretic, emenagog, coleretic etc. În medicina empirică se folosește în bolile de stomac și ca vermifug. Este cunoscută la țară ca plantă de ornament sau de cult.

Răspândire. Este originară din Europa sudică și Orient, fiind răspândită azi în Asia, Europa și America de Nord (A. Radu și colab., 1973). Specia este des întâlnită în sudul și centrul Europei și vestul Asiei (E. Păun, 1995). A fost luată în cultură și în țara noastră, ca plantă ornamentală și ca planta aromată (miros asemănător cu cel de lămâie).

Sistematică. Soluri. Specia cultivată este *Artemisia abrotanum* L. (fig. 4.25.5., după Flora României, vol. IX, 1964 și 4.25.5.a., original).

La noi în țară se cultivă, din această specie soiul local (populația "De Videle", din anul 1977).

Particularități biologice. *Artemisia abrotanum* L. este un subarbut vivace. Rădăcina este pivotantă, cu ramificații. Tulpina este erectă cu înălțimea cuprinsă între 0,4 - 1 m și ramificată. Frunzele sunt de două ori penatsectate, cu lăcinii înguste (lineare). Florile sunt dispuse în capitule (antodii) mici, aproape globuloase, pedicelate, nutante, așezate în raceme.

Cerințele față de climă și sol, precum și **zonele de cultură** sunt similare cu ale speciei *A. apshinimum* L. (pelin).

4.25.5.2. Tehnologia de cultivare

Amplasarea culturii, lucrările solului și fertilizarea acestei specii sunt apropiate cu ale pelinului (*A. absinthium* L.), tehnica de cultură fiind încă în studiu.

Studii privind valorificarea și introducerea în cultură a speciei *A. abrotanum* L., s-au întreprins la Cluj-Napoca (M. Tămaș și colab., 1975, L.S. Muntean, 1990 etc.) și la SCPMA Fundulea (E. Scoreico și R. Stoianov, 1993, E. Păun, 1995) etc.

Înmulțirea. Deoarece înmulțirea generativă nu a dat rezultate concludente, se preconizează cultivarea acestei plante pe cale vegetativă. În tabelul 4.25.5.1. (după E. Scoreico și R. Stoianov, 1993), prezentăm variantele experimentale privind înmulțirea vegetativă a speciei *Artemisia absinthium* L..

Cea mai bună metodă de realizare a materialului de înmulțire a fost prin butași ierboși cu baza lignificată. Plantarea butașilor în câmp în anul următor a asigurat producții de 30 q/ha iarbă uscată, iar în anul doi cu 20 - 77 % mai mare. Producția cea mai ridicată de iarbă uscată s-a înregistrat în anul al II-lea de vegetație la varianta „butași semilemnoși” (51,5 q/ha), care depășește cu 46 % cultura de aceeași vârstă realizată prin despărțirea de tufă (E. Scoreico și R. Stoianov, 1993).

Tabelul 4.25.5.1.
Variantele experimentale privind înmulțirea vegetativă a
speciei *Artemisia abrotanum* L.

Varianta	Specificare	Coeșicientul de înmulțire
Despărțire de tufă	Despărțirea tufelor mature în vârstă de peste 3 ani, fiecare parte având sistem radicular propriu	8-12
Mușuroirea tufelor	Se mușuroiesc tufele mature după recoltare; primăvara următoare din tufele mușuroite se desfac fragmente cu sistem radicular propriu	8-20
Butași -lemnoși -ierboși -semilemnoși	Primăvara, după pomirea în vegetație, prin fragmentarea ramurilor la 8-10 cm lungime și înrădăcinare în nisip, în tocuri de răsădnite protejate inițial cu ramc și folie de polietilenă - ramuri lemnoase de 2 ani - ramuri ierboase de 1 an - butași ierboși cu baza lignificată	peste 200
Ramuri înrădăcinate	- lungimea ramurilor, 25-30 cm; înrădăcinare în sol	20-80

Este recomandabilă înmulțirea acestei specii prin îndepărtarea tufelor bătrâne sau, mai bine, prin înrădăcinarea butașilor. Butașii se recoltează primăvara (cu 5 - 6 noduri), se înrădăcinează în nisip (1/2 se introduc în nisip) sau amestec de nisip - mranită - pământ (în proporții egale), iar toamna (octombrie) sau primăvara timpuriu, se plantează la 70/50 cm (E. Păun, 1995).

Lucrările de îngrijire. Cultura se menține curată de buruieni prin prașile și pliviri de câte ori este nevoie.

Recoltarea materiei prime pentru produsul proaspăt, se face în faza de vârfuri florale cu butoni floriferi, iar pentru cel în stare uscată, în faza de flori ajunse la maturitate.

Condiționarea este similară cu cea de al pelin (*A. absinthium* L.). Produsul se usucă la umbră sau artificial la 35 °C

Condițiile tehnice de recepție prevăd pentru produsul proaspăt, ca impurități: maximum 2 % frunze îngălbenite și maximum 2 % tulpini mai groase decât 2 mm; corpuri străine organice, maximum



Fig. 4.25.5. *Artemisia abrotanum* L.
a - racem cu inflorescențe

0,1 %; cele minerale, maximum 0,25 %, iar umiditatea normală a produsului la recoltare, fără urme de apă.

La produsul uscat se admit ca impurități: maximum 2 % frunze brunificate sau îngălbentite, maximum 2 % tulpini mai groase de 2 mm, maximum 1 % tulpini fără frunze și flori; corpuri străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 1 %, iar umiditatea, maximum 13 %.

Producția. În funcție de sistemul de cultură și anul de vegetație se pot obține 3 - 5 t/ha herba uscată.

4.25.6. TARHONUL (*Artemisia dracunculus* L.)

Fr: Estragon; E: Tarragon; G: Estragon

4.25.6.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Tarhonul a fost cunoscut și utilizat din vechime în zonele de origine, Asia (Siberia). A fost adus în Europa (Germania, Elveția etc.) prin sec. al XVI-lea, în zilele noastre fiind cunoscut în țări de pe toate continentele.

Materia primă și compoziția chimică. Tarhonul se cultivă pentru partea aeriană (*Dracunculi herba*) în stare proaspătă sau uscată.

Dracunculi herba conține ulei volatili (0,4 - 1 %), bogat (60 - 75 %) în esdregol (metilchavicol), cumarine, flavonozide, alcaloizi (0,08 %), glicozizi cardiotonici (E. Coiciu, 1967, A. Margina și V. Zhelezeev, 1996, E. Grigorescu și colab., 2001 etc.).

Utilizări. Produsul vegetal (herba) se folosește în mod empiric ca stimulent al secrețiilor gastrice, în afecțiuni hepatice și renale etc. Are utilizări în industria alimentară, în scop condimentar, ca salată verde etc. Uleiul volatil extras din iarba proaspătă sau uscată se utilizează în industria parfumurilor.

Răspândire. Tarhonul este originar din Asia (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Se cultivă ca plantă condimentară (legună), medicinală (limitat), și pentru industria parfumurilor, în diverse țări.

Sistematică. Soiri. Specia cultivată este *Artemisia dracunculus* L. (fig. 4.25.6., după Flora României, vol. IX, 1964 și 4.25.6.a., original).




Fig. 4.25.6. *Artemisia dracunculus* L.
a - inflorescența

La noi în țară, din specia *Artemisia dracunculul* L. se cultivă soiul local (populația) "De Ilfov" (din anul 1976) și soiurile: Armonia (din anul 2001) și Artemis (din anul 2001).

Particularități biologice. Tarhonul este o plantă perenă, prevăzută în sol cu stoloni și un sistem radicular bine dezvoltat. Tulpina este erectă, ramificată, cu înălțimea de până la 1,5 m. Frunzele sunt dispuse altern, au formă liniar - lanceolată și lungimea până la 10 cm. Florile au culoarea alb - verzuie și sunt dispuse în capitule (antodii) globuloase care atârnă în jos, cu diametrul de cca 3 mm situate în raceme spre vârful ramurilor. Capitulele au flori marginale femele, iar cele interioare sunt hermafrodite. Înfloarește din iulie până în septembrie - octombrie. Fructele sunt achene fără papus, alungit - obovate, de culoare brun închisă, mici (1 - 2 mm lungime), cu MMB de cca. 0,2 g.

Cerințele față de climă și sol. Este plantă pretențioasă față de lumină și căldură. În timpul verii, lumina puternică și temperaturile ridicate sporesc conținutul în ulei. În timpul iernii, dacă există zăpadă pe sol, rezistă până la -20 °C. Pretinde soluri fertile, structurate, drenate, cu condiții bune de umiditate și bine lucrate.

Zonare. Cele mai potrivite condiții de cultură pentru tarhon, se întâlnesc în zonele legumicole din sudul țării (F. Crăciun și colab., 1977), precum și în Transilvania (S. Radu, 2000)

4.25.6.2. Tehnologia de cultivare

Rotafția. Tarhonul se cultivă după leguminoase, cereale păioase și prășitoare bine întreținute, pe același teren putând reveni numai după 8 - 10 ani. Cultura durează circa 5 - 6 ani sau chiar mai mult (E. Păun, 1995).

Fertilizarea. La înființarea culturii se aplică 40 - 50 t/ha gunoi de grajd sau 50 - 60 kg/ha P_2O_5 și 20 - 30 kg/ha K_2O (sub arătură) și 60 - 70 kg/ha N (primăvara). În anii următori se aplică îngrășămintele chimice în doze similare (S. Radu, 2000).

Lucrările solului. Arătura de bază se face la 25 - 30 cm adâncime, imediat după eliberarea terenului de către planta premergătoare, iar patul germinativ se pregătește cu combinatorul înainte de plantat sau semănat.

Înmulțirea. Tarhonul se poate înmulți vegetativ (prin despărțirea tufelor, sau prin butași înrădăcinați) și prin sămânță, folosind răsad, sau semănat direct în câmp (E. Păun, 1995).

Înmulțirea prin desfacerea tufelor tipice, viguroase, sănătoase (dintr-o tufă putându-se obține 10 - 15 porțiuni cu rădăcini și lăstari

aerieni) este o metodă sigură. Plantarea porțiunilor de tufă se face primăvara devreme, asigurând 5 - 6 plante/ m^2 , la 60 cm între rânduri și 30 cm pe rând (S. Male, 1986; S. Radu, 2000).

Înmulțirea prin butași înrădăcinați. Butașii de tulpină trebuie să aibă 4 - 5 noduri, iar după înrădăcinare (în strat), se plantează la 50 - 60 cm între rânduri și 25 - 30 cm pe rând (E. Păun, 1995).

La înmulțirea prin răsad, pentru 1 ha sunt necesari 80 - 100 m^2 straturi reci, însămânțate în mai, cu circa 300 g sămânță. Răsadul se plantează în 20 VII - 10 VIII, la 50 - 60 cm între rânduri și 25 cm pe rând (F. Crăciun și colab., 1977).

Semănatul direct în câmp se face în perioada 1 - 10 aprilie, cu semănători universale adaptate pentru semințe mici, la 50 - 60 cm între rânduri și 0,3 - 0,5 cm adâncime, folosindu-se 2,5 - 3 kg sămânță la hectar, amestecată cu 3 - 4 părți material inert și o plantă indicatoare: circa 50 - 60 g sămânță de salată.

Lucrările de îngrijire. Solul se menține curat de buruieni și afănat prin prașile și pliviri. Pentru combaterea buruienilor se pot folosi erbicidele Kerb (3 kg/ha), înainte de plantare, iar pe vegetație Fusilade (2 l/ha) sau Furor (2 l/ha), când buruienile monocotiledonate au 4 - 6 frunze (S. Radu, 2000). Răritul - la culturile semănate - se face la 25 cm între plante (când acesta au 3 - 5 cm înălțime). În condiții de secetă se fac 1 - 2 udări, cu circa 500 m^3 apă la ha pentru fiecare. Toamna se taie tufele la 7 - 9 cm de la colet, iar la venirea primului îngheț se acoperă cu paie sau frunze (7 - 10 cm grosime). Rugina se combate prin 2 - 3 tratamente cu Dithane M 45 (2 kg/ha), Plantavax 20 EC (2 kg/ha) sau Bayleton (1 kg/ha) (S. Male, 1986, S. Radu, 2000).

Recoltarea. Herba de tarhon se recoltează la înflorirea deplină, în cazul în care se folosește pentru extragerea uleiului volatil. În scop condimentar, se recoltează ceva mai devreme (înainte de înflorire). Din anul al doilea de cultură se pot obține două recolte pe an. Recoltarea se face prin tăierea plantelor manual (cu seceră) sau mecanizat (cu cositori), pe timp frumos, tăindu-se zilnic numai cantitatea care se poate prelucra în 24 de ore. Pentru obținerea uleiului volatil, produsul se livrează în mod obișnuit în stare proaspătă, recoltat cu maximum 10 cm sub ultima ramificație.

Condiționarea. Se înlătură impuritățile din produs, iar dacă e cazul se usucă la umbră în încăperi amenajate, sau artificial la 35 °C. Randamentul la uscare este de 3,5 - 4%.

Condițiile tehnice de recepție pentru materia primă în stare proaspătă admite ca impurități: maximum 3 % plante decolorate;

corpuri străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 0,2 %, iar umiditatea normală a produsului proaspăt recoltat, fără urme de apă.

În cazul produsului uscat (randamentul la uscare este de 3,5 - 4.1), plantele trebuie să fie tăiate tot la 10 cm sub ultima ramificație. Ca impurități se admit: maximum 3 % plante decolorate sau brunificate; corpuri străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 1 %, iar umiditatea maximum 14 %.

Producția medie anuală este 80 - 120 q/ha herba de tarhon în stare proaspătă (20 - 30 q/ha herba uscată).

4.25.7. SCHINELUL (*Cnicus benedictus* L.)

Fr: Chardon marie, Chardon béni; E: Blessed thistle, Benedikta;
G: Benedikterkraut, Benedicktinerkraut

4.25.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă vegetală este formată din partea aeriană a plantei (*Cardui benedicti herba*, *Cnici herba*).

Produsul vegetal (partea aeriană a plantei) conține substanțe amare, flavonozide, acizi grași, triterpene, taninuri, mucilagi, vitamina B₁, săruri de potasiu și magneziu etc. (U. Stănescu și colab., 2004). Dintre substanțele amare amintim cnichina și benedictina. Produsul conține un ulei volatil și compuși polimerici cu proprietăți bacteriostatice și antifungice (E. Grigorescu și colab., 2001, E. Toth și E. Nemeth, 2002). În condițiile de la Cluj, herba a avut 0,55 % derivați fenil propanici (exprimați în acid cafeic) și 0,045 % flavone totale (exprimate în rutozid) (L.S. Muntean și colab., 1994/95).

Utilizări. Schinelul este folosit din timpuri vechi ca tonic amar, în boli hepatice, ca depurativ, febrifug, arsuri de stomac, ulceratii etc. Se folosește în industria alimentară la fabricarea băuturilor aperitive. Principii amari produc o secreție înceată și de lungă durată a sucului gastric, măbind pofta de mâncare. A fost recomandat și în bolile stomacului, ficatului, căilor respiratorii etc. Extractele în doze mari pot produce greață și vomă. Nu se recomandă bolnavilor cu afecțiuni renale.

Răspândire. Schinelul crește spontan în zona mediteraneană și sud vestul Asiei, iar prin cultivare s-a răspândit în diverse țări (E. Păun, 1995). S-a luat în cultură ca plantă medicinală și la noi în țară, pentru a asigura necesarul de materie primă vegetală.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Cnicus benedictus* L. (fig. 4.25.7., după Flora României, vol. IX, 1964 și 4.25.7.a., original). Specia are $2n = 22$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). Numele genului derivă de la grecescul *knizein* = a *vătăma*, a scărpina, cu referire la frunzele sale pungente (E.I. Nyárády, 1964).

La noi în țară din specia *Cnicus benedictus* L. se cultivă soiul local (populația) "De Brânceni" din anul 1975.

Particularități biologice. Schinelul este plantă anuală. Are rădăcina fusiformă de 8 - 12 cm, prevăzută cu ramificații fibroase. Tulpina este înaltă până la 100 cm, grosime până la 1 cm, 5 - muchiată, simplă sau ramificată, de culoare verzuie sau roșie brună, prevăzută cu peri lănoși. Frunzele alterne, lanceolate, cele inferioare cu pețiol truncchiat, cele superioare sesile. Au lungimea de 5 - 30 cm, lățimea de 1,5 - 7 cm, nervuri proeminente, sinuat - dințate, cu dinți tepoși, acoperiți cu peri lănoși. Florile sunt tubuloase, galbene, grupate în capitule (antodii) terminale, solitare (la vârful ramurilor) ovoidale (diametrul de cca. 3 cm), înconjurat de frunze sesile și bractee mari, terminate cu spini. Înflorește din iunie în august. Fructele sunt achene cilindrice, costate, de 7 mm lungime și 2 - 2,5 mm grosime, prevăzute cu papus. MMB cca 30 - 35 g. Sistemul secretor la această plantă se compune din canale secretoare schizogene și diferite feluri de peri glandulari. Perii glandulari de pe corolă și papus se compun din 20 - 24 celule, fiind diferiți de cei de pe alte organe (Sz. Lassanyi, 1983).

Cerințele față de climă și sol. Nu are cerințe termice deosebite, însă pretinde locuri însorite. Are cerințe moderate față de umiditate. Nu suportă condiții secetoase o perioadă mai lungă de timp. Crește pe diverse tipuri de soluri. Cele mai bune producții de herba se obțin pe soluri profunde, fertile, bogate în calciu, drenate, însă cu o umiditate bună.

Zonare. Se recomandă cultivarea schinelului în zona colinară din județele Prahova și Buzău (S. Male, 1986).

4.25.7.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Schinelul se poate cultiva după leguminoase, cereale de toamnă sau prășitoare îngrișate cu gunoi de grajd și bine întreținute (E. Păun, 1995). Pe același teren poate reveni numai după 5 - 6 ani.

Pentru obținerea semințelor se aleg parcelele cu plante viguroase, bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea se face cu 50 - 70 kg/ha P_2O_5 și 30 - 40 kg/ha K_2O , aplicate toamna fiind încorporate cu arătura și 60 - 70 kg/ha N, încorporat primăvara la pregătirea patului germinativ (S. Male, 1986, S. Radu, 2000).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 25 - 30 cm adâncime, după eliberarea terenului de către planta premergătoare și se menține curată de buruieni prin lucrări cu discul în agregat cu grapa. Patul germinativ se pregătește cu discul urmat de grapă sau combinator.

Sămânța și semănatul. Schinelul se înmulțește prin semănat direct în câmp. Pentru semănat se folosește sămânță cu puritatea de 90 % (minimum 80 %), germinația de 75 %, iar pentru a-i mări friabilitatea i se înlătură papusul (prin frecare). Semănatul se face cu semănătorile pentru cereale, primăvara devreme (în zonele cu primăveri secetoase și scurte, se seamănă în pragul iernii), asigurând densitatea de 35 - 40 plante/ m^2 , la 50 cm între rânduri și 2,5 - 3 cm adâncime, folosind 10 - 12 kg sămânță la ha (F. Crăciun și colab., 1977, S. Male, 1986).

Studiile întreprinse de S. Male la SCPMA Fundulea cu populația De Brânceni, au dovedit mai bune distanțele de 50 cm și 37,5 cm între rânduri și 10 kg sămânță la ha pentru producția de herba (tabelele 4.25.7.1. și 4.25.7.2. după S. Male, 1987) și pentru producția de sămânță (tabelele 4.25.7.3. și 4.25.7.4., după S. Male, 1987).

La Cluj-Napoca s-au obținut rezultate bune cu 20 plante/ m^2 , la 50 cm între rânduri și 10 cm pe rând sau 20 cm pe rând cu două plante la cuib (tabelul 4.25.7.5., după L.S. Muntean și colab., 1994/95). Plantele au o bună capacitate de autoreglare. Pe suprafețe mici se poate semăna în cuiburi la 40/40 cm, necesitând circa 6 kg sămânță/ha.




Fig. 4.25.7. *Cnicus benedictus* L.
a - fruct

Tabelul 4.25.7.1.

Influența distanței de semănat asupra producției de herba uscată la

Cnicus benedictus L. (SCPMA Fundulea)

Distanța între rânduri, (cm)	Producția, g/ha	Diferența, g/ha	%	Semnificația
37,5	47,68	11,27	131	***
50	41,33	4,92	113	**
62,5	36,41	-	100	
DL 5%				3,38
DL 1%				4,63
DL 0,1%				6,31

Tabelul 4.25.7.2.
Influența normei de semănat asupra producției de herba uscată
la *Chnicus benedictus* L. (SCPMA Fundulea)

Norma de semănat (kg/ha)	Producția, q/ha	Diferența, q/ha	%	Semnificația
6	40,44	-2,2	95	0
8	42,11	-0,53	99	
10	42,64	-	100	
12	42,05	-0,59	99	
DL 5% 2,18				
DL 1% 2,89				
DL 0,1% 3,74				

Tabelul 4.25.7.3.
Influența distanței de semănat asupra producției de semințe
Chnicus benedictus L. (SCPMA Fundulea)

Distanța între rânduri, cm	Producția q/ha	Diferența, q/ha	%	Semnificația
37,5	8,33	-0,52	94	00
50	8,85	-	100	
62,5	7,89	-0,96	89	000
DL 5% 0,32				
DL 1% 0,44				
DL 0,1% 0,59				

Tabelul 4.25.7.4.
Influența normei de semănat asupra producției de semințe
Chnicus benedictus L. (SCPMA Fundulea)

Norma de semănat kg/ha	Producția q/ha	Diferența, q/ha	%	Semnificația
6	8,13	Mt	100	
8	8,44	0,31	104	
10	8,72	0,59	107	**
12	8,13	-	100	
DL 5% 0,44				
DL 1% 0,56				
DL 0,1% 0,72				

Lucrările de îngrijire. În cursul vegetației terenul se menține curat de buruieni și afănat prin prașile și pliviri, ori de câte ori este nevoie. Pentru combaterea buruienilor se pot folosi erbicidele Balan (6 l/ha) sau Lasso (6 l/ha), încorporate primăvara timpuriu (la 6 - 8 cm în sol), înainte de semănat sau Prometex (4 kg/ha), imediat după semănat, iar pe vegetație Fusilade (2 l/ha), când gramineele au 4 - 6 cm (S. Radu, 2000).

În culturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave.

Tabelul 4.25.7.5.
Producția de herba la *Chnicus benedictus* L.,
în funcție de spațiul de nutriție, în condițiile de la Cluj-Napoca

Nr. crt.	Distanța între plante (cm)	Plante la cuib (m.)	Plante la hectar (mii pl.)	Producția de herba uscată		Diferența	Semnificația
				q/ha	%		
1.	50/10	1	200	102,76	100,8	0,01	-
2.	50/10	2	400	99,21	97,3	-2,74	-
3.	50/20	1	100	105,11	103,1	3,16	-
4.	50/20	2	200	102,79	100,8	0,84	-
5.	50/30	1	66,6	100	98,1	-1,95	-
6.	50/30	2	133,3	101,82	99,9	-0,13	-
Media (Mt)				101,95	100	-	-
DL 5 % 12,93							
DL 1 % 17,9							
DL 0,1 % 24,7							

Recoltare. Herba se recoltează la începutul înfloririi majorității plantelor, pe timp frumos după ce s-a ridicat roua. Tăierea plantelor se face fie manual cu secera, fie mecanic cu cositori la 8 - 10 cm de la suprafața solului. Se pot obține și două recolte pe an.

Culturile semincere se recoltează când ajung la maturitate (septembrie) prin cosire, după care se treieră, iar sămânța se condiționează.

Condiționarea. După recoltare, herba se transportă la uscat. Nu se țin prea multe ore la soare și în grămezi, deoarece se depreciază calitatea. Uscarea se face pe cale naturală la umbră, în strat subțire, în încăperi curate și aerisite, sau pe cale artificială la temperatura de 45 - 50 °C. Randamentul la uscare este de cca. 4:1.

Condițiile tehnice de recepție prevăd ca herba să fie nelignificată. Se admit ca impurități: maximum 5 % tulpini lignificate, maximum 2 % plante decolorate sau brunificate, maximum 2 % inflorescențe fructificate (cu papus); corpurii străine organice, maximum 1 %, cele minerale, maximum 0,5 %, iar umiditatea, maximum 13 %.

Producția medie de herba uscată este de 30 - 50 q/ha.

În loturile semincere de schinel se obțin 700 - 900 kg/ha achene.

4.25.8. ANGHINAREA

(*Cynara scolymus* L.)

Fr: Artichaut; E: Artichoke, Globe artichoke; G: Artischocke

4.25.8.1 Importanță. Biologie. Ecologie

Anghinarea a fost cunoscută din antichitate (sec. IV î.e.n.) și a fost folosită în terapeutică încă din sec al XVI-lea, însă acțiunea ei coleretică s-a stabilit abia în 1931 (C. Constantinescu, 1967). Mai târziu s-a dovedit că acțiunea terapeutică se datorează cinarinei, flavonozidelor, polifenolilor, glicozidelor etc. Este cunoscută ca legumă în Egiptul antic și Imperiul Roman. De prin secolul al XV-lea este folosită frecvent ca aliment. Numele de *Cynara* a fost dat plantei de Columella (sec. II e.n.), pentru culoarea ei cenușie, iar *scolymus* vine din limba greacă, însemnând *spin, spinos* (R. Benigni și colab., 1971, după A. Mihalea, 1986).

Materia primă și compoziția chimică. De la anghinare (anghinar) se folosesc frunzele în stare proaspătă sau uscată, cu sau fără petiol (*Cynarae folium*).

Cynarae folium conține trei grupe importante de principii active: depside (esteri dintre două sau mai multe molecule de acizi polifenolici), flavonoide (glicozide ale luteolinei), lactone sescviterpenice de tip guaianolid (cinaropicrina, dehidrocinaropicrina, cinarotiol). Frunzele de anghinare conțin și alți compuși: taninuri, triterpene, steroli, glucide, mucilagii, pectine, labenzimă (U. Stănescu și colab., 2004). Frunzele conțin 0,2 - 0,3 % cinarină, în funcție de materialul biologic și condițiile de cultură. Aceste valori pot fi diferite și în funcție de proveniența produsului vegetal și de momentul recoltării. (E. Nichiforescu, V. Cucu, 1966, N.M. Apostolo și colab., 2005). Principiul activ, cinarina, a fost obținut în stare cristalizată și sintetizat apoi de Panizi și colab., 1954 (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). S-a constatat că dihidrofenolii de tip cafeic sunt în proporție mai mare în limb (de 4 - 5 ori mai mult) decât în petiol; principiile active au o repartizare relativ uniformă în limbul frunzei; frunzele bazale sunt mai sărace în principii active decât cele din zona medie și superioară (E. Nichiforescu, V. Cucu, 1966), J. M. Jouany și colab., 1975, au dozat cinaropicrina și au găsit un conținut de cca 1 ‰ în frunze uscate. Prin tratarea semințelor cu procaină s-au obținut plante cu un conținut mai ridicat în principii active (polifenoli totali exprimați în cinarină și

flavone) cu 20 - 94 % față de maritorul netratat (A. Ionică și colab., 1976). În *Farmacopeea Română* figurează *Cynorae folium* (frunză de anghinară) cu un conținut de cel puțin 0,35 % derivați flavonici exprimați în rutozidă (și cel puțin 1 % polifenoli de tip acid cafeic exprimați în cinarină).

Utilizări. Compușii din frunze au efect asupra bolilor de ficat și rinichi. Au acțiune coleretică, mărește reziduu uscat al bilei, stimulează excreția biliară a colesterolului, scade hipercolesterolemia, stimulează diureza și funcția antitoxică a ficatului. Se indică în insuficiență biliară, colecistite subacute și cronice, colită de fermentație și spastică, obstrucții parțiale ale hepatocodocului, în hipocolesterolemii, hepatite, ciroză etc. Extractele standardizate din *Cynara scolymus* L. se folosesc în obținerea unor medicamente (**Hepar SR forte, Valverde**). Se folosește în compoziția produsului **Anghiol** (coleretic și diuretic slab). Este contraindicată în afecțiuni acute, hepato - biliare și renale.

Anghinarea este utilizată și ca legumă (solzii florali și receptaculul).

Din inflorescențe s-a preparat și un „cheag vegetal” (închegarea laptelui fiind determinată de labenzimă).


Răspândirea. Anghinarea este o plantă mediteraneeană, originară din sudul Spaniei, Franței, Italiei și nordul Marocului (E. Păun, 1995). A fost introdusă în cultură în scop medicinal și ca legumă.

În România, ca plantă medicinală, anghinarea definește suprafețe mai mari în sudul țării.

Sistematică. Soiuri. Se cultivă specia *Cynara scolymus* L. (fig. 4.25.8., după G. Răcz și colab., 1970 și 4.25.8.a., original). Specia are $2n = 34$ (A. Laza și G. Răcz, 1975). Înrudită cu ea și cu acțiune similară este *Cynara cardunculus* L. Unii autori le consideră ca subspecii reunite într-o singură specie *C. cardunculus* L. (E.I. Nyárády, 1964). *Cynara cardunculus* L. este utilizată (în Tunisia) ca diuretic, coleretic, cardiotonic, antihemoneoidal, antidiabetic (E. Grigorescu și colab., 2001).

Din specia *Cynara scolymus* L., la noi în țară se cultivă soiurile Celesta (din anul 1989), Unirea (din anul 1993) și Flavia (din anul 2000). În scop legumicol se cultivă soiul de anghinare Breton (din anul 1965).

Particularități biologice. Este o plantă bienală sau perenă, după recomandări mai vechi cultura putându-se menține 2 - 3 ani (E. Coiciu și G. Răcz, 1962, F. Crăciun și colab., 1977).

Fig. 4.25.8. *Cynara scolymus* L.

După cum precizează A. Mihalea, 1982, M. Mircea, 1986 și S. Radu, 2000, în al doilea an, producția de frunze este foarte mică (apar tulpinile florifere), fapt care nu justifică menținerea culturii mai mult de un an. Pentru frunze în scop medicinal se preconizează cultivarea ei ca plantă anuală. În sol se formează un rizom de pe care pornesc rădăcinile, dezvoltând un sistem radicular care pătrunde adânc în sol. Tulpina se formează în anul al doilea și următorii (din mugurii situați în zona coleului), este foarte ramificată, cu înălțimea de până la 1,8 m. Frunzele în primul an sunt în formă de rozetă, iar pe tulpină sunt dispuse altern. Frunzele sunt mari (30 - 40 cm), penat - fidate, spinoase, păroase pe partea inferioară. Florile sunt tubuloase, de culoare roșie - violacee, sunt dispuse în capitule (antodii) mari, globuloase cu diametrul de 4 - 5 cm, învelite cu mai multe rânduri de solzi membranoși, cu baza cămoasă (*C. cardunculus* L. are inflorescențe mai mici). Înfloreste din iulie până în septembrie. Fructele sunt achene, brune, cu papus, având MMB până la 50 g.

Cerințe față de climă și sol. Anghinarea are cerințe ridicate față de temperatură și lumină. Peste iarnă nu rezistă sub 0 °C, dacă solul nu este acoperit de zăpadă. Cerințele față de apă sunt destul de mari, de aceea dă bune rezultate în condiții de irigare. Planta dezvoltă un sistem radicular profund. Preferă solurile adânci, permeabile, bogate în elemente nutritive, cu reacție neutră, cu un regim hidric favorabil. Excesul și lipsa apei în sol sunt dăunătoare.

Zonare. Având în vedere cerințele pedoclimatice ale plantei se recomandă să se cultive în zonele din sud și sud - vestul țării (A. Mihalea, 1982; M. Mircea, 1986), în Câmpia Bărăganului, Câmpia Burnazului, Câmpia Olteniei și Câmpia Timișului (E. Păun și colab., 1983).

4.25.8.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Anghinarea se cultivă pentru producția de frunze, ca plantă anuală, după prășitoare bine întreținute, cereale de toamnă și leguminoase pentru boabe (E. Păun, 1995). Pe același teren poate reveni numai după 4 - 5 ani.

Loturile semincere se amplasează separat de celelalte culturi de anghinare, urmând să se mențină în vegetație și în anul al doilea, când apar inflorescențele.

Fertilizarea Cultura de anghinare valorifică bine îngrășămintele chimice. Fertilizarea se face cu doze de 60 - 80 kg/ha P_2O_5 și 50 - 65 kg/ha K_2O (incorporate cu arătura) și 70 - 100 kg/ha N,

aplicat $\frac{1}{2}$ la pregătirea patului germinativ și $\frac{1}{2}$ după prima recoltare a frunzelor (M. Mircea, 1986, S. Radu, 2000).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 25 - 30 cm adâncime, iar data este în funcție de eliberarea terenului de către planta premergătoare. Primăvara, pentru menținerea umidității solului și pentru combaterea buruienilor, se fac lucrări cu discul urmat de grapă. Patul germinativ se pregătește bine cu combinatorul.

Sămânța și semănatul. Anghinarea se înmulțește în mod obișnuit prin semănat direct în câmp. Sămânța trebuie să aibă puritatea de 95 % (minimum de 90 %), iar germinația de 60 % (minimum 50 %). Semănatul se face cu semănătoarea SPC-6 sau SPC-8, în aprilie - mai (după înghețurile târzii), asigurând 7 - 9 plante la m^2 (A. Mihalea, 1982). Se însămânțează în rânduri, la 70 cm distanță și la adâncimea de 3 - 5 cm, folosindu-se 4 - 5 kg sămânță la ha (L.S. Muntean, 1990).

S-a încercat și înmulțirea prin răsad produs în seră în cuiburi nutritive (în pahare de plastic), rezultate mai bune obținându-se cu 5 pl/m^2 la distanța de 70/30 cm (D. Vârban și colab., 2005). Pe suprafețe mici, se poate semăna și în cuiburi la 25 - 30 cm distanță pe rând, în orificiile efectuate cu plantatorul (S. Radu, 2000).

Lucrările de îngrijire. În timpul vegetației se menține solul curat de buruieni și afănat prin prașile între rânduri și pe rând, ori câte ori este nevoie. Rărirea se face când plantele au 2 - 3 frunze adevărate, lăsându-le la distanța de 20 - 25 cm între ele pe rând. Pentru combaterea buruienilor se pot folosi erbicidele: Triflurex (4 l/ha) sau Devrinol (4 kg/ha), încorporate în sol înainte de semănat; Afalon (2 kg/ha) sau Goal (1,5 l/ha), aplicate până la răsărirea culturii; iar pe vegetație Furore (2 l/ha), când monocotiledonatele au 6 - 8 frunze (S. Radu, 2000). În mod obișnuit, bolile (ofilirea frunzelor, putregaiul rădăcinilor), nu produc pagube deosebite, putând fi prevenite prin respectarea rotației, sămânță sănătoasă și igienă culturală. Dăunătorii (omida scâieților, rățișoara, buha semănăturilor, afide) se pot combate cu Sinoratox 35 CE (2 l/ha), Fastac 10 EC (0,02 %) sau Decis 2,5 EC (0,05 %) (S. Radu, 2000).

În culturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice și bolnave și se menține lanul curat de buruieni și în anul doi de vegetație.

Recoltarea. De la anghinare se recoltează frunzele, la maturitatea tehnică, atunci când au culoarea verde închis, lungimea de cel puțin 35 - 40 cm (A. Minalea, 1986), iar pețiolul și nervura sunt încă fragede. În cursul vegetației, se fac 3 - 5 recoltări de frunze, prin tăiere cu secera sau cuțitul, menținându-se frunzele tinere din mijlocul

tufei ("inima") care dezvoltă o nouă rozetă. Pentru evitarea întepăturilor, se recomandă folosirea mănușilor de cauciuc. După recoltare, frunzele se pun în coșuri și se transportă în cel mai scurt timp pentru prelucrare în stare proaspătă sau pentru uscare.

În loturile semincere se recoltează cel mult o singură dată frunzele în anul întâi de vegetație (A. Mihalea, 1986). Recoltarea inflorescențelor în loturile semincere se face în anul al doilea de vegetație, eșalonat pe măsura maturizării semințelor (când se desprind din inflorescență primele semințe, împreună cu papusul lor), prin tăiere cu secera, urcarea lor pe platforme sau prelate, apoi se treieră, iar semințele se condiționează.

Condiționarea. Frunzele se uscă artificial la 50 - 60 °C (M. Mircea, 1986). Uscarea pe cale naturală se face în încăperi la umbră, pe rame, rogojini, hârtie (în strat subțire, de un rând de frunze) despicându-se pețiolul în lung, pentru a scurta perioada uscării, precum și pe sfoară (ca și tutunul). Uscarea la umbră durează cca. 20 zile. Dacă se face uscarea la soare durează numai 7 - 10 zile, însă scad principiile active, ca și în cazul uscării artificiale (F. Crăciun și colab., 1977). Randamentul la uscare este de cca 7:1.

Condițiile tehnice de recepție prevăd datele prezentate în tabelul 4.25.8.1.

Tabelul 4.25.8.1.

Condițiile de recepție pentru *Cynarae folium*

Specificare	Frunze uscate		Frunze proaspete	
	Cu pețiol	Fără pețiol	Cu pețiol	Fără pețiol
Impurități: - frunze brunificate sau pătate (% maximum) (la cele proaspete și frunze îngălbenite)	5	5	5	5
Corpur străine: - organice (% maximum) - minerale (% maximum) Umiditate (% maximum)	0,5 1 13	0,5 1 13	0,5 1 13	0,5 1 Normală la recoltare
Principii active: - flavone (% minimum) - chinarină (% minimum)	0,12 0,9	0,12 0,9	0,03 0,16	0,03 0,16

Producția ce se realizează la ha este de cca. 25 - 25 t frunze proaspete (2 - 3 t frunze uscate). Actualele soiuri realizează nivele de

producții diferite, în funcție de zona de cultură, după cum rezultă din tabelul 4.25.8.2. (după N. Ungureanu, 1996).

Tabelul 4.25.8.2.
Producția de frunze proaspete și uscate obținută
la soiurile Unirea și Celestia în diferite zone de cultură

Locul Soiul	SCPMA Fundulea			CIS Dălgă			CIS Ieneu		
	media	d	%	media	d	%	media	d	%
Unirea Celestia (M)	21 783 20 245	1 538 -	107,6 100	45 341 32 068	13 273 -	141,4 100	24 967 24 767	200 -	101 100
Frunze uscate kg/ha									
Unirea Celestia (M)	3 584 3 369	215 -	106,4 100	8 653 6 054	2 599 -	142,9 100	3 730 3 423	307 -	109 100

În loturile semincere de anghinare se obțin 300 - 400 kg/ha achene.

4.25.9. GÂLBENELLE (*Calendula officinalis* L.)

Fr: Souci des jardins, Souci; E: Common marygold, Marigold;

G: Ringelblume

4.25.9.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Numele genului derivă de la latinescul "*calendae*" și diminutivul "*ula*" însemnând „calendar mic”. Florile plantei se deschid de al răsăritul soarelui și se închid la apus, semnificând un calendar (E.I. Nyárády, 1964). Dacă florile nu se deschid dimineața, timpul în acea zi, se crede că va fi ploios. Planta a primit și numele de „mireasa soarelui” („*sponsa solis*”, după A. Magnus), datorită aspectului frumos al florilor ei.

Materia primă și compoziția chimică. Gâlbenelele (Fitiinică, Ochisele, Nocotele, Călinică, Ochi-galbeni, Roșioară, Rujuliță) se cultivă ca plantă ornamentală, iar în scop medicinal pentru flori (*Calendulae flos*), pot fi flori cu receptacul (*Calendulae flos cum receptaculis*, *Calendulae cum receptaculis flores*), sau flori fără receptacul (*Calendulae flos sine receptaculis*, *Calendulae sine receptaculis flores*).

Florile conțin saponozide triterpenice (derivați ai acidului glucuronil oleanolic), circa 3 % carotenoide (licopina, alfa și beta

caroten, xantofila etc.), flavonoizi și glicozizi flavonici; ulei volatili (cca 0,02 %); substanțe amare; mucilagii (până la 4 %); vitamina C etc. (F. Crăciun și colab., 1977; J. Peyroux și colab., 1981; N. Crăbas și colab., 2003). Conținutul de ulei volatili este până la 0,12 % în florile ligulate și până la 0,4 % în receptacul (U. Stănescu și colab., 2004).

La cerere se recoltează și *Calendulae herba* formată din partea aeriană a plantei în timpul înfloririi, până la maximum 1 cm sub ultimele frunze verzi (vezi descrierea plantei); predându-se în stare proaspătă sau uscată.

Utilizări. Florile de gâlbenele au acțiune colagogă, cicatrizantă, antiinflamatoare și calmantă. Sunt cunoscute în medicina empirică pentru acțiunea de stimulare a vindecării rănilor. Cercetări efectuate la noi în țară arată că extractele liofilizate de flori ligulate (diluție de 0,1 - 0,25 %) inhibă dezvoltarea stafilococului auriu Oxford, *Escherichia coli* și *Candida albicans*, având și acțiune antitrombonazică (F. Crăciun și colab., 1977). Însușirile coagulante au fost descrise de Bose și colab., 1959 (citat de E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Principiile active din gâlbenele activează circulația sângelui în țesuturi, favorizând cicatrizarea rănilor (G. Constantinescu, 1967 etc.). Planta era cunoscută din vechime ca mijloc contra cancerului, în medicina contemporană fiind folosită în compoziția unor produse utilizate în acest scop. În Rusia se folosește în compoziția tabletelor "KN" utilizate în formele inoperabile de cancer. Acestea, la boala de cancer stomacal, scad intoxicațiile, înlătură fenomenele de dispepsie, greață și vomă, sporește pofta de mâncare și somnul (E. Coiciu, 1967). Extractele de *Calendulae flos* intră în compoziția unor medicamente utilizate în afecțiuni gastrointestinale și hepatobiliare, (Galov - comprimate; Tarbedol - granule) și afecțiuni dermatologice (Armon - crenă; Hemogal - unguent, Naturland *Calendula* - unguent). Datorită efectului cicatrizant intră în compoziția *Ceaiului gastric și duodenal*. Se folosește extern sub formă de unguent în tratamentul plăgilor, ulcerății ale pielii, asuri etc. Ceaiul de gâlbenele calmează durerile menstruale (la persoanele anemice). Este recomandat și în boli de ficat, datorită principiului amar din flori, care mărește secreția biliară (colagog).

Răspândire. Planta este originară din zona mediteraneană și din vestul Astei, fiind răspândită în aproape toată Europa ca plantă ornamentală (E. Păun, 1995). Se cultivă ca plantă medicinală în multe țări din Europa, pe suprafețe mai mari în zonele mediteraneene, iar

furnizorii principali ai produsului medicamentos sunt Polonia, Ungaria, Egipt.

În țara noastră se cultivă ca plantă ornamentală și în scop medicinal.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Calendula officinalis* L. (fig. 4.25.9., după G. Rácz și colab., 1970 și 4.25.9.a., original).

Specia *C. officinalis* L. are $2n = 32$ (28) (A. Laza și G. Rácz, 1975).

La noi în țară din specia *Calendula officinalis* L., se cultivă soiurile "Petrana" (din anul 1990) și "Palmen" (din anul 1977, în curs de înlocuire).

Particularități biologice. *Calendula officinalis* L. este plantă anuală, rar biennială. Rădăcina este pivotantă, de cca 20 cm lungime și la 1 cm grosime, bine ramificată. Tulpina are cca 40 - 70 cm înălțime, cu ramificații terminate cu câte o inflorescență. Frunzele alterne, sesile, cele inferioare sunt spatulate (se usucă la înflorire), celelalte sunt îngust - obovate până la slab dintate, acoperite cu peri scurți. Florile sunt grupate în capitule (antodii) terminale, înconjurate de două rânduri de frunze involucre, pe receptacul având mai multe rânduri de flori ligulate marginale, galben portocalii, iar în interior flori tubuloase. Înfloarește din iunie până în septembrie - octombrie (până la primele geruri). Fructele sunt achene curbate (în formă de seceră), lungi de 8 - 18 mm și late de 2 - 9 mm, fără papus și cu țepi mici, mai ales pe suprafața convexă MMB este de cca. 10 g.

Cerințe față de climă și sol. *Calendula officinalis* L. are cerințe medii față de factorii climatici, putându-se cultiva în toată țara. Reușește pe diferite tipuri de sol, însă producții mai mari (inflorescențe mai multe) asigură pe soluri cu fertilitate mai bună, profunde, cu umiditate suficientă, afânate și care se încălzesc ușor.

Zonare. Această specie se poate cultiva în toate zonele agricole ale țării noastre, cu excepția zonelor montane (E. Păun și colab., 1983). Fiind și plantă ornamentală, cultura ei se pretează și în parcuri, grădini școlare, spații verzi etc.

4.25. 9.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. *Calendula officinalis* L. nu are pretenții deosebite față de planta premergătoare, găbenelele reușind după orice plantă de cultură. În condițiile din vestul țării, cele mai bune premergătoare au fost soia și grâul de toamnă depășind producțiile realizate după porumb și floarea - soarelui (G. Pop, 1999). Pe același teren poate reveni numai după 4 - 5 ani (M. Verzea, 1986).



Fig. 4.25.9. *Calendula officinalis* L.

Pentru producerea de semințe se înfințează culturi speciale sau se aleg parcelele cu plante bine dezvoltate și sănătoase, cu însușirile tipice soiului.

Fertilizarea se face în funcție de zona de cultură și nivelul de fertilitate al solului, după cum atestă experiențele întreprinse la S.C.P.M.A. Fundulea (1977-1979) de V. Ivan și colab., 1980 (tabelele 4.25.9.1. și 4.25.9.2.), la S.C.A. Secuieni (1983-1985) de C. Pînzaru, 1987 (tabelele 4.25.9.3. și 4.25.9.4.), la S.D.E. Timișoara (1986-1987) de I. Borcean și colab., 1988 (tabelul 4.25.9.5.) și G. Pop, 1999 etc. Se recomandă fertilizarea cu doze de 60 - 80 kg/ha P_2O_5 și 40 - 45 kg/ha K_2O (încorporate cu arătura adâncă) și 40 - 80 kg/ha N, în funcție de fertilitatea solului (încorporat cu lucrările de pregătire a patului germinativ) (V. Ivan, 1982, G. Pop, 1999, R. Stoianov, 2000).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 25 - 28 cm adâncime și se menține curată de buruieni, prin lucrări cu discul umnat de grapă. Patul germinativ se pregătește cu discul în agregat cu grapa sau cu combinatorul.

Tabelul 4.25.9.1.

Doze de N și K	Producția		%	Seminif
	g/ha	d		
N_4K_0	11,1	-	100	-
N_4K_{35}	11,5	0,4	103	-
N_6K_{35}	12,2	1,1	110	**
N_8K_{35}	14,5	3,4	130	***

DL 5% = 0,7 g/ha DL 1% = 0,9 g/ha DL 0,1% = 1,2 g/ha

Tabelul 4.25.9.2.

Doze de fosfor	Producția		%	Seminif
	g/ha	d		
P_0	11,1	-	100	-
P_{30}	12,3	0,8	111	**
P_{60}	13	1,9	117	***
P_{90}	13,2	2,1	119	***

DL 5% = 0,5 g/ha DL 1% = 0,7 g/ha DL 0,1% = 0,9 g/ha

Influența îngrășămintelor cu fosfor asupra producției de inflorescențe uscate la *Calendula officinalis* L. (SCPMA Fundulea)

Influența îngrășămintelor cu azot și potasiu asupra producției de inflorescențe uscate la *Calendula officinalis* L. (SCA Secuieni)

Tabelul 4.25.9.3.

Doze de N și K	Producția (g/ha)	Diferența (g/ha)	%	Seminif
N_4K_0	18,17	Mt.	100	-
N_8K_0	20,44	2,27	112	***
N_4K_{35}	20	1,83	110	***
N_8K_{35}	21,92	3,75	121	***

DL 5% = 0,42 g/ha DL 1% = 0,58 g/ha DL 0,1% = 0,78 g/ha

Influența fosforului asupra producției de inflorescențe uscate la *Calendula officinalis* L. (SCA Secuieni)

Tabelul 4.25.9.4.

Doze de fosfor	Producția g/ha	Diferența g/ha	%	Seminif
P_0	16,5	Mt.	Mt.	-
P_{30}	20,91	4,41	127	***
P_{60}	21,84	5,34	132	***
P_{90}	21,28	4,78	129	***

DL 5% = 0,4 g/ha DL 1% = 0,53 g/ha DL 0,1% = 0,69 g/ha

Sinteza rezultatelor de producție „Flores *Calendulae* cum receptaculis”

Tabelul 4.25.9.5.

Varianta	Producția g/ha	%	Diferența g/ha	Seminif	
				Față de eroare	Față de intersecția an X varianta
$N_4P_0K_{30}$	14,09	100	-		
$N_4P_0K_{30}$	15,44	109	1,35	**	
$N_6P_0K_{30}$	17,83	126	3,74	***	*
$N_8P_0K_{30}$	19,75	140	5,66	***	**

DL 5% = 0,96 DL 1% = 1,35 DL 0,1% = 1,9
DL 5% = 2,45 DL 1% = 4,5 DL 0,1% = 9,96

Sămânța și semănatul. *Calendula officinalis* L. se înmulțește prin semănat direct în câmp. Se folosește sămânță provenită de la plante productive, cu puritatea de 95 % (minimum 85 %), iar germinația de 85 % (minimum 70 %). Epoca de semănat este în luna martie (G. Pop, 1999), asigurând o densitate la răsărire de circa 40-50 plante la m^2 (R. Stoianov, 2000). În condițiile din vestul țării desimea optimă a fost de 70 pl./ m^2 (tabelul 4.25.9.6., după G. Pop și D. Pop, 2005). La Cluj-Napoca, rezultatele bune s-au obținut la 50 cm între rânduri și 10 cm între plante pe rând (D. Vârban și colab., 2005) Se însămânțează cu semănători universale (SUP-21, SUP-29), în rânduri la distanța de 50 cm și la adâncimea de 2 - 3 cm, folosindu-se 6 - 8 kg/ha (R. Stoianov, 2000), până la 12 - 15 kg sămânță/ha (E. Păun, 1995), în funcție de calitatea materialului de semănat. Se poate semăna și egalonat (iunie - iulie), pentru a se recolta până în octombrie. Pe suprafețe mai mici se poate semăna cu mâna în cuiburi la 40/30 cm, lăsând 3 - 4 plante la cuib, sau la 50/20 cm cu 2 - 3 semințe la cuib.

Lucrările de îngrijire. Se fac prașile și pliviri ori de câte ori este nevoie, pentru a menține solul curat de buruieni și afânat. Combaterea buruienilor se poate realiza prin erbicidare cu Treflan

(4 l/ha) + Venzar (1 kg/ha), aplicate înainte de semănat și încorporate prin discuire (la 6 - 8 cm adâncime), sau cu Dual (5 l/ha) + Aresin (2 kg/ha), aplicate imediat după semănat (sau în aceeași zi cu semănatul) (E. Păun, 1995). Pe vegetație se pot folosi produsele graminicide Furor (2 - 3 l/ha) și Nabu S (2 l/ha), când buruienile au maximum 10 cm înălțime (R. Stoianov, 2000). La prășila a doua se face buchetatul plantelor pe rând, la 20 cm.

În culturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturându-se plantele netipice soiului și bolnave.

Tabelul 4.25.9.6.

Sinteza rezultatelor de recoltă-inflorescențe uscate la aer
(*Flores Calendulae*) înregistrate în perioada 2003-2004 la Timișoara

Factorul A - planta premergătoare	Factorul B - desimea de semănat (plante/m ²)						Mediile factorului A		
	30	50	70	Producția kg/ha	%	Diferența	Semnificația		
	807	841	919	856	100	Mt			
Porumb pt. boabe	842	905	948	898	105	42			
Mazăre									
DL 5 % = 54; DL 1 % = 88; DL 0,1 % = 116									
Mediile factorului B									
Desimea de semănat	30 plante/m ²			50 plante/m ²			70 plante/m ²		
Producția kg/ha	825			873			934		
%	100			105			113		
Diferența kg/ha	Mt			48			109		
Semnificația	-			-			X X		
DL 5 % = 71; DL 1 % = 95; DL 0,1 % = 122									

Recoltare. Gălbenelele se recoltează în mai multe etape, din iunie în octombrie, pe măsură ce s-au deschis primele 2 - 3 rânduri de flori ligulate. În prima perioadă, intervalul între recoltări este de 3 - 4 zile, apoi mai rar. Se recoltează capitulele întregi (*Calendulae flos cum receptaculis*) sau florile ligulate (*Calendulae flos sine receptaculis*), în coșuri, pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua. Imediat după recoltare, produsul se transportă la uscat, fără să se țină în grămezi.

Culturile semincere se recoltează la maturitatea deplină a semințelor (au culoarea cafenie și se desprind ușor din inflorescență) (M. Verzea, 1986), cu combina sau cu secera, urmând să se treie după uscare.

Condiționarea. Uscarea se face în strat subțire la umbră, în încăperi bine aerisite, uscate și curate. F. Crăciun și colab., 1977, precizează că uscarea la soare nu dăunează calității, dacă se procedează cu atenție. Se menționează că florile ligulate se pot usca și la soare, deoarece nu se decolorează în timp de 4 - 5 ore cât durează uscarea. În schimb la cele cu receptacul, uscarea la soare durează

1 - 2 zile, pierzându-și în acest timp culoarea portocalie (se albesc). Se poate face uscarea și artificial la 40 - 50 °C, după o prealabilă deshidratare la umbră. Randamentul la uscare este de 7 - 8:1. După uscare produsul se ambalează în lăzi căptușite și se păstrează la întuneric, în camere curate și aerisite, până la livrare. Florile trebuie să-și păstreze culoarea naturală.

Condițiile tehnice de recepție pentru florile cu receptacul admit ca impurități: maximum 3 % flori brunificate, maximum 7 % flori cu codița de până la 3 cm, neadmițându-se capitule cu flori (ligulate) scuturate; corpuri străine organice nu se admit, cele minerale maximum 0,1 %, umiditatea maximum 13 %, iar principii active (substanțe extractive) minimum 35 %. La florile fără receptacul, condițiile tehnice de recepție admit ca impurități: maximum 2 % flori brunificate sau decolorate, maximum 10 % flori tubulare, maximum 1 % resturi de bractei; nu se admit corpuri străine organice și minerale, iar umiditatea maximum 11 %.

Producțiile ce se realizează sunt de 15 - 30 q/ha flori ligulate proaspete sau 40 - 90 q/ha inflorescențe proaspete. Producția medie de flori ligulate uscate este de 2 - 3 q/ha, iar cea de capitule este de 10 - 15 q/ha.

În loturile semincere de gălbenele se obțin 600 - 800 kg/ha achene.

4.25.10. ARMURARIUL (*Silybum marianum* [L.] Gärtn.)

Fr: Chardon Marie; E: Milk thistle; G: Mariendistel

4.25.10.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă de la armurariu este formată din fructe (*Cardui mariae fructus*). Uneori se solicită partea aeriană a plantei (*Cardui mariae herba*).

Fructele (achenele) conțin diferite principii active, dintre care mai importante sunt silimarina, precum și derivați flavonici, ulei gras (20 - 30 %), fitosteroni, mucilagii, pectine, etc. Conținutul produsului în silimarină (amestec cu silibină, sileristină și silidianină) este de 1,5 - 3 % (A. Carula și colab., 2002, U. Stănescu și colab., 2004).

Utilizări. Extracțele din fructe sunt folosite în prepararea unor produse farmaceutice cu acțiune hepatoprotectoare. Intră în

compoziția medicamentelor **Silimarină, Legalon, Durasilymarin, Slibide** etc. În trecut s-au folosit și părțile aeriene ca tonic amar.

Răspândire. Armurariul este de origine din zona mediteraneană până în Asia Centrală. Apare și în flora spontană din țara noastră, datorită, probabil, scuturării și împrăștierei ușoare a semințelor prin vânt la distanțe mari (din culturi) (E. Păun, 1995). Se cultivă în centrul Europei, în America și sudul Australiei, iar furnizorii principali ai produsului vegetal sunt Argentina, China, România și Ungaria.

A fost luat în cultură și în țara noastră ca plantă medicinală, fiind recomandată cultivarea în zone mai calde din sudul și vestul țării.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Silybum marianum* (L.) Gärtn *Carduus marianus* L.), (fig. 4.25.10., după Flora României, vol. IX, 1964 și fig. 4.25.10.a., original). Specia are $2n = 34$ (A. Laza și G. Răcz, 1975).

La noi în țară, din specia *Silybum marianum* L. Gărtn se cultivă soiul (populația) "De Prahova", din anul 1975.

Particularități biologice. Armurariul este cultivat ca plantă anuală. Rădăcina este fusiformă, bine dezvoltată. Tulpina are 50 - 150 cm înălțime și este striată. Frunzele sunt mari (8 - 15 cm lungime) nepețiolate (amplexicaule) cu nervuri terminate cu ghimpi. Florile sunt tubuloase, de culoare roșie, grupate în capitule (antodii) mari (4 - 5 cm) cu involuclu ghimplos. Înflorirea are loc din iulie în septembrie. Fructele sunt achene prelungite (6 - 8 mm lungime), de culoare brunie, cu papus, MMB este de cca 30 g.

Cerințele față de climă și sol. Fiind originară din zone calde, are cerințe ridicate față de temperatură în tot cursul vegetației. Cerințele față de umiditate sunt moderate. Nu are cerințe prea mari față de sol. Nu reușește însă pe soluri grele cu exces de umiditate. Preferă solurile mijlocii, profunde, permeabile și bine drenate, cu umiditate suficientă.

Zonare. Pe baza cerințelor bioecologice ale plantei cât și a condițiilor naturale existente, în țara noastră, s-au stabilit ca zone foarte favorabile Câmpia Bărăganului și Câmpia Burnazului, iar ca zone favorabile Câmpia Timișului și Câmpia Olteniei (M. Mircea, 1986, E. Păun și colab., 1983).



Fig. 4.25.10. *Silybum marianum* (L.) Gärtn.:
a - floare; b - foliole involucre

Recoltarea. Armurariul se recoltează când 70 - 80 % din inflorescențe sunt mature, înainte de desfacerea lor (fructele fiind ușor luate de vânt), cu combina reglată în acest scop. Se poate recolta și în două faze, tăierea inflorescențelor cu secerători, urmata de uscarea produsului și treierarea cu combina.

Condiționarea. După treierare, fructele se condiționează (cu vânturătoare sau selector) și se usucă (prin lopătare) până la umiditatea de 12 %. Păstrarea semințelor se face în depozite curate și bine aerisite.

Condițiile tehnice de recepție admit ca impurități: maximum 1 % resturi de codițe și alte părți din plantă; corpuri străine organice, maximum 1,5 %, cele minerale, maximum 0,5 %, iar umiditatea maximum 12 %.

Producția medie de fructe uscate de armurariu este cuprinsă între 10 - 15 q/ha.

Observație. Frunzele armurariului sunt spinosae, fapt de care trebuie să se țină seama și să se respecte măsurile de protecție la lucrările manuale în lan.

4.25.11. CRĂIȚELE (*Tagetes patula* L.)

Fr: Tagète, Oeillet d'Inde, Rose d'Inde; E: French marigold,
Marigold; G: Studenten Blume, Ausgebreitet

4.25.11.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Materia primă și compoziția chimică. De la crăițe (*Ochisele, Vizoage*) se folosesc florile, fără receptacul (*Tagetes flos, Tagetes flos sine receptaculis*), de culoare galben - brună (florile ligulate) și galben închis (florile tubuloase). Florile de crăițe conțin substanțe carotenoidice, dintre care mai importantă este pigmentul galben helenienă, precum și ulei volatili (tagetonă, nonanol, linalool, linalen, acetat de linalil), diferenți flavonoidi, camferitină, cvercetagetină, patuletină, patulitrină etc. (F. Crăciun și colab., 1977, E. Grigorescu și colab., 2001, D.V. Sagar și colab., 2005). Conținutul de helenienă (esterul dipalmitinic al luteinei) este cuprins între 0,01 - 1,45 % (E. Grigorescu și colab., 2001). Conținutul cel mai ridicat de helenienă este la maturitatea florilor (I. Nițescu și colab., 1984).

Utilizări. Helenienă mărește capacitatea de adaptare a ochiului la diferite intensități de lumină. Pe bază de helenienă, se realizează produsul farmaceutic românesc **Heligel**, indicat în vederea nocturnă deficitară a ochiului normal și miop, hemeralopie, adjuvant în retinita pigmentară. Este util în profesii care necesită adaptarea rapidă a ochiului la întuneric, cum sunt conducătorii auto, mecanici de trenuri, mineri etc.

Răspândire. Specia *Tagetes patula* L. este originară din Mexic (E. Păun, 1995) și cultivată în diverse țări în scop ornamental și medicinal. La noi este răspândită în întreaga țară în scop ornamental. Se cultivă și ca plantă medicinală.

Sistematică. Soiuri. Se cultivă specia *Tagetes patula* L. (fig. 4.25.11., după G. Răcz și colab., 1970 și 4.25.11.a., original). Specia *T. patula* are $2n = 48$ (A. Laza, G. Răcz, 1975). Numele genului vine de la zeul etrusc *Tagetes* (tânăr frumos și viguros, cu referire la frumusețea florilor acestui gen) (E.I. Nyárády, 1964). În cultură s-au luat și alte specii din acest gen. Specia *T. patula* L. prezintă foarte multe varietăți horticole care se hibridează ușor. În țara noastră sunt mai răspândite cinci varietăți (unicolor sau bicolor), dintre care conținutul cel mai ridicat de helenienă îl au florile de *T. patula* tipul *Pauciseriati*, var. *bicolor* (I. Nițescu și colab., 1984).

Din specia *Tagetes patula* L. în țara noastră se cultivă soiul *Tagetes* (din anul 1996) și soiul local (populația) "De Chiajna", (din anul 1975), cuprinzând diferite biotipuri.

La noi în țară s-au făcut studii privind luarea în cultură a speciei *Tagetes signala* Bartl. (crăițele catifelte) care conțin în părțile aeriene până la 4,25 % ulei volatili, depășind *T. patula* și *T. erecta* (S. Male și D. Ivan, 1981).

Particularități biologice. *Tagetes patula* L. este plantă anuală. Rădăcina este puțin ramificată și ajunge până la 15 - 20 cm adâncime în sol. Tulpina are înălțimi variabile în funcție de biotip (între 20 - 100 cm), este ramificată în formă de tuță. Frunzele sunt alterne, penat - sectate, cu lacinii liniar - lanceolate. Florile sunt dispuse în capitule (antodii) terminale, cele marginale ligulate (galben - brune) și cele centrale tubuloase (galben - închis). Biotipurile cu flori portocalii se cultivă în scop medicinal. Înfloresc din iulie în octombrie. Fructele sunt achene liniare brun - negricioase, cu papus slab dezvoltat.

Cerințe față de climă și sol. Nu au cerințe deosebite față de climă, putându-se cultiva în condiții diferite de lumină și temperatură. Sunt sensibile la brumele târzii de primăvară. Față de umiditate au cerințe reduse, rezistând și în condiții mai secetoase.

Creșterea și dezvoltarea este mai bună pe solurile afânate, fertile, cu regim hidric favorabil. Se pot cultiva pe o mare variabilitate de tipuri de sol, cu excepția celor prea acide sau cu exces de umiditate.

Zonare. Crăilele se pot cultiva în toate zonele agricole ale țării, atât în scop ornamental, cât și în scop medicinal.

4.25.11.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. *Tagetes patula* L. reușește după diferite premergătoare, cereale păioase, prășiitoare etc. Pe același teren se cultivă numai după 4 - 5 ani.

Pentru producerea de sămânță se înființează culturi speciale sau se aleg parcelele cu plante tipice soiului, bine dezvoltate și sănătoase.


Fertilizarea, *Tagetes patula* L. reacționează la fertilizare după cum atestă experiențele întreprinse (între anii 1984 - 1986) de M. Mircea și A. Hangiu 1988 (tabelul 4.25.11.1.) și (între anii 1986 - 1988) de G. Pînzaru și A. Hangiu, 1991 (tabelul 4.25.11.2.) etc. Se recomandă fertilizarea cu doze de 40 - 50 kg/ha P_2O_5 și 20 - 30 kg/ha K_2O (toamna) și 60 - 80 kg/ha N (primăvara), în funcție de fertilitatea solului și planta premergătoare (M. Mircea, 1986, M. Verzea, 1988, V. Plugaru, 2000).

Lucrările solului. Pentru semănat sau plantat, terenul, arat din toamnă (la circa 28 cm adâncime), se pregătește primăvara cu discur urmat de grapă sau cu combinatorul.

Tabelul 4.25.11.1.
Influența îngrășămintelor cu NP asupra producției de ligule uscate,
conținutului și producției de helenienă la *Tagetes patula* L.

Doza, kg/ha	Conținutul în		Producția de ligule uscate, q/ha	Conținutul în helenienă, g/100g	Helenienă	
	P_2O_5	N			Producția, kg/ ha	Spor %
0	0	0	9,4 (Mt)	0,271	2,5	-
	50	50	9,6	0,338	3,2	128
	70	70	10,5	0,271	2,8	112
50	0	0	10,7	0,406	4,3	172
	50	50	9,7	0,566	5,5	228
	70	70	10,4	0,529	5,5	220
70	0	0	11,1	0,474	5,2	208
	50	50	11,4	0,446	5	200
	70	70	10,2	0,306	3,1	124
90	0	0	10,8	0,454	4,9	196
	50	50	11,7	0,556	6,5	260
	70	70	11,6	0,568	6,5	260
90	0	0	10,5	0,421	4,4	176
	50	50	11	0,351	3,8	152
	70	70	11,7	0,271	3,1	124
90	90	90	11,7	0,256	2,9	116

Fig. 4.25.11. *Tagetes patula* L.



Tabelul 4.25.11.2.
Influența îngrășămintelor cu fosfor, potasiu și azot asupra producțiilor de flori
ligulate uscate, semințe și heleneină la *Tagetes patula* L.

Doza kg/ha	Producția de ligule		Producția de semințe		Conținutul în heleneină (%)		Producția de heleneină		
	kg/ha	(%)	Seminț.	kg/ha	(%)	Seminț.	kg/ha	(%)	Seminț.
Îngrășăminte cu fosfor și potasiu									
P ₄₀ (M)	2 122	100		642	100	-	0,432	10,83	100
P ₃₀	2 287	108	***	683	106	**	0,447	11,83	109
P ₂₀ K ₃₀	2 513	118	***	654	102	-	0,398	11,73	108
P ₃₀	2 467	116	***	690	107	**	0,352	10,02	92
DL 5% = 82 kg/ha									
20kg/ha									
Îngrășăminte cu azot									
N ₆₀ (M)	2 067	100		635	100	-	0,346	8,15	100
N ₅₀	2 392	116	***	681		***	0,384	10,67	131
N ₇₀	2 449	118	***	688	108	***	0,424	12,04	148
N ₉₀	2 481	120	***	665	105	*	0,473	13,56	166
DL 5% = 39 kg/ha									
26 kg/ha									
0,44 kg/ha									

Sămânța și semănatul (plantatul) *Tagetes patula* L. se înmulțește prin semănat direct în câmp sau prin răsad. În ambele cazuri sămânța trebuie să aibă puritatea de 70 % (minimum 60 %), iar germinția de 65 % (minimum 50 %).

Semănatul direct în câmp se face de la sfârșitul lunii martie (tabelul 4.25.11.3., după M. Mircea, 1986) până în aprilie (V. Plugaru, 2000), cu semănătorii universale, asigurând densitatea de la 45 - 50 plante/m² la 50 - 60 plante la m² (M. Mircea, 1986). Distanța dintre rânduri este de 62,5 cm, adâncimea de semănat de 2 - 2,5 cm, folosind circa 4 kg sămânță/hectar (amestecată cu 4 - 5 părți de material inert). Datele obținute de M. Mircea 1987 arată că și pentru producția de semințe s-au obținut rezultate bune la 62,5 cm între rânduri (tabelul 4.25.11.4.), cu 4 kg/ha sămânță (tabelul 4.25.11.5.). Se poate semăna și în cuiburi la 45 - 50 cm între rânduri și la 25 cm pe rând, punându-se câte 2 - 3 semințe la cuib (F. Ciăciun și colab., 1977).

La înmulțirea prin răsad necesarul de material de plantare pentru un ha se produce pe circa 100 m² răsadnițe calde, folosind 0,5 kg sămânță/ha. Răsadul (de 5 - 7 cm lungime) se plantează la sfârșitul lunii aprilie, la 50 cm între rânduri și 25 cm pe rând (M. Verzea, 1988).

Lucrările de îngrijire. Constrau din prașile și pliviri (de câte ori este nevoie), pentru a menține solul curat de buruieni și afănat. Pentru combaterea buruienilor se pot folosi erbicidele: Eradicane

4. Plante medicinale și aromatice cultivate sau în curs de introducere în cultură în România
(3 kg/ha), încorporat înainte de semănat, iar postemergent Furor (2 l/ha) sau Fusilade (2 l/ha) (V. Plugaru, 2000).

Tabelul 4.25.11.3.
Influența epocii de semănat asupra producției de flori ligulate la *Tagetes patula* L.

Epoca de semănat	Producția proaspătă (g/ha)	Producția uscată (g/ha)	d	%	Semnificație
Toamna (10-15 noiembrie)	-	-	-	-	-
Primăvara (20-25 martie)	83	16,6	2,9	121	***
Primăvara (10-15 aprilie)	68,5	13,7	Mt	100	-
DL 0,1% = 1,6 g/ha					

Tabelul 4.25.11.4.
Influența distanței de semănat asupra producției de semințe la *Tagetes patula* L.

Distanța între rânduri (cm)	Producția (g/ha)	Dif. (g/ha)	%	Semnificație
37,5	8,5	Mt	100	-
50	8,9	0,4	104,7	*
62,5	9,5	1	111,7	**
DL 5% = 0,36 g/ha				

Tabelul 4.25.11.5.
Influența normei de semănat asupra producției de semințe la *Tagetes patula* L.

Norma de sămânță, (kg/ha)	Producția (g/ha)	Dif. (g/ha)	%	Semnificație
2	8,6	0,1	101	-
4	9,7	1,2	114	**
6	8,5	Mt	100	-
DL 5% = 0,32 g/ha				

La culturile semincere se efectuează purificarea biologică, înlăturând plantele netipice soiului și cele atacate de boli și dăunători.

Recoltare. De la crăițe se recoltează florile ligulate. Recoltarea se face cu receptacul, când florile sunt complet deschise. Nu se întârzie recoltarea deoarece plantele trec repede în stadiul de fructificare (îmbătrânind plantele și reducând producția). Se recoltează din iunie până în septembrie de 4 - 6 ori. Recoltarea se face pe timp frumos după ce s-a ridicat roua. Zilnic se recoltează cât se pune la uscat.

În loturile semincere nu se recoltează deloc florile. Plantele semincere se recoltează la maturitatea deplină, cu seceră, apoi se treieră, iar sămânța se condiționează.

Condiționarea. După recoltare se transportă la locul de uscare, unde se extrag florile din receptacul. Cu o mână se ține

receptaculul și cu cealaltă se smulg florile. Se înlătură receptaculul și alte impurități, iar florile se pun la uscat. Uscarea se poate face pe cale naturală la umbră, în locuri curate, aerisite și în strat subțire, pe rame, prelate, hârtie, durând cca. 3 - 4 zile (F. Crăciun și colab., 1977). Se recomandă și uscarea direct la soare, deoarece nu se modifică compoziția chimică (M. Mircea, 1986). Artificial se pot usca la 30 - 35 °C (durata cca. 4 - 6 ore). Randamentul la uscare este de cca. 5:1. Produsul uscat se ambalează în saci de hârtie și se păstrează în încăperi curate și uscate, până la livrare.

Condițiile tehnice de recepție admit ca impurități: maximum 3% flori brunificate sau decolorate, maximum 3 % resturi de bractei și receptacul; corpuri străine organice nu se admit, cele minerale, maximum 0,25 %; umiditatea maximum 12 %, iar conținutul de helenienă minimum 0,7 %.

Productiile medii sunt de 40 - 50 q/ha (până la 60 - 80 q/ha) flori ligulate proaspete, iar cele de flori ligulate uscate sunt de cca. 10 q/ha.

În loturile semincere de crăițe se obțin 400 - 600 kg/ha achene. *Observație.* Muncitorilor, care recoltează materie primă, le pot apărea unele forme alergice, de aceea se recomandă echipament corespunzător, evitându-se contactul direct cu planta.

4.25.12. SPECII DE ECHINACEA (*Echinacea pallida* Nutt. și *Echinacea purpurea* [L.] Moench.)

Fr: Echinacée pâle; E: Pale coneflower; G: Sonnenhut
Fr: Echinacée pourpre; E: Purple coneflower, G: Roter Sonnenhut

4.25.12.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Speciile de *Echinacea*: *E. pallida* Nutt. (*echinacea*), *E. purpurea* (L.) Moench. (*echinacea purpurea*) și *E. angustifolia* (DC) Moench. (*echinacea îngustă*) numite și „pălăria soarelui”, introduse în cultură în țara noastră, au fost utilizate de mult timp, în zonele de origine (sudul SUA) de către indienii din America de Nord (statele Nebraska, Kausas, Oklahoma, Missouri și Virginia, din SUA), pentru cicatrizarea rănilor, în mușcături de șarpe și albine și în general în toate bolile. În medicina modernă, au fost introduse în S.U.A.,

începând din anul 1955. Nefiind suficient studiate chimic, farmacologic și clinic, precum și datorită orientării spre chimioterapie și antibiotice, aceste plante au fost neglijate în primele decenii ale secolului al XX-lea, până între anii 1950 - 1960, când interesul pentru valoarea lor terapeutică a crescut din nou și au început să fie introduse în cultură (L.S. Muntean și M. Tămaș 1989 etc.). În multe țări din Europa s-au obținut din speciile de *Echinacea* diferite medicamente cu proprietăți imunostimulente, antivirale, cicatrizante etc.

În țara noastră, în anul 1982, s-au luat în studiu speciile de *Echinacea* (*E. pallida*, *E. purpurea*, *E. angustifolia*) de către UMF Cluj-Napoca, în colaborare cu U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, unde s-a început acimatizarea și cultivarea lor, cu material semincer provenit din Italia (L.S. Muntean și colab. 1988/89, L.S. Muntean și M. Tămaș, 1989 etc.). La U.S.A.M.V. Cluj-Napoca s-au efectuat primele studii de biologie, dinamica formării organelor vegetative și generative în anii I - III de vegetație și de acumulare a principiilor active la aceste specii, stabilindu-se și principalele măsuri tehnologice de cultivare (modul de cultură) la *E. pallida* și *E. purpurea* (L.S. Muntean, 1990, L.S. Muntean și colab., 1991 etc.). Ulterior, la Cluj-Napoca s-au continuat studiile farmacognostice la aceste specii (I. Oniga, 1997 etc.), cele de tehnologie de cultivare (D. Vârban, 2001) și de ameliorare (L.S. Muntean și colab., 2002 și 2005 etc.).

În prezent au importanță mai mare în țara noastră speciile *E. pallida* Nutt. și *E. purpurea* (L.) Moench.

Materia primă și compoziția chimică. Speciile medicinale din genul *Echinacea* au ca materie primă rădăcinile (*Echinacea radix*) și partea aeriană (*Echinacea herba*). Deoarece există diferențe între conținutul în principii active a produsului (radis și herba) la speciile de *Echinacea*, se preconizează menționarea provenienței acestuia la speciile cu frunză îngustă (*E. pallida* Nutt., *E. angustifolia* DC) și cea purpurie (*E. purpurea* (L.) Moench.), pentru rădăcini (*Echinacea pallida radix*, *Echinacea angustifolia radix*, *Echinacea purpurea radix*) și partea aeriană (*Echinacea purpurea herba*).

Produsul vegetal conține, în proporții diferite, în funcție de specie și organ: polizaharide, ulei volatil, fitosterine, amidon, saponine, zaharuri reducătoare, pentozani, echinacina, echinolona, echinacina, echinacea B, săruri minerale etc. (M. Tămaș și colab., 1987, L.S. Muntean și M. Tămaș 1989, I. Oniga 1997). La Cluj-Napoca s-au efectuat cercetări chimice referitoare la uleiul volatil (M. Tămaș și colab., 1987), saponine (V. Hodișan și M. Tămaș, 1987), derivați fenil propanici și polizaharide (M. Tămaș și colab., 1987). S-a

sennalat prezența taninurilor în speciile de *Echinacea*, precum și faptul că rădăcinile și frunzele acestora sunt mai bogate în saponine (I. Oniga, 1997).

În mod obișnuit *Echinacea pallida* Nutt. se cultivă pentru rădăcini, iar *Echinacea purpurea* (L.) Moench pentru partea aeriană (*herba*).

Există deosebiri în privința compoziției chimice a celor două specii, raportată mai ales la aspectele cantitative în diferite organe. *E. pallida*, având sistemul radicalar mai dezvoltat, acumulează o cantitate mai mare de ulei volatili și polizaharide, iar *E. purpurea*, compuși fenil - propanici mai cu seamă în organele aeriene etc. (tabelul 4.25.12.1., după L.S. Muntean și colab., 1991 și tab. 4.25.12.2., după L.S. Muntean și colab., 1999).

Utilizări. Preparatele medicamentose din *echinacea* determină creșterea sistemului de autoapărare a organismului (prin mobilizarea leucocitelor și mărirea activității fagocitozei), inhibă multiplicarea virusurilor etc.

Extracțele și formele farmaceutice cu extracțe se folosesc în urologie, ginecologie, medicină internă etc.

Aceste plante sunt utilizate ca materie primă pentru obținerea unor preparate antivirale, antitumorale, imunostimulente, cicatrizante, antiinflamatoare, diuretice etc. Există foarte multe preparate medicamentose care conțin pulbere vegetală și/sau extracțe din speciile *Echinacea* (în Germania peste 80 de medicamente înregistrate etc.) sau o gamă largă de utilizări. Dintre cele mai cunoscute enumărăm: *Echinacin*, *Immunopret*, *Contrainfekt*, *Echinacea* - *Ratiopharm*, *Esberitox*, *Resistan*, *Salus*, *Echinacea* etc. În unele țări (SUA, Germania etc.), *E. angustifolia* constituie materia primă pentru obținerea de tincturi homeopate.

A fost creat la Facultatea de Farmacie din Cluj-Napoca produsul *Novastim*, tinctură, comprimate, gel (din *Echinacea pallida* Nutt.), recomandat în stimularea rezistenței organismului, în tratamentul bolilor hepatice, în prevenirea infecțiilor virale și microbiene, în tratamentul herpesului de etiologie virală etc.

Răspândire. Speciile de *Echinacea* cresc spontan și se cultivă în America de Nord. Unele specii au fost acclimatizate și introduse în cultură în Europa Centrală și Rusia etc. Se cultivă pe suprafețe mai mari în SUA (principalul furnizor al produsului medicamentos), alte țări din America, precum și în Europa, Australia și Noua Zeelandă.

Tabelul 4.25.12.1.
Conținutul în principii active la *Echinacea pallida* Nutt. și *E. purpurea* (L.) Moench, în condițiile de la Cluj-Napoca

Anul de vegetație	Principalul activ	Organul analizat			
		Rădăcină	Tulpină	Frunză	Inflorescență
<i>Echinacea pallida</i> Nutt.					
II	Ulei volatili (ml/100 g)	0,22	urme	0,04	0,08
	Saponine (g %)	5,2	0,85	3,1	4,15
	Flavone (g % în rutiozid)	-	0,09	0,2	0,16
	Compuși fenil propanici (g % acid cațelic)	1,8	0,5	3,1	1,3
	Polizaharide imunostimulente (g %)	1,6	0,065	0,015	0,035
III și IV	Ulei volatili (ml/100 g)	0,23	-	-	-
	Saponine (g %)	5,22	-	3,12	4,16
	Polizaharide imunostimulente (g %)	1,6	-	0,017	-
	Compuși fenil propanici (g %)	-	-	-	1,3
<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench.					
II	Compuși fenil propanici (g % în acid cațelic)	1,75	2,5	1,75	1,3

Notă: În anul I de vegetație herba la *E. pallida* Nutt. conține 20,4 g/100 g plantă uscată, substanțe extractibile cu alcool 60°.

Notă: În anul I de vegetație herba la *E. pallida* Nutt. conține 20,4 g/100 g plantă uscată, substanțe extractibile cu alcool 60°.

Tabelul 4.25.12.2.
Conținutul de polizaharide imunostimulente și derivați fenil propanici la *Echinacea pallida* Nutt. și *Echinacea purpurea* (L.) Moench.

Anul de vegetație	Specia	Principalul activ	Faza de vegetație	Organul analizat			
				Rădăcină	Tulpină	Frunză	Inflorescență
I	<i>E. pallida</i>	Derivați fenil propanici		2,29	3,09	3,5	-
		Derivați fenil propanici		0,36	-	1,09	-
		Derivați fenil propanici					
II	<i>E. pallida</i>	Derivați fenil propanici	Îmbobocit înflori	1	1,5	1,6	0,25
		Derivați fenil propanici	Îmbobocit înflori	1,2	1,2	1,4	0,2
		Derivați fenil propanici	Maturitate	1,3	0,39	0,1	0,15
		Derivați fenil propanici	Maturitate	2,4	1,2	3	-
	<i>E. purpurea</i>	Derivați fenil propanici	Îmbobocit înflori	2,55	0,5	2,6	0,48
		Derivați fenil propanici	Îmbobocit înflori	2,6	0,4	2,5	0,52
		Derivați fenil propanici	Maturitate	3	0,7	0,26	0,15
		Derivați fenil propanici	Maturitate	3,4	0,62	0,32	0,1
	<i>E. pallida</i>	Polizaharide imunostimulente	Îmbobocit înflori	4,2	0,12	0,2	0,12
		Polizaharide imunostimulente	Îmbobocit înflori	3,6	0,82	0,6	0,32
		Polizaharide imunostimulente	Îmbobocit înflori	4,2	0,92	0,98	0,48
		Polizaharide imunostimulente	Maturitate	4,8	0,32	0,86	0,37

La noi în țară, specii de *Echinacea* există în colecția unor grădini botanice și ca plante ornamentale (*E. purpurea*). Introducerea lor în cultură în țara noastră și valorificarea în scop medicinal s-a inițiat la Cluj-Napoca din anul 1982, după cum s-a arătat, iar

S.C.P.M.A. Fundulea (din anul 1987) a inclus speciile de *Echinacea* între plantele care urmează să fie extinse în cultură, cercetările în acest scop efectuându-se la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca.

Sistematică. **Soiuri.** Genul *Echinacea* cuprinde 9 specii originare din America de Nord, cu multe varietăți. Numele genului derivă din grecescul *echinos* (arici), cu referire la fructul lor țepos (la vârf are o margine membranoasă cu patru dinți). Ca specii medicinale, acclimatizate și în țara noastră, sunt *Echinacea angustifolia* (DC) Moench (n = 11), *Echinacea purpurea* (L.) Moench (n = 11) și *Echinacea pallida* Nutt (n = 22), fiecare având și sinonime (L. Muntean și M. Tămaș, 1989): *E. angustifolia* (DC) Moench. (sin. *E. sanguinea* Nutt. și *Brauneria angustifolia* (DC) Heller); *E. pallida* Nutt. (sin. *Rudbeckia pallida* Nutt., *E. angustifolia* Hook, *Brauneria pallida* Britt.) și *E. purpurea* (L.) Moench. (sin. *Brauneria purpurea* (L.) Britt, *Rudbeckia purpurea* L. etc.).

Din genul *Echinacea*, ca specii medicinale, cultivate în țara noastră, sunt în principal *Echinacea pallida* Nutt. și *Echinacea purpurea* (L.) Moench (fig 4.25.12., 4.25.12.a., 4.25.12.b. și 4.25.12.c., toate originale).

La Cluj-Napoca s-a studiat cariotipul speciilor de *Echinacea* cultivate în țara noastră: *E. pallida* Nutt. (n = 22), *E. purpurea* (L.) Moench (n = 11). *E. pallida* Nutt. este tetraploidă, având $2n = 4x = 44$ cromozomi, de dimensiuni mici, cuprinse între 5,87 - 3,04 microni, ce pot fi relativ ușor individualizați după forma și mărimea lor (L.S. Muntean și colab., 1990 și 1991). S-a stabilit astfel că genotipul luat în cultură la noi în țară este *E. pallida* Nutt. (n = 22) și nu *E. angustifolia* (DC) Moench. (n = 11), genotipuri asemănătoare morfologic (L.S. Muntean și colab., 1988/89 și 1990, L.S. Muntean și C. Botez, 1994). C. Botez și colab., 2002 au comunicat rezultatele cercetărilor privind diversitatea genetică în cadrul speciilor *E. pallida* Nutt. și *E. purpurea* (L.) Moench. Mai sunt cunoscute și alte specii din cadrul genului *Echinacea*, între care *E. angustifolia* (DC) Moench. cultivată pentru rădăcini (*Echinacea angustifolia* radix) etc. (L. Muntean și colab. 1988/89, L. Muntean și M. Tămaș, 1989 etc.).

La speciile de *Echinacea pallida* și *E. purpurea* se cultivă proveniențe străine, iar la *E. purpurea* și populații locale.



Fig. 4.25.12. *Echinacea pallida* Nutt.

Fig. 4.25.12 a. *Echinacea purpurea* L. Moench.

Din specia *E. pallida* Nutt, s-a creat la USAMV Cluj-Napoca, primul soi autohton, „Napoca” (de L.S. Muntean și colab.), testat în rețeaua de stat (2004 - 2005) și recomandat pentru cultură începând cu anul 2006. Soiul „Napoca” este semitimpuriu (134 - 145 zile, din anul doi de vegetație), cu o producție de rădăcini în stare proaspătă de 4,5 - 5,2 t/ha (1,3 - 1,5 t/ha, în stare uscată) și un conținut ridicat de principii active, polizaharide imunostimulente (6,1 - 6,4 g %), derivați fenil propanici (0,5 - 0,6 g %), ulei volatili (0,9 - 1,2 ml/100 g) etc., care determină creșterea sistemului de autoapărare a organismului, materia primă fiind utilizată în obținerea unor preparate antivirale, imunostimulente, antitumorale, cicatrizante etc. (L.S. Muntean și colab., 2005).

Din specia *E. purpurea* (L.) Moench, s-a creat la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca (de L.S. Muntean și colab.), soiul „Cluj”, (propus pentru testare și introducere în cultură), cu perioadă de vegetație de 155 - 160 zile (din anul II de vegetație), cultivat pentru partea aeriană a plantei (herba), din anul doi de vegetație, iar la destinația culturii se pot valorifica și rădăcinile (radix). Producția de herba proaspătă este de 10 - 15 t/ha în anul II și 18 - 22 t/ha în anii următori, iar cea de rădăcini de 3,3 - 3,8 t/ha (în stare proaspătă). Materia primă conține polizaharide imunostimulente (1 - 1,5 %), derivați fenilpropanici (2,3 - 2,5 %) etc. și este utilizată în obținerea unor medicamente (antivirale, imunostimulente, cicatrizante) și a unor produse cosmetice (L.S. Muntean și colab., 2007).

Particularități biologice. *E. pallida*, *E. purpurea* și *E. angustifolia*, sunt plante perene, cu aspect de tufă. Rădăcina la *E. pallida* și *E. angustifolia* este pivotantă, cu una sau mai multe rădăcini verticale drepte, de culoare gri - brună. *E. purpurea* are mai multe rădăcini subțiri, firease, oblic ramificate, de culoare brun - deschis. Tulpina are înălțimea de 80 - 140 cm. Frunzele la *E. pallida* și *E. angustifolia* sunt liniar lanceolate, la bază atenuate într-un petiol lung (cele superioare sesile), având lungimea limbului 10 - 15 (20) cm și lățimea de 3 - 6 cm, pe dos cu trei nervuri. La *E. purpurea* sunt oval - lanceolate, 5 - nervate, cele bazale lung pețiolate spre vârf, sesile sau scurt pețiolate. Florile sunt grupate în inflorescențe antodii. La *E. pallida* și *E. angustifolia* antodiile sunt ovoidale, țepoase la uscare, cu foliole involucrale la bază (dispuse pe două rânduri), receptaculul conic (înalt de 1,5 - 2 cm și cu diametrul de 2 - 3 cm); la exterior flori ligulate roz - violacee, sterile, cu ligulă 3 - dințată (lungi de 3 - 5 cm, cu ligula lată de 2 mm); la interior flori tubulose, de culoare portocalie, hermafrodite (lungi de 4 - 6 mm). La *E. purpurea* antodiile

sunt lăfite, cu trei rânduri de foliole involucrale, receptacul conic (înalt de 2 - 4 cm și cu diametrul de 3 - 5 cm); florile ligulate (lungi de 5 - 7 cm, cu ligula lată de 3 - 4 mm) de culoare roșie intensă, mai închise ca la precedentă; florile tubuloase, hermafrodite (lungi de 6 - 8 mm), portocalii, dispuse pe suprafața receptaculului. Înflorirea are loc în iulie - august; polenizarea este entomofila. Fructul este o achenă muchiată, albicioasă, cu papus rudimentar; lungimea achenei de 2 - 4 mm la *E. angustifolia* și 3 - 5 mm la *E. purpurea*. Aceste plante sunt acoperite cu peri tectori, la *E. angustifolia* și *E. pallida* sunt aspri, de 1,8 - 2 mm (formați din 2 - 5 celule), cu baza umflată și cu vârful ascuțit, imprimând plantei rigiditate, iar la *E. purpurea*, perii tectori sunt mai rari și mai scurți (0,25 - 0,3 mm).

Structura plantelor de *Echinacea* înmulțite prin răsad în primii trei ani de vegetație se prezintă în tabelul 4.25.12.3. (după L.S. Muntean și colab., 1991). *E. pallida* formează în primul an de vegetație o rozetă de frunze, înflorirea fiind sporadică (circa 1 % din plante). *E. purpurea* formează în anul întâi de vegetație o rozetă de frunze, iar în cursul lunilor septembrie - octombrie apar primii lăstari floriferi la circa 40 % din plante. *E. pallida* și *E. purpurea*, în anul al II-lea și al III-lea de vegetație, formează după răsărire o rozetă de frunze, iar primii lăstari floriferi apar în luna iunie. Vigoarea părții aeriene a plantelor este mai mare la *E. purpurea*, iar *E. pallida* are sistemul radicular mai dezvoltat (pivotant).

Cerințe față de climă și sol. În zonele de origine (America de Nord), *E. angustifolia* și *E. pallida* cresc în condiții de soluri uscate, mai nisipoase (prerie), iar *E. purpurea* în zone ceva mai umede. Ele s-au acclimatizat și se cultivă în unele țări din Europa Centrală și Rusia (R. Benigni și colab., 1964, C. Harnischfeger și H. Stolze, 1983, citați de M. Tămaș și V. Hodișan, 1984). Ele s-au dovedit plante rezistente la condițiile de climă și sol.

Zonare. Speciile de *Echinacea* au o bună plasticitate ecologică, putându-se cultiva în diferite zone agricole ale țării, pe soluri mijlocii, bine aprovizionate în elemente nutritive.

Echinacea cu frunză îngustă (*E. angustifolia* și *E. pallida*) sunt specii de climă mai blândă, cu insolație bună, pe soluri ușoare, drenate și calde. *E. purpurea* merge în zona colinară, cu umiditate suficientă și insolație potrivită, pe soluri cu textură mijlocie și fertile.

Tabelul 4.25.12.3.

Structura plantelor de *Echinacea pallida* Nutt. și *Echinacea purpurea* (L.) Moench, înmulțite prin răsad, în primii trei ani de vegetație, în condițiile de la Cluj-Napoca

Anul de vegetație și luna de observare	Specificare	Specie		DL 5 %
		<i>E. pallida</i>	<i>E. purpurea</i>	
Anul I (1 octombrie)	Faza de vegetație	Rozeta (înflorire sporadică-cca. 1 % din plante)	Rozeta și lăstari floriferi cca. 40 % din plante	
	Frunze			
	- număr	83 ± 4	79,6 ± 8,4	-3,4(2,1,4)
	- lungime limb (cm)	18 ± 0,7	28,4 ± 1,2	+10,4 ^{***} (3,1)
	- lățime limb (cm)	3,4 ± 0,4	5,7 ± 0,7	+2,3 ^{***} (1,8)
Anul II (august)	Masa plantei (g/plantă)			
	- media pe plantă	184,2 ± 14,3	411,2 ± 45,2	+230 ^{***} (109,6)
	- herba	132 ± 15,3	350,2 ± 43,3	+218,2 ^{***} (106,3)
	- radix	52,2 ± 3,4	64 ± 3,5	+11,8 ^{***} (11,4)
	Frunze			
Anul III (august)	- număr	125,7 ± 20,1	168,3 ± 28,5	-42,6(96,9)
	- masă (g)	102 ± 2,6	193 ± 17,6	-91 ^{***} (49,4)
	- lungime limb (cm)	20 ± 0,6	20 ± 1,1	0(3,6)
	- lățime limb (cm)	2,7 ± 0,4	10 ± 0,4	-7,3 ^{***} (1,7)
	Număr lăstari pe plantă	6,3 ± 0,3	7,7 ± 0,3	-1,4 ^{***} (1,3)
	Inflorescențe pe plantă			
	- număr	16,3 ± 0,9	20 ± 0,6	-3,7(65,6)
	- masa (g)	181 ± 23,6	250,3 ± 1,4	-69,3 ^{***} (4,7)
	Înălțimea plantei (cm)	112,7 ± 2,3	120 ± 5,5	-7,3(16,8)
	Masa (g/pl.)			
	- total/pl.	427 ± 16,6	678 ± 117,8	-251(330,8)---
	- herba	309,3 ± 23,9	600 ± 14,4	290,7 ^{***} (77,6)
	- radix	117,7 ± 8,4	98 ± 3,1	+19,7(24,7)
	Frunze			
	- număr	352,3 ± 27,5	364 ± 24,2	-11,7(101,7)
	- masă (g)	290,3 ± 26,5	408 ± 25	-117,7 ^{***} (101,2)
	- lungime limb (cm)	17,5 ± 3,4	13,6 ± 2,3	3,9(10,9)
	- lățime limb (cm)	1,7 ± 0,3	3,8 ± 0,6	-2,1 ^{***} (1,9)
	Nr. lăstari pe plantă	17 ± 1,5	28 ± 1,5	11 ^{***} (5,8)
Anul III (august)	Inflorescențe pe plantă			
	- număr	47,7 ± 2,9	51 ± 2,5	-3,3(10,8)
	- masă (g)	272 ± 22	294 ± 19,4	-22(80,6)
	Înălțimea plantei (cm)	122,7 ± 4,6	127,7 ± 1,8	-5(13,6)
	Masa (g/pl.)			
	- total/pl.	1210,3 ± 89,2	1422 ± 103,5	-211,7(378)
	- herba	832,3 ± 88,2	1138,3 ± 68,2	-306(308)
	- radix	378 ± 4,7	283,7 ± 35,3	94,3 ^{***} (16,9)

4.25.12.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Speciile de *Echinacea*, fiind plante perene, se amplasează în afara asolamentului, după premergătoare care lasă solul curat de buruieni. Pe același teren pot reveni numai după circa cinci ani.

Loturile semincere se amplasază izolat de celelalte culturi de *Echinacea*.

Fertilizarea. Anual se aplică 60 - 80 kg/ha P_2O_5 și 40 - 60 kg/ha K_2O (toamna) și 60 - 80 kg/ha N (primăvara).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 25 - 30 cm adâncime, după eliberarea terenului de către planta premergătoare. Patul germinativ se pregătește cu grapa cu discuri urnată de grapa cu colți sau cu combinatorul.

Sămânatul și plantatul. Speciile de *Echinacea* se pot cultiva și prin însămânțarea direct în câmp, însă înființarea culturii prin răsăd este mai sigură. Răsădul se produce în seră sau în răsadnițe calde, în glhivece nutritive (L.S. Muntean, 1990; D. Vârban, 2001). Un răsăd bun pentru plantat are 14 - 16 cm și 3 - 4 frunze la *E. pallida* și *E. angustifolia*, respectiv 15 - 18 cm și 5 - 6 frunze la *E. purpurea*. Plantarea celor trei specii se face în ultima decadă a lunii aprilie, până în prima decadă a lunii mai, la distanța de 50 cm între rânduri, 30 cm între plante pe rând, asigurând circa 65 mii plante la ha (L.S. Muntean, 1990; D. Vârban, 2001). Producția de materie primă vegetală în funcție de spațiul de nutriție la *E. pallida* Nutt. se prezintă în tabelul 4.25.12.4. (după L.S. Muntean și colab., 1992), iar la *E. purpurea* (L.) Moench în tabelul 4.25.12.5. (după L.S. Muntean și colab., 1993). La ambele specii cele mai bune rezultate s-au obținut în cazul plantării la 50 cm între rânduri și 30 cm între plante pe rând (66 mii de plante la ha). Cercetări ulterioare efectuate la Cluj-Napoca au confirmat că distanța optimă de plantare la ambele specii este la 50/30 cm (tabelele 4.25.12.6. și 4.25.12.7., după D. Vârban, 2001).

S-a încercat și plantatul de toamnă (septembrie, octombrie), însă pierderile de plante sunt semnificativ mai mari, comparativ cu plantatul în ultima decadă a lunii aprilie sau începutul lunii mai (tabelul 4.25.12.8., după L.S. Muntean și colab., 1999).

Lucrările de îngrijire. Pe toată perioada de cultură se fac prașile între rânduri și pliviri pe rând, pentru menținerea solului curat de buruieni și afânat.

În culturile semincere se efectuează purificarea biologică, până la înfloriri, înlăturând plantele netipice cu dezvoltare mai slabă și cele bolnave.

Recoltarea. Recoltarea se începe din anul al doilea de cultură. La *E. pallida* și *E. angustifolia* se poate recolta herba în anul doi (și eventual trei) la înflorire (prin cosire), iar în anul doi (eventual trei) de vegetație se recoltează la înflorire rădăcina (cu plugul fără cornană sau cu dislocatorul; pe suprafețe mici, cu caznaua). De la *E. purpurea*

se folosește în principal herba, care se recoltează an de an la înflorire, începând din anul doi de vegetație, iar la desființarea culturii, se pot valorifica și rădăcinile.

Sămânța se poate recolta din anul al doilea de vegetație (în primul an, aceste specii formează o rozetă de frunze) în luna septembrie (*E. pallida*), respectiv octombrie (*E. purpurea*). Inflorescențele se taie cu secera la maturitatea semințelor, se usucă pe platforme sau prelate, apoi se treieră, iar sămânța se condiționează.

Producția de herba și rădăcini uscate (anul trei de vegetație) la *Echinacea pallida* Nutt., în funcție de spațiul de nutriție la Cluj-Napoca

Nr. crt.	Distanța de plantare (cm)			Prod. herba uscată			Prod. radix uscată		
	Între rânduri	Pc rând	Mii pl/ha	q/ha	Dif. (q/ha)	Semnif.	q/ha	Dif. (q/ha)	Semnif.
1.	50	30	66	81,9	14,4	XX	40,4	7,9	XX
2.	50	50	40	59,4	-8,1	0	29,3	-3,2	0
3.	70	30	48	72,6	5,1	-	34,2	1,7	-
4.	70	50	28	55,8	-11,7	00	26,3	-6,2	00
Media (M)	-	-	-	67,5	-	-	32,5	-	-
DL 5% 7,1 2,06 4,99									
1% 10,61 8,03									
0,1% 17,06									

Producția de herba și rădăcini uscate (anul trei de vegetație) la *Echinacea purpurea* (L.) Moench, în funcție de spațiul de nutriție la Cluj-Napoca

Nr. crt.	Distanța de plantare (cm)			Prod. herba uscată			Prod. rădăcin uscată		
	Între rânduri	Pe rând	Mii pl/ha	q/ha	Dif. (q/ha)	Semnif.	q/ha	Dif. (q/ha)	Semnif.
1.	50	30	66	109,9	17,69	XXX	26,97	3,75	XXX
2.	50	50	40	83,19	-9,02	00	20,94	-2,28	00
3.	70	30	48	99,47	7,26	XX	25,03	1,81	XX
4.	70	50	28	81,19	-11,02	00	15,01	-8,21	000
Media (M)	-	-	-	92,91	-	-	23,22	-	-

DL 5 %	4,74	1,18
1 %	7,19	1,8
0,1 %	11,5	2,88

35 – 45 °C. Randamentul la uscare este de cca 4:1 pentru herba și cca. 3:1 pentru rădăcini.

Producția de herba proaspătă la *E. pallida* Nutt. și *E. angustifolia* DC. este de cca. 5 t/ha (în anul doi de vegetație) și 10 - 12 t/ha (în anul trei), iar cea de rădăcini proaspete, de cca. 5 t/ha.

La *E. purpurea* Moench. producția de herba proaspătă, în anul doi de vegetație, este de cca. 10 t/ha, iar în anii următori, de cca. 20 t/ha.

În loturile semincere de echinacea se obțin circa 400 kg/ha achene.

4.25.13. ARNICA (*Arnica montana* L.)

Fr: Arnica; E: Arnica; G: Arnika, Wohlverleich

4.25.13.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Arnica (numită și *carul pădurilor*, *carul zânelor*, *podbal de munte*) este pe cale de dispariție în multe zone din țară, datorită condițiilor pedoclimatice și mai ales exploatarei neraționale a bazinelor din flora spontană (E. Păun, 1995). În unele zone este declarată o specie ocrotită, iar pentru împiedicarea restrângerii arealelor ei, s-au luat măsuri speciale privind recoltarea din flora spontană a acestei plante (F. Crăciun și colab., 1977). Studii privind bioecologia și valorificarea acestei specii în țara noastră au realizat F. Păcurar și I. Rotar, 2004; M. Tămaș și colab., 2006; B. Michler și colab., 2006 etc. Fiind o specie destul de solicitată, iar flora spontană nu poate asigura cantitățile de materie primă, s-a trecut la introducerea ei în cultură (E. Păun, 1995).

Materia primă și compoziția chimică. De la arnica se utilizează inflorescențele (*Arnicae flos*), care conțin ulei volatil între 0,05 - 0,15 % (E. Grigorescu și colab., 2001) și 0,04 - 3,8 % (F. Crăciun și colab., 1977), în funcție de materialul biologic și condițiile de vegetație, precum și alcoolii triterpenici (arnidiol, arnisterină, faradiol), carotenoide (heleniina), pigmenți galbeni (arnicina), poliene, principii amre (aricina) și alți compuși (E. Grigorescu și colab., 2001, M. Tămaș și colab., 2005). În *Arnica flos*, din zona Munților Apuseni, M. Tămaș și colab., 2006, au determinat un conținut de 0,74 - 1,08 % lactone sesquiterpenice (helenaline). Rădăcinile acestei plante conțin

Tabelul 4.25.12.6.

Producția totală (herba și radix) proaspătă la *Echinacea pallida* Nutt. în funcție de densitatea și distanța de plantare (între rânduri și pe rând) la Cluj Napoca

Varianta	Distanțe de plantare (cm)	Număr plante pe 1 m ²	Producția totală (proaspătă)		Diferența q/ha	Semnificația
			q/ha	%		
1	50/20	10	277	100	-	-
2	50/30	7	326	117,7	+49	***
3	50/40	5	266	96	-11	-
4	50/50	4	137	49,5	-140	000
5	70/20	7	279	100,7	+2	-
6	70/30	5	209	75,5	-68	000
7	70/40	4	141	50,9	-136	000
8	70/50	3	81	29,2	-196	000

DL 5% = 18
DL 1% = 25
DL 0,1% = 34

Tabelul 4.25.12.7.

Producția totală (herba și radix) proaspătă la *Echinacea purpurea* L. Moench, în funcție de densitatea și distanța de plantare (între rânduri și pe rând) la Cluj Napoca

Varianta	Distanța de plantare (cm)	Număr plante pe m ²	Producția totală		Diferența q/ha	Semnificația
			q/ha	%		
1 (Mt)	50/20	10	417	100	-	-
2	50/30	7	576	138,2	+159	***
3	50/40	5	333	79,9	-84	000
4	50/50	4	214	51,3	-203	000
5	70/20	7	403	96,6	-14	-
6	70/30	5	227	54,5	-190	000
7	70/40	4	233	55,8	-184	000
8	70/50	3	165	39,5	-252	000

DL 5% = 29
DL 1% = 41
DL 0,1% = 57

Tabelul 4.25.12.8.
Pierderi de plante la specii de *Echinacea*, după un an de vegetație, în funcție de perioada de plantare la Cluj-Napoca

Perioada de plantare		Plante pierdute, după un an de vegetație (%) comparativ cu plantarea în luna mai (100 %)			
		<i>E. pallida</i>		<i>E. purpurea</i>	
Toamna sau primăvara	Luna	Plante pierdute	Semnificația	Plante pierdute	Semnificația
Toamna	Septembrie	177	XX	537	XXX
	Octombrie	328	XXX	824	XXX
Primăvara	Aprilie	108	-	335	X
	Mai (Mt)	100	-	100	-

Condiționarea După recoltare, din materia primă vegetală (herba, radix) se înlătură impuritățile. Produsul se usucă pe cale naturală (în spații amenajate, în strat subțire) sau artificială la

ulei volatili (0,5 - 1,5 %), acizi (cafeic, fumaric, succinic), inulina, timol, zaharoză etc. (F. Crăciun și colab. 1977 etc.).

Utilizări Principiile active din arnica au o acțiune complexă: antiseptică, antiinflamatoare, bacteriostatică și fungică, coleretică, diuretică, hipotensivă etc. Se utilizează ca și antiinflamator extern în luxații, echimoze, artroze, venotonic în flebite și tromboflebite, varice, etc. Nu se aplică pe leziuni, răni deschise sau mucoase (hemoroizi). Tratamentul intern, cu anumite produse care au acțiune sedativă, se face numai cu avizul medicului (în doze mari fiind toxic sau chiar paralizant). Ca produse farmaceutice amintim: tinctura 1:10 aplicată în comprese, unguent (Venarol), ulei de arnică (în artroze). La persoane sensibile poate produce reacții alergice.

Răspândirea. Arnica este răspândită în Europa, Asia și America de Nord (E. Coiciu și G. Racz, 1962). La noi în țară crește în pășuni și fânețe din zona montană și subalpină, cu climat umed, în special în M-ii Apuseni și nordul Moldovei.

Sistematică. Soluri. Specia cultivată este *Arnica montana* L. (fig. 4.25.13., după *Flora României*, vol. IX, 1964 și 4.25.13.a., original). Sunt unele specii din zona montană (din genurile *Doronicum* și *Senecio*), cu care se poate confunda după aspectul antodunului. Se deosebește prin faptul că *Arnica montana* are frunze tulpinale opuse.

Particularități biologice. Arnica este plantă ierboasă perenă. În sol prezintă un rizom oblic sau orizontal, ramificat, de culoare brună - roșcată, de 8 - 10 cm lungime și 3 - 5 mm grosime, de pe care pornesc numeroase rădăcini fibroase. Tulpina aeriană, erectă, cilindrică, înaltă de circa 60 cm, acoperită cu peritectori ai glanduloși, cu 1 - 3 perechi de frunze opuse (de circa 1 - 2 cm lungime) și ramuri secundare opuse. Tulpina și ramificațiile poartă în vârf câte o inflorescență. Frunzele bazale în număr de 5 - 7(10) sunt eliptice - ovate și dispuse în rozetă, cu 6 - 12 cm lungime, 3 - 6 cm lățime și 3 - 5 nervuri. Florile sunt dispuse în inflorescențe (calatidii). Inflorescența principală situată în vârful tulpinii are diametrul de 6 - 8 cm, flori marginale (ligulate) galbene aurii și florile centrale (tubuloase) galben - portocalii. Inflorescența este protejată de un involucriu format din două rânduri de bractei.




Fig. 4.25.13. *Arnica montana* L.
a - floare tubuloasă; b - floare ligată

Florile ligulate (femele) sunt în număr de 12 - 20 (ligula este de circa 2 cm lungime), florile tubuloase (hermafrodite) au caliciu păros, corola cu cinci dinți, androceul de cinci stamine concrescute. Fructele sunt achene, de 5 mm lungime, 1 mm groșime, cenușie - neagră, prevăzute terminal cu papus gălbui, lung de circa 8 mm. Înflorște în iulie - august.

Cerințe față de climă și sol. Arnica crește în zona montană, cu climat umed. Preferă solurile din zonele forestiere, ușoare, bogate în humus și bine aprovizionate în apă.

Zonare. Deși este o plantă cu o bună plasticitate ecologică, se recomandă cultivarea ei în arealele de răspândire naturală, în condiții pedoclimatice favorabile, pentru a asigura producții ridicate, bogate în principii active.

4.25.13.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Arnica se amplasează în cultură după plante care lasă terenul curat de buruieni și într-o bună stare de fertilitate. Reușește după plante prășitoare din zona sa de cultură, îngrășate cu gunoi de grajd și bine întreținute.

Fertilizarea. Stabilirea dozelor de îngrășăminte minerale (N_{40-60} P_{30-50} K_{30-40}), eventual cele organice (gunoi de grajd) se face în funcție de fertilitatea solului și planta premergătoare.

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 23 - 25 cm adâncime și se menține curată de buruieni prin lucrări cu discul, iar patul germinativ se pregătește cu combinatorul.

Înmulțirea. După cum arată E. Păun, 1995, arnica se poate înmulți prin semănat direct în câmp, prin răsad, sau pe cale vegetativă, prin despărțirea (segmentarea) rizomilor.

Semănatul direct în câmp. Se face sub iarnă, la 60 - 70 cm între rânduri (între plante 25 - 30 cm), la adâncimea de 1,5 - 2 cm, folosind 6 - 8 kg/ha sămânță (proaspătă).

Înmulțirea prin răsad. Răsadul se produce în straturi reci, semănate sub iarnă (70 - 80 g sămânță la 100 m²), la 10 cm între rânduri. Transplantarea răsadului se face primăvara, când acesta are 2 perechi de frunze adevărate, la distanța de 60x30 cm.

Înmulțirea pe cale vegetativă. Rizomii pentru plantare se recoltează de la plantații în vârstă de 3 - 4 ani, fiecare segment de rizom trebuind să aibă 1 - 2 muguri bine dezvoltati. Plantarea rizomilor se face toamna (luna octombrie) sau primăvara timpuriu, la 60x30 cm.

Lucrările de îngrijire. În tot timpul vegetației se vor efectua prașile mecanice și manuale, ori de câte ori este nevoie, pentru a menține terenul curat de buruieni.

Recoltarea. Înflorșcențele de arnică se recoltează în lunile iunie - iulie, la începutul deschiderii florilor, deoarece florile mature generează un papus foarte dezvoltat. Recoltarea înflorșcențelor se face cu pedunculul cât mai scurt, se așează în coșuri, fără presare și se transportă la locul de uscare.

Condiționarea. Din produs se înlătură impuritățile, apoi se usucă pe cale naturală în încăperi curate și bine aerisite sau artificial, în uscătoare, la 40 - 50 °C. Randamentul la uscare este de 6 - 7:1.

Condițiile tehnice de recepție prevăd ca produsul să fie format din înflorșcențe nefructificate (cu pedunculul de max. 1 cm). Se admit flori fructificate și brunificate - max. 8 %, pedunculi mai lungi de 1 cm (fără a depăși 2 cm) - max. 3 %, corpuri străine organice - max 0,5 %, cele minerale - max 0,5 %, iar umiditatea - max. 13 %.

Producția de flori uscate este de 600 - 800 kg/ha.

Observație. Înflorșcențele de arnică din flora spontană se recoltează în aceleași condiții ca și la forma cultivată, iar condițiile tehnice de recepție de vegetație sunt similare.

4.25.14. MUȘEȚELUL ROMAN (*Romanita nobila*) (*Anthemis nobilis* L.)

Fr. Camomille romaine; E. Roman chamomile; G. Römische Kamille

4.25.14.1. Importantă. Biologie. Ecologie

Materia primă și compoziția chimică. De la mușețelul roman se utilizează înflorșcențele (*Chamomillae romanae flos*; *Anthemis nobilis flos*), care conțin, în general principii active ca și mușețelul: ulei volatil, proazulene, cumarine, flavonozide, substanțe triterpenice, colină, substanțe minerale etc. (E. Grigorescu și colab., 2001 etc.). Conținutul de ulei volatil este de 0,21 - 0,46 % (în flori proaspete) și de 0,39 - 1,8 % (în flori uscate), limitele superioare fiind până la 2,02 % (în flori uscate) (V. Cucu și colab., 1982). Uleiul volatil este format mai ales din esteri, iar dintre acizi predomină acidul angelic (îndeosebi cu ester butiric), apoi acidul izobutiric etc., dintre alcoolii este de

menționat butanolul și alcoolul izomalic. Uleiul volatil cuprinde camazulen, hidrocarburi terpenice etc.

Utilizări. Sunt similare cu ale mușetelului, în spasmе gastrice și intestinale, stomahic și antiseptic îndeosebi al tractului gastrointestinal, în colită spastică. Extern este utilizat la fel ca și mușetelul.

Răspândirea. Mușetelul roman este plantă mediteraneană, introdusă în cultură și în țara noastră ca plantă medicinală (E. Coicin și G. Racz 1962, F. Crăciun și colab. 1977). Se cultivă în scop medicinal în Belgia, Franța, Germania, Anglia etc. (V. Cucu și colab. 1982) și în alte țări.

Sistematică. Soluri. Specia cultivată este *Anthemis nobilis* L. (fig. 4.25.14. și 4.25.14.a.). În cultură sunt diferite varietăți, dintre care varietatea horticola "flore pleno" D.C., are capitulele formate (aproape) numai din flori ligulate albe sterile (F. Crăciun și colab. 1977).

Particularități biologice. *Anthemis nobilis* L. este plantă perenă. În sol are un rizom multicaulat, lignificat, de pe care se formează tulpini aeriene sterile scurte (10 - 15 cm) și tulpini fertile (de 20 - 40 cm), care poartă inflorescențele. Tulpinile, ascendente, cilindrice, pubescente, pot emite la bază ramuri culcate pe sol care înrădăcinează la noduri. Frunzele, alterne, bipenat sectate, cu segmenti liniari. Florile sunt dispuse în capitule terminale, solitare, lung pedunculatе. Capitulele au 2 - 3 cm diametru și un involucre format din bractee alungit ovale. Receptaculul este conic, de circa 5 mm lungime, plin la interior, poartă 12 - 20 flori marginale ligulate (femele), albe (ligula de circa 7 mm lungime și 2,5 - 3 mm lățime), iar în centru flori tubuloase (hermafrodite), galbene, în număr redus (lipsește la var. horticola "flore pleno" D.C.). Fructele sunt achene glabre, cenușii, lucitoare, slab trunchiate, de circa 1,5 mm lungime. MMB este de 0,12 - 0,2 g. Înfloarește în lunile iunie - iulie.

Cerințe față de climă și sol. *Anthemis nobilis* L. având origine mediteraneană, are cerințe ridicate față de căldură și lumină. Este sensibilă la temperaturi scăzute iarna (când solul nu este acoperit de zăpadă, temperaturi sub -10 °C compromit parțial cultura, rizomii fiind relativ superficiali). Nu suportă secetele prelungite, asociate cu temperaturi ridicate. Reușește bine pe soluri ușoare, fertile (bogate în humus). Solurile grele, umede și reci sunt improprii.



Fig. 4.25.14. *Anthemis nobilis* L.

Zonare. Se recomandă cultivarea speciei *Anthemis nobilis* L. în arealul mușetelului (Câmpia de Vest a Olteniei, Bărăganului, Dobrogei, sud - estul Moldovei), cu excepția zonelor sărăturoase și semisărăturoase (F. Crăciun și colab., 1977).

4.25.14.2. Tehnologia de cultivare

Rotăția. Mușetelul roman se amplacează după plante care lasă terenul curat de buruieni, cereale sau plante tehnice, fertilizate și bine întreținute. Pe același teren poate reveni numai după 4 - 5 ani.

Pentru producerea materialului de înmulțire se înființează culturi speciale sau se aleg parcele cu plante bine dezvoltate și sănătoase.

Fertilizarea Se poate face fie cu gunoi de grajd bine descompus (circa 15 t/ha), sub arătură, sau îngrășăminte chimice P_{30-40} și K_{25-30} (toamna, sub arătură) și N_{30-40} (primăvara).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 23 - 25 cm adâncime și se menține curată de buruieni prin lucruri cu cultivatorul în agregat cu grapa. Patul germinativ se pregătește cu combinatorul, iar înainte de semănat, în aceeași zi, terenul se tăvăluiește, ca sămânța să nu se introducă prea adânc.

Înmulțirea. Mușetelul roman se poate înmulți pe cale generativă (semănat direct în câmp sau prin răsad) sau pe cale vegetativă (prin despărțirea tufelor) (E. Coiciu și G. Racz, 1962), sistemul recomandat fiind prin semănatul direct în câmp (F. Crăciun și colab., 1977). Sămânța trebuie să aibă puritatea de 90 % și germinația de 75 %.

Semănatul direct în câmp se face cu semănătoarele universale, adaptate pentru semințe mici și cu limitatoare de adâncime, primăvara devreme, la 40 - 45 cm între rânduri, 0,3 - 0,5 cm adâncime, folosind 2 kg/ha sămânță, la care se adaugă material inert (la o parte sămânță 4 - 5 părți de material inert) și 50 - 70 g salată, ca plantă indicatoare (F. Crăciun și colab., 1977).

Lucrările de îngrijire. Când apare planta indicatoare se prășește superficial printre rânduri și se plivesc buruienile pe rând (cu grijă să nu se deranjeze plantele de mușetel roman, în curs de răsărire). În cursul vegetației se menține terenul curat de buruieni prin prășile între rânduri și pliviri pe rând.

În culturile semincere se înlătură plantele netipice și cele atacate de boli și dăunători.

Recoltare. Florile (capitulele florale) se recoltează în iulie - august, la începutul înfloririi (când petalele albe nu sunt veștejite), cu mâna sau cu recoltatorul (ca și mușetelul), pe timp frumos, după ce se ridică roua. După recoltare florile se așează în coșuri de nuiele și se transportă în scurt timp la locul de uscare (dacă se țin peste 2 - 3 ore la

soare se încing, se brunifică și pierde din conținuturile în principii active).

În culturile semincere, recoltarea capitulelor se face cu secera dimineata pe rouă (pentru a preveni scuturarea semințelor), se leagă în snopișori, se transportă la locul de uscare (curat și aerisit), iar după uscare se treieră și se vântură.

Condiționarea. Produsul se usucă fie pe cale naturală în spații curate și aerisite, în strat subțire, fie artificial la 33 - 35 °C. Randamentul la uscare este de 5:1.

Producția. Mușetelul roman produce la ha 4000 - 5000 kg flori în stare proaspătă (800 - 1200 kg flori deshidratate).

În culturi semincere de mușetel roman, se obțin 150 - 350 kg/ha achene.

4.26. Familia LILIACEAE

4.26.1. BRÂNDUȘA DE TOAMNĂ

(*Colchicum autumnale* L.)

Fr: Colchique, Safran després;

E: Meadow saffron, Naked lady; G: Zeillose, Herbstzeitlose

4.26.1.1. Importanță. Biologie. Ecologie

Brândușa de toamnă din flora spontană se folosește în scop terapeutic din secolul al XVII-lea (H.P. Dörfler și G. Roselt, 1984). Deoarece întreaga plantă este foarte toxică, este eliminată treptat din pășuni și fânețe (unde crește spontan), devenind necesară introducerea ei în cultură. În țara noastră, ceretări în acest sens s-au efectuat la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca.

Materia primă și compoziția chimică. Materia primă o constituie semințele (*Colchici semen*). La desfințarea culturii, se recoltează bulbotuberii, care se folosesc la înființarea de noi plantații sau (la cerere) ca materie primă (*Colchici bulbus*, *Colchici tuber*) (L.S. Muntean, 1990).

Întreaga plantă conține alcaloizi de tip tropolonic, între care predomină colchicina, compus cu schelet triterpenic, precum și democolcina colchicozida, tiocolchicozida, ulei gras, fitosteroli etc. (M. Tămaș, 2005 etc.). Colchicina este inclusă între alcaloizi, însă spre deosebire de alcaloizii tipici, nu are reacție alcalină și nu formează săruri stabile cu acizii (E. Coiciu și G. Răcz, 1962, T. Goina și colab., 1967). Alături de colchicină, planta mai conține alți alcaloizi cu structură similară, notați cu literele A, B, C, F (ultimul este identic cu colchamina sau democolcina, fiind un desacetil - metilcolchicină); alte substanțe, notate cu literele D, I, J, M, O etc., care nu sunt de natură tropolonică (cu structură incomplet elucidată) și un glicozid - colchicozid care prin hidroliză se divide în glucoză și desmetil-2 colchicină (F. Crăciun și colab., 1977). După T. Goina și colab., 1967, semințele conțin: colchicină (toxică), democolcină (mai puțin toxică), colchicozidă, tiocolchicozidă, lipide (până la 17 %), fitosteroli, glucide, tanin și acizi organici. Colchamina (democolcina, omatina) este mai puțin toxică decât colchicina, fiind folosită în tratarea unor forme de cancer (E. Coiciu, 1967).

Conținutul în colchicină variază în funcție de biotip, fiind diferit de asemenea și între organele plantei. Unele lucrări menționează un conținut de până la 1,2 % alcaloizi tropolonici în semințe și circa 0,3 % alcaloizi cu nucleu tropolonic în bulbi, precum și faptul că din totalul alcaloizilor colchicina reprezintă 60 - 65 % iar restul fiind, în principal, democolcină (U. Stănescu și colab., 2004). După unele determinări, conținutul, în colchicină (raportat la substanța uscată) a fost de 0,2 - 0,6 % - 1,5 % în semințe, 0,1 - 1,3 % în bulbo - tuberi și 0,8 - 1,8 % în flori (E. Coiciu și G. Răcz, 1962). Determinându-se conținutul în colchicină prin metoda spectrofotometrică, după o prealabilă separare a colchicinei pe strat subțire de silicagel, prin procedeu bidimensional (după V. Calcandi și colab., 1978), s-au obținut următoarele valori, raportat la substanța uscată: 0,030 - 0,062 % în bulbotuberii; 0,13 - 0,142 %, în teaca frunzei; 0,063 - 0,08 % în limbul frunzei; cca. 0,173 % în flori; 0,012 - 0,018 % în capsule imature; 0,244 - 0,307 % în semințe (L. Muntean și colab., 1979). Colchicina s-a identificat și în rădăcini. În semințe, conținutul în colchicină crește spre maturitate, iar în teacă și limbul frunzelor scade, pe măsura formării și maturizării semințelor. Colchicina este o substanță toxică, mai ales asupra capilarelor, fiind mai puțin activă la animalele cu sânge rece și la mamiferele care hibernază (G. Răcz și colab., 1970).

Randamentul la uscare și conținutul mediu în colchicină a brândușei de toamnă în timpul vegetației se prezintă în tabelul 4.26.1.1. (după L.S. Muntean și colab., 1979).

Utilizări. Deși toxici, alcaloizii din brândușa de toamnă, în doze terapeutice, au acțiune analgezică și antiinflamatoare, specifică în criza acută de gută. Astfel, semințele se utilizează în industria farmaceutică pentru extragerea alcaloizilor, care prezintă acțiuni antigutoase, analgezice, ciostatice (cancer de piele) (M. Tămaș și colab., 2005). Colchicina determină scăderea producției de acid lactic de către leucocite, a depunerii cristalelor de urați și a reacției inflamatorii. În trecut se folosea în reumatism și gută. Produsul românesc "**Colchicină**" (care conține colchicină pură, extrasă din semințe de *C. autumnale*), este indicat în tratamentul crizelor acute de gută și în prevenirea acestora. Aminin și produsul pe bază de democolcină (**Calcemid**) utilizat în tratamentul leucemiilor (mai activ și mai puțin toxic decât colchicina). Din semințe se prepară: tinctura de colchic (*Tinctura Colchic*), extractul fluid de colchic (*Extractum Colchici fluidum*) și extractul uscat de colchic (*Extractum Colchici siccum*), oficializate în diferite farmacopei.


Tabelul 4.26.1.1.

Randamentul la uscare și conținutul în colchicină la <i>Colchicum autumnale</i> L., în cursul vegetației la Cluj-Napoca			
Luna	Organul recoltat	Randament la uscare	Conținutul mediu în colchicină
Aprilie	bulbotuber vechi (a)	5,07 : 1	0,031
	bulbotuber nou (b)	3,91 : 1	0,042
	teaca frunzei	9,38 : 1	0,142
Mai	limbul frunzei	6,22 : 1	0,068
	bulbotuber vechi (a)	4,10 : 1	0,03
	bulbotuber nou (b)	3,67 : 1	0,061
Iunie	teaca frunzei	7,62 : 1	0,136
	limbul frunzei	6,31 : 1	0,08
	bulbotuber nou (b)	3,47 : 1	0,041
Iulie	teaca frunzei	8,65 : 1	0,093
	limbul frunzei	6,19 : 1	0,063
	capsule	5,08 : 1	0,018
August	semințe	3,79 : 1	0,285
	bulbotuber nou (b)	3,29 : 1	0,033
	teaca frunzei	8,65 : 1	0,033
Septembrie	limbul frunzei	5,47 : 1	-
	capsule	4 : 1	0,012
	semințe	2,1 : 1	0,244
Septembrie	bulbotuber nou (b)	2,94 : 1	0,054
	capsule	1,4 : 1	0,014
	semințe	1,93 : 1	0,307
Septembrie	bulbotuber nou (b)	3,37 : 1	0,062
	flori	7,64 : 1	0,173

Colchicina are acțiune puternică asupra diviziunii celulare la plante, producând multiplicarea numărului de cromozomi. Datorită acțiunii sale asupra diviziunii celulare (efect statmokinet), este mult utilizată în ameliorarea plantelor pentru obținere de poliploizi și în studiile de citogenetică. La animale, oprește mitoză în metafază. Aceasta a dus la experimentarea ei în terapia anticancerosă. La tratamentul de durată, apar fenomene de toxicitate, în cazul folosirii colchicinei în bolile tumorale. S-au obținut rezultate mai bune cu democolcina (colchamina), în cancer ale pielii (sub formă de alifie) și în leucemii cronice, ca injecții intravenoase (E. Coiciu, 1967).

Răspândire. Brândușa de toamnă este originară din Europa, fiind răspândită în pășuni și fânețe. În țara noastră apare (uneori în masiv) în flora spontană din zona de deal și de munte, în pășuni și fânețe ceva mai unede.

Sistematică. Soiuri. Specia cultivată este *Colchicum autumnale* L. (fig. 2.26.1., original și 2.26.1.a., original). *Colchicum* provine de la "*Colchis*" provincie situată pe țărmul de Est al Mării Negre (C. Zahariadi, 1966). La *Colchicum autumnale* L. $2n = 38$ (L.S. Muntean și colab., 1981).

Fig. 4.26.1. *Colchicum autumnale* L.;

a - flori; b - floare; c - plantă cu fructe; d - fruct în curs de maturare; e - fruct matur (dehiscent)

În cadrul genului *Colchicum*, se mai întâlnesc și alte specii: *C. bibersteinii* Rony, (frunzele și florile apar simultan primăvara); *C. arenarium* Wet K., *C. forminii* Bordzil; *C. turcicum* Janka, *C. haynaldi* Heuff (C. Zahariadi, 1966). Specia *C. autumnale* L. cuprinde și forma care înfloarește în cursul primăverii (f. oec. vernale (Hoffm)), *C. vernale* Hoffm, *C. vernum* Schrank, *C. autumnale* forma vernum (Schrk) Rchb). E. Coiciu, 1967, arată că în Rusia se introduce în cultură *C. autumnale* L. (propunându-se cu aceeași valoare terapeutică, *C. speciosum* Stev. și *C. liparochiads* Woron.); în Ungaria s-a studiat *C. hungaricum* (având aceleași proprietăți ca și *C. autumnale* L.), colectarea ei dovedindu-se însă neeconomică; în Italia se recomandă cultivarea speciei *C. autumnale* L. Sub aspect

chimic, s-a studiat și *C. latifolium* S.S., *C. mundenicum* Kos. în Iugoslavia (O. Gasic și colab., 1976), precum și alte specii.

Din specia *Colchicum autumnale* L. se cultivă populații locale din zonele de cultură. La U.S.A.M.V. Cluj-Napoca s-a luat în cultură o populație locală din specia *Colchicum autumnale* L., cu o bună capacitate de producție.

Particularități biologice. Brândușa de toamnă este o plantă perenă, care regenerează din bulbotuberul piriform aflat în sol, care are la bază rădăcini fasciculate. Bulbotuberul are 4 - 5 cm lungime, 3 - 3,5 cm lățime și 2,5 - 3 cm grosime. S-a constatat că în cursul unui an calendaristic se evidențiază prezența a trei bulbotuberi de vârste diferite: bulbotuberul vechi, format cu doi ani înainte, care se resorbe treptat până în luna iunie, rămânând o scuană pe bulbotuberul format în anul precedent, la baza căruia se formează bulbotuberul nou, începând din luna august, care poartă tița florală (L. Muntean și colab., 1979). Frunzele se formează primăvara, sunt alungit - lanceolate, în număr de 3 - 6 la o plantă, având limbul de 20 - 35 cm lungime, 2 - 6 cm lățime, iar teaca de 15 - 28 cm lungime. Florile apar toamnă, în număr de 1 - 5 pe plantă sau chiar mai multe, în cultură. Floarea este alcătuită din 6 tepale petaloide violacee, concrescute la partea inferioară, formând un tub lung de cca. 20 cm. Androcoul este format din șase stamine, concrescute cu tubul perigonului. Gineceul are ovarul trilobular înclis în bulbotuber, stilul format din trei filamente libere în tubul perigonului. Înflorirea se eşalonează pe o lungă perioadă în cursul toamnei, atingând maxim în ultima decadă a lunii septembrie și prima decadă a lunii octombrie. S-a evidențiat autofertilitatea la această plantă, însă polenizarea este predominant alogamă. Fructele sunt capsule, în număr de 2 - 4, care apar primăvara. Ele sunt dispuse între frunze, pe un peduncul scurt, concrescut cu tubul tecilor, la 10 - 15 cm de la suprafața solului. Capsulele au lungimea de 3 - 5 cm și 2 - 3 cm diametru. Sunt formate din trei loji libere și dehiscente, în treimea superioară. Au culoare verde - albicioasă în cursul vegetației și brun închis la maturitate. Semințele sunt în număr de 80 - 120 (21 - 195) în fruct, dispuse pe axul central, rezultat din concrescerea pereților superiori ai lojelor. Au forma sferic - ovală, cu formațiuni ariliforme în regiunea hilului și MMB de cca. 5 g (4,8 - 5,4 g).

Semințele de brândușă de toamnă germinează extrem de greu, numai în anul al doilea de la semănat, în proporție mică, eşalonându-se pe mai mulți ani. Prin tratarea semințelor cu Tiouree 1 %, timp de o zi, în al doilea an de la semănat, răsărirea a ajuns la 61 % din

semințele semănate, depășind martorul netratat (11 % plante răsărite) de aproape șase ori.

Fenofazele brândușei de toamnă în condițiile de la Cluj-Napoca se prezintă în tabelul 4.26.1.2. (după L.S. Muntean și colab., 1979).

Tabelul 4.26.1.2. Fenofazele la *Colchicum autumnale* L., în condițiile de la Cluj-Napoca

Luna	Fenofaza
Aprilie	aparitia primelor frunze; bulbotuberul vechi (format cu doi ani înainte) foarte bine dezvoltat (a). Bulbotuberul nou (care și-a început dezvoltarea în anul precedent), în curs de dezvoltare (b)
Mai	bulbotuberul vechi (a), în curs de resorbție. Bulbotuberul nou (b) în dezvoltare, ajuns la cea un sfert din mărimea normală; frunzele sunt complet dezvoltate; capsula la începutul formării, învelită în teaca frunzelor
Iunie	bulbotuberul vechi (a) complet resorbt (având aspectul unei soave pe bulbotuberul nou). Bulbotuberul nou (b) complet format; capsulele au mărimea normală; semințele în curs de formare
Iulie	bulbotuberul nou (b) în plină maturizare. La baza bulbotuberului apare mugurșul unui nou bulbotuber (c) din care se va forma tița florală; frunzele încep să se usuce; capsulele și semințele complet maturizate
August	bulbotuberul nou (b) matur. La baza bulbotuberului își continuă dezvoltarea viitorului bulbotuber (c) cu primordiile florale; capsulele brunificate, mature, se deshidrilberând semințele
Septembrie	îmbobocirea și înflorirea; bulbotuberul (b) la dimensiuni normale. Noul bulbotuber (c) are în partea superioară tița florală; la baza creștea se observă ovarul cu primordiile viitoarelor frunze

Din sămânță, în primii cinci ani de vegetație se formează organe vegetative, florile apar în anul al șaselea (toamnă), iar fructificarea are loc în anul al șaptelea (primăvara), fapt care face dificilă înmulțirea prin seminte (L.S. Muntean și colab., 1981 și 1987). Dinamica formării organelor vegetative și generative la plantele de *Colchicum autumnale* L. în anii I - VII de vegetație (1980 - 1986) sunt prezentate în continuare (după L.S. Muntean și colab., 1987):

• În primul an de vegetație (tabelul 4.26.1.3.), din sămânță pornește un scurt mezocotil, hipocotilul (de la inserția mezocotilului la bulbotuber), un mic bulbotuber, rădăcinile și o frunzuță (coleoptil) filiformă de cca. 10 cm lungime. Formarea axului hipocotil, reprezintă primul mecanism de adâncire a bulbotuberului în sol (fig. 4.26.1.b., original).

• În anul doi de vegetație se formează un nou bulbotuber cu un pivot și rădăcini fasciculate (fig. 4.26.1.c., original). La baza bulbotuberului apare o prelungire (protuberanță) care constituie al doilea mecanism de adâncire a noului bulbotuber în sol (fig. 4.26.1.d., original). Frunza formată în anul doi de vegetație este îngust - lanceolată de cca. 10 cm lungime. De remarcat că pivotul se resorbe

treptat pe măsura dezvoltării bulbotuberului nou. În secțiune anatomică pivotul prezintă caracteristicile unei rădăcini de înmagazinare.




Fig. 4.26.1.b. *Colchicum autumnale* L.: plantă din sămânță, în anul I de vegetație (Cluj-Napoca, 1980)




Fig. 4.26.1.c. *Colchicum autumnale* L.: plantă din sămânță, în anul II de vegetație; se observă pivotul și rădăcinile fasciculate la baza bulbotuberului (Cluj-Napoca, 1981)




Fig. 4.26.1.d. *Colchicum autumnale* L.: bulbotuberi în anii I și II de vegetație; la bulbotuberul din anul II de vegetație; se observă protuberanța (Cluj-Napoca, 1981)

• În anul al treilea de vegetație bulbotuberul din anul precedent se resoarbe și formează un nou bulbotuber, cu pivot și rădăcini fasciculate. Noul bulbotuber se adâncește în sol prin prelungirea formată la baza lui (protuberanță). În anul al treilea de vegetație se dezvoltă o singură frunză îngust - lanceolată, de cca. 12 cm lungime și 0,75 cm lățime.

Tabelul 4.26.1.3.
Dinamica formării organelor la plantele de *Colchicum autumnale* L. provenite din sămânță, în primul an de vegetație (Cluj-Napoca, 1980)

Organul și determinarea	U.M.	Data determinării					
		4 iunie		18 iunie		3 iulie	
		media	s, %	media	s, %	media	s, %
Mezocotilul:	mm	0,7	40	-	-	-	-
- lungimea							
Hipocotilul:	mm	3,2	209	-	-	-	-
- lungimea							
Frunza (coleoptilul):	mm	97	47	94,2	33	93,2	59
- lungimea							
Rădăcina:	mm	47,6	29	65	27	83,4	48
- lungimea							
Bulbotuberul:	mm	3,1	73	5,7	66	5,3	68
- înălțimea	mm	2,4	49	3,5	38	3,5	26
- diametrul	mg	26,8	57	39,6	60	33,5	49
- masa							

• În anul al patrulea de vegetație, evoluția organelor în sol este similară cu cea din anul al treilea, bulbotuberul fiind mai mare (2,5 cm lungime și 0,8 cm lățime), cu protuberanța bine evidențiată, iar plantele formează două frunze îngust - lanceolate, ce ajung la 30 - 35 cm lungime.

• În anul al cincilea de vegetație se formează de asemenea numai organe vegetative, bulbotuberul are dimensiuni mai mari (3,8 cm lungime și 1,5 cm grosime). Plantele au două frunze ca și în anul al patrulea de vegetație, de cca. 36 - 38 cm lungime. În cursul toamnei s-a remarcat formarea unui mugure vegetativ și a rădăcinilor la bulbotuberul format în anul al cincilea de vegetație.

• În anul al șaselea de vegetație, evoluția organelor vegetative (primăvara vara) este similară cu cea din anii 2 - 5 de vegetație, cu deosebirea că plantele formează trei frunze lanceolate (de 35 - 40 cm), iar bulbotuberul cu lungimea de 3,5 - 4 cm lungime, 2,5 - 3 cm lățime și 2 - 2,5 cm grosime (valori apropiate de cele normale ale speciei).

În cursul toamnei (în la șaselea an de vegetație), plantele înfloresc, formând câte 1 - 3 flori pe o plantă cu dimensiuni obișnuite, fiecare floare având durata de viață 12 - 15 zile.

- Fructificarea are loc în anul al șaptelea de vegetație, când plantele formează patru frunze, cu dimensiunile prezentate în tabelul 4.26.1.4. (după L.S. Muntean și colab., 1987)

Tabelul 4.26.1.4.

Dinamica formării organelor la plantele de *Colchicum autumnale* L.,
provenite din sămânță, în al VII-lea an de vegetație (Cluj-Napoca, 1986)

Organul și determinarea	U.M.	Data determinării			
		23 aprilie	s %	22 mai	s %
		media ± s x		media ± s x	
Frunza nr. 1:					
- lungimea	mm	192,3 ± 5,8	5	289 ± 23,6	14
- lățimea	mm	24,8 ± 1,9	13	39 ± 1,1	5
Frunza nr. 2:					
- lungimea	mm	181 ± 4,9	5	293,6 ± 28	17
- lățimea	mm	23,8 ± 2,3	17	34,8 ± 2	10
Frunza nr. 3:					
- lungimea	mm	176 ± 6,1	6	298,7 ± 27	16
- lățimea	mm	20,5 ± 2	17	28,9 ± 1,5	9
Frunza nr. 4:					
- lungimea	mm	170 ± 5,8	6	290 ± 25,6	15
- lățimea	mm	9,5 ± 1,6	29	21,7 ± 0,8	7
Bulbotuberul vechi:					
- adâncimea (sol)	mm	73,7 ± 2,2	5	75 ± 4	9
- înălțimea	mm	48 ± 1,2	5	45,7 ± 2,6	10
- grosimea	mm	15,3 ± 1,9	21	6,7 ± 1,2	31
- masă	mg	3154 ± 130	7	1133,3 ± 219,3	33
Protuberanță:					
- înălțimea	mm	18,7 ± 2,3	21	17,3 ± 3,2	32
- grosimea	mm	6,1 ± 1,3	36	1,7 ± 0,5	47
Bulbotuberul nou:					
- înălțimea	mm	11,3 ± 2,3	35	40,3 ± 3,7	16
- grosimea	mm	6,4 ± 1,1	31	19,7 ± 1,8	16
- masă	mg	534 ± 50	18	4369,3 ± 202,1	8
Capsulă:					
- înălțimea	mm	14,3 ± 2,3	78	41 ± 4,9	21
- grosimea	mm	4,2 ± 0,4	18	14,7 ± 1,8	21
Pedunculul capsulei:					
- lungimea	mm	7,3 ± 4,3	103	8,7 ± 1,2	24

Cerințele față de climă și sol. Zonele de răspândire naturală sunt regiunile de deal și cele montane, mai umede și răcoroase (excesul de apă nu este favorabil). Pretinde soluri ușoare, luto - nisipoase, cu umiditate suficientă, însă fără apă stagnantă.

Zonare. Arealele de cultură sunt cele de răspândire naturală, cu umiditate suficientă și temperaturi relativ scăzute.

4.26.1.2. Tehnologia de cultivare

Rotația. Brândușa de toamnă se amplasează după plante care eliberează terenul de vreme, pe același teren urmând să revină numai după 5 - 6 ani.

Fertilizarea. Anual se aplică 40 - 60 kg/ha P_2O_5 și 40 - 50 kg/ha K_2O (toamnă) și 50 - 60 N (primăvara).

Lucrările solului. Arătura se efectuează la 25 - 30 cm adâncime și se menține curată de buruieni până la plantare, prin lucrări cu discul în agregat cu grapa cu colți.

Sămânatul și plantarea. Cultura brândușei de toamnă se poate realiza prin plantarea bulbotuberilor (metodă folosită în prezent) și prin semănat direct în câmp (sub o plantă protectoare - perenă, metodă în curs de experimentare).

Pentru plantare se folosesc bulbotuberi din flora spontană, din culturi (după încheierea ciclului de exploatare), sau din culturi ajunse să rodască (din sămânță plantele înfloresc numai în anul 6 - 7 de vegetație).

Plantarea bulbotuberilor se face înainte de înflorire (august) sau după înflorire (octombrie); plantările de primăvară dau rezultate mai slabe. Se asigură densitatea de 200 mii plante/ha, plantând la 50 cm între rânduri și 10 cm pe rând. Plantarea se face la adâncimea de 10 cm, în rigole deschise în ziua plantării. La 1 ha sunt necesare 4 - 5 mii kg bulbotuberi (un bulbotuber are 20 - 25 g) (L.S. Muntean, 1990).

În tabelele 4.26.1.5. și 4.26.1.6. (după L.S. Muntean și colab. 1984) prezentăm producția de semințe și de colchicină a brândușei de toamnă în funcție de desimea și respectiv adâncimea de plantare în condițiile de la Cluj-Napoca.

Se poate semăna (la 50 cm între rânduri) cu o gramină perenă, iar la intrarea pe rod a brândușei de toamnă (anul 6 - 7 de vegetație) se desființează pajiștea prin erbicidare, în perioada de repaus a brândușei de toamnă (rămânând această cultură) sau bulbotuberii se pot folosi pentru plantări în alte terenuri. S-au efectuat și tratamente pentru stimularea germinației semințelor, rezultate mai bune s-au obținut cu Tiouree 1 %, timp de o zi, apoi cu CaOH și H_2SO_4 în diferite concentrații și durate de tratament (L.S. Muntean și colab., 1983).

Lucrările de îngrijire. Constat în prașile și pliviri ori de câte ori este nevoie, pentru a menține solul curat de buruieni și afănat.

Recoltarea. De la brândușa de toamnă, se recoltează capsulele cu mâna, pe măsură ce începe brunificarea lor (iunie - iulie). Dacă se întârzie recoltatul, capsulele fiind dehiscențe determină scuturarea semințelor. La Cluj-Napoca, perioada recoltării capsulelor la plantele cultivate de brândușa de toamnă a fost în a doua parte a lunii iunie (egalonată pe cca. 10 zile).

Tabelul 4.26.1.5.

Producția de semințe și colchicină la brândușa de toamnă (*Colchicum autumnale* L.) în funcție de desimea de plantare a bulbotuberilor la Cluj-Napoca

Anul	Bulbotuberi (mii/ha)	Distanțe de plantare (cm)	Producția de semințe (kg/ha)	Diferența (kg/ha)	Semnif.	Conținutul în colchicină al semințelor (g %)	Producția de colchicină (kg/ha)
Anul I de la plantare	80	50/25	13,9	-8,6	0	0,175	24,3
	100	50/20	22,5	-	-	0,161	36,2
	133	50/15	20,7	-1,8	-	0,186	38,5
	200	50/10	32,9	10,4	x	0,171	56,2
	Media (Mt)		22,5	-	-	0,173	38,9
Anul II de la plantare	80	50/25	96,6	-17,4	0,0	0,15	144,9
	100	50/20	102,5	-11,5	0	0,2	205
	133	50/15	120	6	-	0,175	210
	200	50/10	136,9	22,9	x x	0,175	238
	Media (Mt)		114	-	-	0,175	199,5
Anul III de la plantare	80	50/25	61,1	-57	0,0,0	0,3	183,3
	100	50/20	86,6	-31,5	0,0,0	0,28	242,5
	133	50/15	122,1	4	x x	0,23	280,8
	200	50/10	201,6	83,5	x x x	0,29	584,6
	Media (Mt)		118,1	-	-	0,275	324,8
DL							
			5 %	7,9			
			1 %	10,6			
			0,1 %	15,6			
			0,1 %	23,6			

Bulbotuberii (*Colchici tuber*), deși sunt considerați medicinali, nu se recomandă a fi recoltați nici din flora spontană, deoarece se desființează bazinele respective. Din cultură, bulbotuberii se pot folosi numai la desființarea acesteia (dacă nu se folosesc pentru eventualele plantări).

Condiționare. După recoltare, capsulele se pot usca la soare, pe prelate, în încăperi încălzite (prin lopătare), sau în uscătoare, la 45 - 50 °C. După uscare, capsulele se bat într-un sac pentru separarea semințelor, apoi se cern prin site cu ochiuri de 2 - 3 mm, se vântură și se continuă, uscatul 1 - 2 zile (la soare). Semințele uscate se ambalează în saci de hârtie, se etichetează și se păstrează în locuri curate și uscate (sunt higroscopice). Din cca. 10 kg capsule proaspăt recoltate se obțin cca. 1 kg semințe uscate.

Tabelul 4.26.1.6.
Producția de semințe și colchicină la brândușa de toamnă (*Colchicum autumnale* L.) în funcție de adâncimea de plantare a bulbotuberilor la Cluj-Napoca

Anul	Adâncimea de plantare a bulbotuberilor (cm)	Producția de semințe (kg/ha)	Diferența față de Mt. (kg/ha)	Semnif.	Conținutul în colchicină al semințelor (g %)	Producția de colchicină (kg/ha)
Anul I de la plantare	5	22,5	2,1	-	0,174	39,1
	10	21,4	1	-	0,166	35,5
	20	17,1	-3,3	0	0,15	25,7
	Media (Mt)	20,4	-	-	0,163	33,3
	DL		5 %	2,7		
Anul II de la plantare	5	121,8	24,2	x	0,245	298,4
	10	110	12,4	-	0,225	247,5
	20	61,1	-36,5	0,0	0,2	122
	Media (Mt)	97,6	-	-	0,223	217,6
	DL		5 %	20,6		
Anul III de la plantare	5	73,7	-4,4	0,0,0	0,24	176,9
	10	88,5	10,4	x x x	0,24	212,4
	20	72,1	-6	0,0,0	0,23	165,8
	Media (Mt)	78,1	-	-	0,236	184,3
	DL		5 %	1,6		
			1 %	2,3		
			0,1 %	3,7		

Condițiile tehnice de recepție pentru semințe - (*Colchici semen*), admit ca impurități: resturi din pereții fructelor, maximum 0,5 %; corpuri străine organice, maximum 0,5 %, cele minerale, maximum 0,5 %, iar umiditatea maximum 13 %.

Bulbotuberii recoltați în scop medicinal se spală, se taie în rondele (uneori), se usucă la 45 - 50 °C (randamentul la uscare cca. 4 : 1) și se ambalează în saci textili.

Producția de semințe, în primul an de la plantare, este de 25 - 30 kg/ha, în anul al doilea, ajunge la cca. 130 kg/ha, iar în anul al treilea până la 200 kg/ha (cu un conținut mediu de 0,250 g % colchicină, rezultă cca. 500 g colchicină la ha), după care, în anii următori, producția scade.

Observație. *Colchicum autumnale* L. este una din cele mai toxice plante din țara noastră. Prezintă toxicitate (pentru om) nu numai ingerarea unor organe, ale plantei, ci și consumul de lapte de la oi sau capre (vacile o consumă rar) care au mâncat frunze de brândușă, precum și a mierii de la albinele care au vizitat florile acestei plante. S-au semnalat numeroase intoxicații ale porcinelor, care au consumat